

الأعراض الجانبية الشائعة والنادرة للقاحات

2019/07/11

اللقاحات تمنع حدوث الأمراض على سبيل المثال (شلل الأطفال) ولذلك فإن قرار عدم تحصين الطفل ينطوي أيضا عليه بالخطر ويمكن أن يضع الأطفال وغيرهم ممن يتصلون معه أو لخطر الإصابة بأمراض قد تكون قاتلة والتي يمكن الوقاية منها باللقاحات وهي تحول دون الإصابة تقريبا من مليونين إلى ثلاثة ملايين حالة وفاة كل عام ويمكن تجنب وقوع أكثر من مليون ونصف حالة وفاة إذا تحسنت نسبة الأطفال الذين يتلقون اللقاحات الموصى بها عالميا¹.

اللقاح مثل أي دواء يمكن ان يتسبب في أعراض جانبية نتيجة استخدامه وتتحسن هذه الأعراض خلال غضون أيام ومعظم الأعراض الجانبية التي تسببها اللقاحات خفيفة وغير قوية ويتم رصد ومتابعة سلامة ومأمونية اللقاحات بشكل مستمر².

تحدث الأعراض الجانبية الشائعة للقاحات بعد التطعيم مباشرة وتستمر من يوم إلى يومين ولا تلزم العلاج وبعض الأشخاص لا يحدث لهم أعراض جانبية جراء استخدام اللقاحات على الإطلاق³.
أبرز الأعراض الجانبية الشائعة للقاحات²:

- الحرارة
- الغثيان
- الاستفراغ
- التهاب الحلق
- الصداع
- آلام في المفاصل والعضلات وكذلك آلام في البطن
- الكحة
- الاسهال
- الحساسية كالحكة والاحمرار وانتفاخ الجلد
- الإرهاق

أما عن أبرز الأعراض الجانبية النادرة مع بعض اللقاحات²:

- التشنج
- الإغماء
- انخفاض عدد الصفائح الدموية بشكل مؤقت مما قد يؤدي الى حدوث النزيف.

ويجب ان يتم ابلاغ مقدم الرعاية الصحية بالعرض الجانبي في حالة حدوثه نتيجة استخدام اللقاحات

المصدر

1. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/>
2. <http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-effects.htm>
3. <https://www2.health.vic.gov.au/about/publications/factsheets/vaccine-side-effects>