

باراسيتامول

مُسكِّن ألم وخافض حرارة



شراب



تحاميل



أقراص

يوجد باراسيتامول

بعدة أشكال صيدلانية منها :

يستخدم باراسيتامول:



تخفيف
الألم



لعلاج
الحمى

جرعة الأطفال حسب العمر أو الوزن
« يُرجى مراجعة النشرة أو الصيدلي ».

جرعة المسنين أو مرضى الكبد
« يُرجى سؤال الطبيب أو الصيدلي ».



جرعة البالغين من باراسيتامول

قرص أو اثنان كل 4 - 6 ساعات،
ولا تزيد على 8 أقراص من تركيز 500 ملغ
وتعادل 4000 ملغ في غضون 24 ساعة.



أوقف باراسيتامول وراجع طبيبك إذا :

- زاد الألم أو استمر أكثر من 5 أيام لدى الأطفال و 10 أيام لدى البالغين.
- زادت الحمى أو استمرت أكثر من 3 أيام.
- ازدادت أعراض المرض سوءاً.
- ظهرت أعراض جديدة مثل الاحمرار أو التورم.

باراسيتامول قد يضر كبدك إذا :



- تناولته فترة طويلة.
- كنت تعاني من أمراض في الكبد.
- تناولت منه جرعة أعلى من 4000 ملغ في 24 ساعة.

حساسية باراسيتامول قد تسبب تفاعلات جلدية شديدة تشمل :



الطفح
الجلدي



البثور



احمرار
الجلد