

التسمم بالمبيد والإسعافات الأولية

طرق التسمم



عن طريق الأنف
بالاستنشاق المباشر للمبيد
مما يؤثر على الرئتين



عن طريق العين
بملامسة المبيد للعينين



عن طريق الجلد
بملامسة المبيد للبشرة



عن طريق الفم
بتناول الطعام والشراب أثناء عملية الرش أو
الطعام الملوث بالمبيدات، ويحدث ذلك
لعدم الإدراك بخطورة تناول المبيد

بعض أعراض التسمم



غيبوبة تهيج العينين تقيؤ غثيان ألم في المعدة صعوبة في التنفس صداع دوخة

الإسعافات الأولية في حالات التسمم

في حالة ابتلاع المبيد يجب عدم التقيؤ
إلا في الحالات التي تذكر على ملصق
عبوة المبيد



يعطى المصاب العلاجات الطبية ومضادات
التسمم حسب نوع المبيد المسبب للتسمم
والأعراض الظاهرة فوراً وبمعرفة الطبيب



في حالة ملامسة المبيد للجلد يفضل
الإسراع في نزع الملابس المعرضة
للمبيد وغسل الجلد بالماء والصابون



في حالة استنشاق المبيد وحدثت صعوبة في
التنفس ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية ثم
ينقل للمستشفى أو تستدعى سيارة الإسعاف
(يتم تزويد الطبيب بملصق عبوة المبيد)



في حالة تعرض العينين للمبيد تغسل
بماء نظيف غزير لمدة 10-15 دقيقة

