

Patient Alert Card

إليكوييس®
(أبيكسابان)

احمل هذه البطاقة معك
في جميع الأوقات

F.P.O.®

اعرض هذه البطاقة على الصيدلي وطبيب الأسنان وأي من متخصصي الرعاية الصحية الآخرين الذين يقدمون لك العلاج.

معلومات للمرضى

• تناول إليكوييس® بانتظام حسب التعليمات. إذا فاتتك إحدى الجرعات، فتناولها بمجرد تذكرها ومن ثم واصل اتباع جدول جرعاتك المعتاد.

• لا تتوقف عن تناول إليكوييس® دون التحدث مع طبيبك، نظراً لأنك ستكون معرضاً لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو غيرها من المضاعفات.

• يساعد إليكوييس® على تخفيف كثافة دمك. إلا أن هذا قد يزيد من خطر التعرض للنزيف.

• علامات وأعراض النزيف تتضمن التكدم أو النزيف تحت الجلد أو براز بلون أسود أو وجود دم في البول أو نزيف الأنف أو الدوار أو التعب أو الشحوب أو الضعف أو الصداع الشديد المفاجئ أو خروج دم مع السعال أو خروج دم مع القيء.

• إذا لم يتوقف النزيف من تلقاء نفسه، فعليك طلب الرعاية الطبية فوراً.

• إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية، فأخبر طبيبك بأنك تتناول إليكوييس®.

أنا أخضع لعلاج مضاد للتجليط باستخدام إيليكوييس® (أبيكسابان) لمنع تكوّن الجلطات الدموية

يُخضع هذا المنتج الطبي لمراقبة إضافية.
يُطلب من المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية الإبلاغ عن أي تفاعلات ضارة مشتبه بها عبر نظام الإبلاغ الوطني.

معلومات لمتخصصي الرعاية الصحية:

إيليكوييس® (أبيكسابان) هو مضاد للتجليط يتم تناوله عن طريق الفم ويُعمل عن طريق تثبيط إنزيمي مباشر للعامل العاشر النشط.

قد يزيد إيليكوييس® من خطر الإصابة بنزيف. في حالة حدوث نزيف شديد، ينبغي إيقاف النزيف على الفور.

لا يتطلب العلاج باستخدام إيليكوييس® مراقبة روتينية للتعرض.

قد تكون مقاييس الكمية المعايرة لمضاد العامل العاشر النشط مفيدة في حالات استثنائية، على سبيل المثال، الجرعة الزائدة والجراحة الطارئة

(لا يوصي باختبارات التجلط بزمن البروثرومبين (PT) ونسبة تجلط الدم (INR) وزمن الثروموبلاستين الجزئي المنشط (aPTT) - انظر ملخص خصائص المنتج

يرجى إكمال هذا القسم أو اطلب من طبيبك القيام بذلك

الاسم:

تاريخ الميلاد:

داعي الاستخدام:

الجرعة:

اسم الطبيب:

هاتف الطبيب:

