

الحقن الوريدية للحديد

معلومات هامة للمرضى حول المخاطر المحتملة من ردود فعل خطيرة حساسية مع العلاج بإستخدام الحديد عن طريق الوريد (الحديد يعطى عن طريق الحقن أو التسريب إلى الوريد)

فيرك كاربوكسي مالتوز، إيرون ديكربتان، إيرون إيزومالتوسيد 1000، إيرون سركوز.

عزيزي المريض يرجى قراءة هذه النشرة بعناية وعند وجود أي استفسار لا تتردد في استشارة الطبيب المعالج .

و لمزيد من المعلومات الخاصة بإستخدام الحديد عن طريق الوريد يرجى قراءة النشرة الداخلية . حيث تحتوي النشرة على معلومات إضافية هامة متعلقة بهذا المستحضر.

تستخدم مستحضرات الحديد عن طريق الوريد لعلاج نقص الحديد عندما تكون مستحضرات الحديد عن طريق الفم غير مجذبة أو لا يمكن استخدامها. حيث الهدف من العلاج هو استعادة مخزون الحديد في الجسم .

يمكن أن يتسبب الحديد الوريد في بعض أنواع الحساسية. وفي عدد صغير من المرضى يمكن أن تكون هذه الأنواع من الحساسية حادة أو مهددة للحياة ويمكن أن تسبب في مشاكل القلب وضغط الدم و/ أو تسبب في الإغماءة أو فقدان الوعي.

موانع استعمال الحديد عن طريق الوريد :

- أن كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) للمنتج أو أي من مكونات هذا الدواء.
- إذا ما مررت بردود فعل حساسية لأية علاجات حديد وريدي أخرى في الماضي*.
- إذا كنت تعاني من زيادة كبيرة في كمية الحديد في الجسم .
- إذا كنت تعاني من فقر دم لسببٍ آخر غير نقص مخزون الحديد .

عزيزي المريض يجب عليك الإفصاح عن هذه الأنواع من الحساسية للطبيب عند وصف أو اعطاء الحديد عن طريق الوريد.

* من المهم أن تعرف أن التفاعل قد يحدث حتى وإن لم تكن لديك أية مشاكل في الماضي من الحديد الوريدي.

قد تكون لديك مخاطرة متزايدة في التعرض للحساسية أن كان لديك:

- حساسية بما في ذلك الحساسية من الأدوية.
- الربو أو الاكزيما أو أية حساسية أخرى (على سبيل المثال الحساسية من التراب أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة).
- الأمراض المناعية مثل الالتهابات الروماتزمية أو التهابات الذئبة الحمراء.

عزيزي المريض يجب عليك الافصاح عن هذه الانواع من الحساسية للطبيب عند وصف او اعطاء الحديد عن طريق الوريد، و الطبيب بدوره يقرر اذا كان الحديد الوريدي مناسبا لك .

في الحمل: يجب عدم استخدام الحديد الوريدي أثناء فترة الحمل ما لم تكن هناك ضرورة واضحة لذلك. فإن كنتي حاملا أو تفكرين في الحمل فمن المهم أن تناقشي ذلك مع الطبيب.

عليك الاتصال بطبيبك أو ممرضتك على الفور في الحالات التالية: -

- عند وجود علامات أو أعراض حساسية خلال أو بعد العلاج بالحديد الوريدي على سبيل المثال وجود بثور جلدية أو طفح جلدي أو الحكة أو الوخة أو الصداع الخفيف أو انتفاخ الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الجسم، وجود صعوبة في التنفس أو نقص التنفس أو حشارة التنفس.

عزيزي المريض ان الطبيب وطاقم التمريض على بينة بهذه الآثار الجانبية المحتملة والتي سيتم رصدها والتعامل معها خلال وبعد اعطاء الحديد عن طريق الوريد . .

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

هذه الأدوية تخضع إلى المزيد من المراقبة. وهو ما يسمح بالتعرف السريع على أي معلومات سلامة جديدة. ويمكنك أن تساعد بالإبلاغ عن أية آثار جانبية تحدث لك. فان حدثت لك أي آثار جانبية فعليك الحديث إلى طبيبك أو ممرضتك. وهو ما يشمل أي آثار جانبية محتملة حتى وان كانت غير موجودة في هذه النشرة. ويمكنك أيضا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة إلى شركة الخليج للصناعات الدوائية (جفار) أو المركز الوطني للمراقبة الدوائية وسلامة الأدوية.

- الاتصال على شركة الخليج للصناعات الدوائية : 966114623647 + فاكس:

medical.affairs@julphar.net + عن طريق الإيميل:

- المركز الوطني للتبيظ و السلامة الدوائية (NPC):

الموقع الالكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa>

البريد الالكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

او الاتصال بالمركز الوطني للتبيظ و السلامة الدوائية على الرقم:

2340، 2356، 2317، 5729، داخلي 966 11 2038222