

نموذج موافقة وإقرار طبي

زيراكتان (آيزوتريتينوين)

كيوراكني (آيزوتريتينوين)

روأكيوتان (آيزوتريتينوين)

معلومات هامة وتحذير

إن مستحضر آيزوتريتينوين يمكن أن يسبب تشوهات خلقية خطيرة على الجنين لو تم استخدامه قبل وأثناء الحمل حتى وإن كانت الكميات قليلة. وهناك خطورة عالية من أن طفلك سيعاني من تشوهات شديدة في الحالات التالية:

- إذا كنت حاملاً عند البدء في استخدام آيزوتريتينوين.
- إذا أصبحت حاملاً بينما تستخدمين آيزوتريتينوين.
- إذا أصبحت حاملاً في غضون شهر واحد بعد توقف استخدام آيزوتريتينوين.

إقرار:

لقد تم شرح طريقة استعمال مستحضر آيزوتريتينوين من قبل طبيبي شخصياً. ومن بين إرشادات طبية أخرى، فقد قام الطبيب المعالج بتوضيح المعلومات التالية:

- 1- أن هناك خطر كبير بإصابة الجنين بتشوهات خلقية في حال الحمل خلال فترة العلاج بدواء آيزوتريتينوين وبعد شهر من انتهاء العلاج، لذلك فإني لا أنوي في أي حال من الأحوال الحمل شهر قبل المعالجة بدواء آيزوتريتينوين، أو أثناء المعالجة بدواء آيزوتريتينوين أو بعد شهر من انتهاء فترة العلاج التي تلي هذه الفترة.
- 2- أنا لست حاملاً ولا أخطط لذلك أثناء فترة العلاج بآيزوتريتينوين أو بعد شهر من إكمالي العلاج باستخدام آيزوتريتينوين.
- 3- يجب ألا استخدم آيزوتريتينوين إذا كنت حاملاً أو أصبحت حاملاً أثناء فترة العلاج.
- 4- تم إعلامي من قبل الطبيب بوجوب استعمال طريقتين لموانع حمل فعالة في الحالات التالية:
 - أ. قبل البدء في استخدام آيزوتريتينوين بشهر واحد على الأقل.
 - ب. أثناء استخدام آيزوتريتينوين.
 - ت. بعد التوقف من استخدام آيزوتريتينوين بشهر واحد على الأقل.
- 5- أعرف بأنني يجب أن أخضع لفحص الحمل عن طريق الدم والبول قبل البدء باستخدام آيزوتريتينوين.
- 6- أعرف بأنني يجب أن أخضع لفحص الحمل عن طريق الدم والبول خلال ثلاثة أيام من بدء الدورة الشهرية للتأكد من عدم وجود حمل قبل البدء باستخدام آيزوتريتينوين.
- 7- أعرف بأنني يجب أن أخضع لفحص الحمل عن طريق الدم والبول وبشكل شهري أثناء استخدام آيزوتريتينوين وذلك قبل صرف الجرعة التالية.
- 8- أنا على دراية تامة من احتمالية حدوث حمل بالرغم من استخدام موانع الحمل حسب توضيح الطبيب لي.
- 9- أعلم بأنه يجب على التوقف عن استخدام آيزوتريتينوين والاتصال فوراً بطبيبي إذا:
 - أ. تأخرت الدورة الشهرية لدى أثناء استخدام آيزوتريتينوين
 - ب. أصبحت حاملاً أثناء استخدام آيزوتريتينوين.
- 10- أعلم بأنه يجب على الاتصال بطبيبي فوراً إذا أصبحت حاملاً بعد شهر من التوقف عن استخدام آيزوتريتينوين.
- 11- أعلم بأنه يجب على عدم القيام بعملية التبرع بالدم أثناء استخدام أو بعد شهر من التوقف عن العلاج بمستحضر آيزوتريتينوين.
- 12- أعلم بأنه يجب على البدء باستخدام آيزوتريتينوين خلال سبعة أيام من كتابة الوصفة وحيث أن الوصفة صالحة لمدة ثلاثة أيام.

أقر بتوقيعي هذا بأن الطبيب قد قام بتوضيح وتأكيد جميع النقاط المذكورة آنفاً لي وأنا بدوري تفهمت وبوضوح خطورة الحمل أثناء استخدام آيزوتريتينوين أو بعد شهر من توقف استخدامه. كما أنه تم تزويدي بكتيب إرشادي عن استخدام آيزوتريتينوين.

أقر بأنني استلمت الكتيبات أدناه:

- ـ كتيب معلومات مهمة عن دواء آيزوتريتينوين.
- ـ كتيب منع الحمل.

العنوان: عدد العلب الموصوفة
اسم الطبيب المعالج: الاسم والتواقيع:
عنوان الطبيب المعالج: التاريخ: