

دليل المرضى ومقدمى الرعاية:

ما تحتاج إلى معرفته حول دواء ليبونكس وخطر ندرة المحببات

ما هو دواء لبيونكس لماذا يُوصف؟

لييونكس دواء يصرف بوصفة طبية لعلاج المرضى المصابين بالفصام الذين لم يستجيبوا للأدوية الأخرى. لبيونكس قد يقلل أيضاً من خطر السلوك الإحتحاري. يستخدم لبيونكس لعلاج مرضى الفصام المقاوم ومرضى الفصام الذين لديهم تفاعلات جانبية عصبية شديدة غير قابلة للعلاج من أدوية مضادات الذهان الأخرى بما في ذلك مضادات الذهان الغير تقليدية. مقاومة العلاج تُعرف بانعدام التحسن السريري المرضي بالرغم من استخدام جرعات كافية من دوائين مختلفين على الأقل من أدوية مضادات الذهان بما في ذلك مضادات الذهان الغير تقليدية ويجب أن تُوصف هذه الأدوية لفترة كافية. لبيونكس يُوصف في الاضطرابات النفسية التي تحدث أثناء مرض باركنسون في حالة فشل العلاج النموذجي.

ما هي المعلومات التي يجب معرفتها عن أكثر الأعراض الجانبية الخطيرة عند استخدام دواء لبيونكس؟

لييونكس يمكن أن يسبب ندرة المحببات. ندرة المحببات هو اضطراب في الدم يحدث لنوع معين من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا المتعادلة عندما لا يتم تصنيعها أو تصنيع بكمية لا يكفي. وهذا يُصعّب على جسمك محاربة العدوى. قبل أن تتمكن من بدء لبيونكس أيضاً وخلال فترة العلاج، يجب عليك أن تقوم بعمل اختبارات الدم بصفة دورية لقياس عدد الخلايا المتعادلة في دمك. هذا الاختبار يسمى العدد الكلي للخلايا المتعادلة (ANC). إذا قل عدد الخلايا المتعادلة (ANC) بصورة منخفضة جداً فإنه قد تضطر الي التوقف عن تناول دواء لبيونكس. سوف يقرر طبيبك إذا أو متى يمكن بدء لبيونكس بأمان مرة أخرى. هذا ليس الأثر الجانبى الخطير الوحيد لدواء لبيونكس. أخبر طبيبك المعالج عن الآثار الجانبية الخطيرة الأخرى في حالة حدوثها.

ما هي أعراض نقص المحببات؟

قد لا يحدث لديك أية أعراض على الإطلاق. قياس عدد الخلايا المتعادلة في دمك هو الطريقة الوحيدة للتأكد من وجود ندرة المحببات. وقياس عدد الخلايا المتعادلة يساعد طبيبك على معرفة ما إذا كنت أكثر احتمالاً للإصابة بالعدوى.

⚠ إذا حدث لديك أي من هذه الأعراض التالية، تحدث إلى طبيبك على الفور

- العدوى، بما في ذلك الجلد، الحنجرة، المسالك البولية، المهبل، الالتهاب الرئوي، أو أي عدوى أخرى
- حمى أو رعشة
- قروح أو تقرحات داخل الفم، اللثة، أو على الجلد
- الجروح التي تستغرق وقتاً طويلاً للشفاء
- الشعور بأن لديك أعراض الإنفلونزا
- ألم أو حرقان أثناء التبول
- الإفرازات المهبلية الغير عادية أو الحكة
- الألم في البطن
- القروح أو الألم في أو حول منطقة المستقيم الخاص بك
- الشعور بضعف شديد أو تعب

ما الذي يُمكنني القيام به للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بندرة المحببات؟

يمكنك القيام بثلاثة أشياء هامة: 

- ١- قم بفحص دمك حسب تعليمات الطبيب
- ٢- أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها (دواء بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية) وإذا كنت تبدأ دواء جديد
- ٣- أخبر طبيبك فوراً إذا كان لديك حمى أو شعور بالمرض

ما هي اختبارات الدم المطلوبة لعلاج لبيونكس؟

- سيطلب منك طبيبك إتمام فحوصات الدم الخاصة بك
- ستحتاج إلى الحصول على فحوصات دمك في المواعيد التالية أو حسب توجيهات الطبيب الخاص بك:
 - فحوصات الدم أسبوعياً لمدة ٦ أشهر من بداية استخدام لبيونكس
 - كل أسبوعين لمدة ٦ أشهر إذا كان العدد الكلي للخلايا المتعادلة (ANC) في المعدل القياسي
 - كل ٤ أسابيع بعد أول سنة إذا كان العدد الكلي للخلايا المتعادلة (ANC) في المعدل القياسي

أحصل على
اختبار الدم
الخاص بك

- إذا كان العدد الكلي للخلايا المتعادلة (ANC) الخاصة بك منخفض جداً، سيُعيد طبيبك جدولاً اختبارات الدم بشكل أكثر تكراراً.

مراقبة النتائج

- **تذكر:** يجب عليك إتمام اختبارات الدم المطلوبة حتى تستطيع الحصول على دواء لبيونكس من الصيدلية. يرجى الرجوع إلى منشورات المرضى للحصول على معلومات إضافية.

- يمكنك الإبلاغ عن أي مشكلة أو الأعراض الجانبية من خلال:
شركة نوفارتس

تليفون : ٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠

فاكس : ٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧

الإلكتروني البريد: adverse.events@novartis.com

الهيئة العامة للغذاء والدواء المركز الوطني للتبقيط الدوائي

الرقم المجاني : ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠

الفاكس : ٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

الايمل : npc.drug@sfd.gov.sa

او عن طريق الانترنت : <https://ade.sfd.gov.sa>

لا اختبارات دم
لا دواء

