

دليل الدواء استيلارا (يوستكينوماب) حقن

ما هي اهم المعلومات الواجب معرفتها عن استيلارا؟

ان استيلارا عقار يؤثر علي مناعه الجسم. استيلارا ممكن ان يؤدي الي زياده احتماليه التعرض الي اعراض جانبيه خطيره, منها :
عدوي شديده : استيلارا ممكن ان يؤدي ال نقص قدره مناعه الجسم لمقومه العدوي و هذا يؤدي الي احتمايه حدوث المرض. بعض المرضي حدث لهم عدوي شديده اثناء اخذهم عقار ال (استيلارا) , منها السل , والعدوي البكتيرييه او الفطريه او الفيروسيه. بعض المرضي احتاجوا للتنويم بالمستشفى لعلاج هذه العدوي .

- يجب علي طبيبك فحصك من السل قبل البدء بعلاجك بال (استيلارا)
- لو شك طبيبك بانك معرض للاصابه بمرض السل , فربما يجب ان تبدأ بدواء للعلاج من السل قبل البدء بالعلاج بال (استيلارا)
- يجب علي طبيبك ان يلاحظك باستمرار من اعراض الاصابه بالسل خلال فتره علاجك بال (استيلارا)

لا يجب عليك بدأ العلاج بال (استيلارا) في حاله اصابتك بعدوي , الا في حاله موافقه الطبيب علي ذلك.

قبل البدء بال (استيلارا) , اخبر طبيبك لو انك تعتقد انك مصاب بعدوي او لديك اعراض الاصابه بالعدوي مثل :

- حمي, تعرق , بروده شديده
- الم بالعضلات
- كحه
- ضيق بالتنفس
- دم بالبلغم
- نقص الوزن
- تقرحات او احمرار او تقرحات بالجلد في جسدك
- اسهال او الم بالمعده
- حرقان اثناء التبول او التبول اكثر من المعتاد
- احساس بالتعب الشديد
- تعالج من عدوي
- تصاب بعدوي بطريقه متكرره
- مصاب بالسل, او لديك تواصل مع شخص مصاب بالسل

بعد العلاج بال (استيلارا) , اتصل بطبيبك في الحال في حاله وجود اعراض الاصابه بالعدوي (انظر بالاعلي)

ان ال (استيلارا) ممكن تؤدي الي زياده تعرضك للعدوي او تجعل اصابتك بها اشد.
ان المرضي الذين لديهم مشاكل جينيه حيث ان جسمهم لا ينتج البروتين انترليوكين 12 (IL12) و انترليوكين 23 (IL23) عرضه للاصابه بعدوي شديده, هذه العدوي ممكن ان تنتشر بالجسم كله مسببه الوفاه. و انه من غير المعلوم ان المرضي علي ال (استيلارا) سوف يحدث لهم هذه العدوي , ولكن هذا لتأثير ال (استيلارا) علي هذه البروتينات بالجسم.

السرطانات :

استيلارا ممكن ان يؤدي الي نقص فعاليه مناعه الجسم و يزيد من احتماليه الاصابه بالسرطانات. اخبر طبيبك لو انك قد اصبت من قبل بالسرطان. بعض المرضي علي ال (استيلارا) و لديهم عوامل الخطر للاصابه بسرطان الجلد, اصيبوا ببعض انواع سرطان الجلد. خلال علاجك بال (استيلارا) اخبر طبيبك في حاله اي ملاحظتك عن اي نمو جلدي حديث.

متلازمه اعتلال بيضاء الدماغ الخلفي العكوس(RPLS) :

هو متلازمه نادره الحدوث تؤثر علي المخ و ممكن تؤدي الي الوفاه , سببها غير معروف ولو تم الاكتشاف المبكر لها ممكن ان تعالج, معظم المرضي تم علاجهم . اخبر طبيبك مباشره لو لديك او ساءت لديك المشاكل الطبيه الاتيه منه :

صداع او صرع او ضعف الادراك او اي مشاكل بالرؤيا .

ما هو استيلارا ؟

استيلارا هو عقار يصرف بوصفه طبيه لعلاج المرضى البالغين من 18 عام فاكثر الذين يعانون من :

الصدفيه المتوسطه الي شديده , التي تؤثر بمساحات كبيره أو متعدده بالجسم , و الذين من الممكن ان يأخذوا الحقن أو الاقراص من العلاجات التقليديه او العلاج الضوئي (العلاج عن طريق الاشعه فوق البنفسجيه فقط او مع الاقراص).

استيلارا ممكن ان يؤدي التحسن من الصدفيه و لكن ممكن ان يؤدي الي تقليل قدره الجسم المناعيه لمقومه العدوي . وهذا ممكن ان يؤدي ايضا زياده احتماليه الاصابه بانواع من السرطان .

من غير المعروف امان الاستخدام بالنسبه للاطفال.

من هو الذي لا يجب عليه أخذ ال (استيلارا) ؟

لا يجب ان تأخذ ال (استيلارا) لو لديك حساسيه لل يوستكينوماب أو اي من الاضافات المستخدمه لتحضير (استيلارا). انظر لنهايه الدليل لثري الدليل الكامل للاضافات المستخدمه لتحضير الاستلارا.

ماذا يجب ان اخبر الطبيب قبل البدء بالعلاج بال (استيلارا) ؟

قبل العلاج بال (استلارا) اخبر طبيبك لو:

- لديك او ظهرت اي اعراض من التي ذكرت في الفقره " ما هي اهم المعلومات الواجب معرفتها عن استيلارا"
- لديك اي نوع من الحساسيه لل(استيلارا) أسأل الطبيب لو انك غير متأكد.
- لديك حساسيه للاتكس. حيث ان الغطاء للابره مصنوع من اللاتكس.
- حصلت مؤخرا او من المتوقع ان تحصل علي تطعيم حي. اخبر الطبيب حيث ان الفيروسات الموجوده في بعض التطعيمات ممكن ان تنتشر للمرضي ذو المناعه المنخفضه, و ممكن ان تؤدي الي مشاكل خطيره. لا يجب ان تطعم بتطعيم ال BCG خلال عام قبل البدا بالعلاج او بعد التوقف من العلاج باستيلارا.
- لديك اي تقرحات جديده او تغيير في المناطق المصابه بالصدفيه.او المناطق السليمه.
- تحصل او حصلت علي جرعات مضاده للحساسيه , خاصه للتحسس الخطير. حيث ان جرعات الحساسيه ممكن ان لا تكون بنفس الكفاءه اثناء العلاج بالاستيلارا و ممكن الممكن ان يؤدي الي التحسس من جرعه مضاد التحسس المأخوذه.
- تأخذ او سوف تأخذ العلاج الضوئي.
- لديك اي مشاكل طبيه اخري
- حامل او تخططين للحمل, حيث انه من غير المعروف تأثير الاستيلارا علي الاجنه. و يجب علي الطبيب ان يقرر ان كنتي ستستمرين في اخذ استيلارا.
- ترضعين او تخططين للرضاعه, يعتقد ان استيلارا يمر الي حليب الثدي ولا يجب الرضاعه اثناء اخذ الاستيلارا بدون التحدث الي الطبيب.

اخبر طبيبك بكل العلاجات التي تاخذها, التي يتم صرفها عن طريق الوصفه الطبيه او حتي التي بدون وصفه مثل الفيتامينات او المكملات العشبيه.

كيف استخدم الاستيلارا ؟

- استخدم الاستيلارا كما اخبرك طبيبك
- لو ان الطبيب اخبرك انك يجب ان تاخذ الاستيلارا بالمنزل فيجب ان تعطي انت او احد مقدمي الرعايه لك التدريب الكافي لكيفيه الحقن عن طريق طبيبك او التمريض.
- استيلارا يعطي في صورته حقن تحت الجلد, في العضد او الفخذ او الاليه او في منطقه البطن
- لا تحقن الاستيلارا في منطقه متورمه او محمره او ملتهبه.
- استخدم منطقه حقن مختلفه في كل مره تحقن فيه الاستيلارا.
- اخبر الطبيب فورا في حاله اخذ جرعه اكبر من الموصي بها.
- كن منيقظا لمواعيد المتابعه.
- اقرء التوجيهات التفصيليه للاستخدام الموجوده بأخر هذا الدليل للتوجيهات عن كيفيه عمليه الحقن و التخلص من الابره و السرنجات المستخدمه.

ماذا علي تجنبه عند استخدام الاستيلارا ؟

لا يجب عليك اخذ تطعيم حي عند اخذك الاستيلارا انظر الي " ماذا يجب ان اخبر الطبيب قبل البدء بالعلاج بال (استيلارا) ؟"

ما هي الاعراض الجانبيه المحتمله من استخدام استيلارا ؟

استيلارا ممكن ان يسبب اعراض جانبيه شديده, منها :

انظر الي " ما هي اهم المعلومات الواجب معرفتها عن استيلارا"

● حساسيه شديده ممكن ان تحدث مع الاستيلارا اطلب المساعده الطبيه في حاله حدوث اي من اعراض تفاعل الحساسيه من:

- احساس بفقدان الوعي
- انتفاخ بالوجه او الجفون او اللسان او الحلق.
- مشاكل بالتنفس او ضيق بالحلق.
- ضيق بالصدر
- طفح جلدي.

الاعراض الجانبيه شائعه الحدوث مع الاستيلارا :

- عدوي الجهاز التنفسي
- صداع
- تعب

هذه ليست كل الاعراض الجانبيه المحتمله اخبر الطبيب باي عرض جانبي قد يسبب لك الضيق. و للمعلومات استشر الطبيب أو الصيدلي.

كيف أحفظ الاستيلارا ؟

● تحفظ بالثلاجه في درجه حراره (2-8) درجه مؤيه في علته الاصليه حتى الاستعمال.

● تحفظ حقن الاستيلارا للاعلي

● تحمي من التعرض للضوء

● لا تجمد

● لا تهز الاستيلارا

● تخلص من اي كميته غير مستخدمه من الاستيلارا.

احفظ الاستيلارا و كل الادويه بعيدا عن متناول الاطفال.

معلومات عامه عن الاستيلارا .

الادويه في بعض الاحيان توصف لغير الغرض الموجود في دليل الدواء. لا تستخدم الاستيلارا لحاله غير الموصوف لها من قبل

الطبيب. لا تعطي الاستيلارا للأخرين الذين لديهم نفس الاعراض دون استشارتهم للطبيب حيث ان هذا ممكن ان يؤذيهم.

لمعرفه معلومات اكثر عن الاستيلارا استشر طبيبك او الصيدلي .

ما هي المكونات الموجوده بحقته الاستيلارا ؟

الماده الفاعله : يوستكينوماب

مواد خامله : ال-هيسيتدين , ال-هيسيتدين مونوهيدروكلوريد مونوهيدرات, بولي سوربات80 و سكروز

هذا الدليل تم الموافقه عليه من هيئه الغذاء و الدواء السعوديه.

للابلاغ عن اي اشتباه للاعراض الجانبيه يجب ان تبلغ

الهيئه السعوديه للغذاء و الدواء (المركز الوطني للتبقيظ والسلامه الدوائيه)

بريد الكتروني : npc.drug@sfd.gov.sa أو فاكس رقم : 966 11 2057662 أو عن طريق الموقع : <http://ade.sfd.gov.sa/>

أو الاتصال بالمكتب العلمي للشركه علي :

بريد الكتروني : gcc-pv2@its.jnj.com او فاكس رقم : 966 11 2153190