

بطاقة المريض
أكسيلا (تيريفلونوميد) 14 ملغم
أقراص مغلفة

توفر بطاقة المريض معلومات مهمة حول مخاطر أكسيلا (تيريفلونوميد). احتفظ به في مكان آمن وأظهره لأي طبيب أو أخصائي رعاية صحية يعالجك. يجب عليك أيضًا قراءة نشرة معلومات المريض لمزيد من المعلومات.

اسم المريض:

تارikh وصف تيريفلونوميد لأول مرة:

المستشفى:

اسم طبيب الأعصاب:

رقم هاتف الطوارئ لطبيب الأعصاب:

أعراض جانبية مهمة:

يقلل تيريفلونوميد من نشاط الجهاز المناعي (جهاز المناعة). في بعض الأشخاص، يمكن أن يسبب تيريفلونوميد تلف في الكبد (التهاب الكبد) وقد يقلل أيضًا من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدو (الخلية المتعادلة) والصفائح الدموية التي تشارك في تختثر الدم. يجب فحص وظائف الكبد وضغط الدم بانتظام أثناء العلاج بالتيريفلونوميد ويجب فحص تعداد الدم الكامل إذا لزم الأمر. يجب أيضًا فحص هذه الاختبارات قبل بدء العلاج.

إذا كان لديك أي من الآثار الجانبية التالية، يرجى الاتصال بطبيبك على الفور:

- اصفرار الجلد أو اصفرار بياض العين (اليرقان)، الغثيان أو القيء غير المبرر، ألم في البطن أو بول أغمق من المعتاد. هذه هي أعراض مشاكل في الكبد.
- علامات العدو بما في ذلك الحمى والرعشة والألم عند التبول أو الارتباك.

المرضى النساء ممن في سن الإنجاب:

- لا يجب استخدام التيريفلونوميد أثناء الحمل أو في النساء في سن الإنجاب إذا لم يكن يستخدمون وسيلة فعالة لمنع الحمل لأنه يمكن أن يسبب تشوهات خلقية خطيرة.
- لا تبدي بالтирيفلونوميد عندما تكونين حاملاً أو تعتقد أنك حامل. قد يطلب منك طبيبك إجراء اختبار الحمل للتأكد.
- استعمل وسائل منع حمل فعالة أثناء تناول تيريفلونوميد. أخبر طبيبك إذا كنت ترغبين في تغيير طريقة منع الحمل أو التخطيط للحمل بعد التوقف عن العلاج بالтирيفلونوميد. يجب عليك أيضًا مناقشة الأمر مع طبيبك إذا كنت مرضعة أو تخاطلين للرضاعة الطبيعية.
- إذا كنت تشكين في أنك حامل أثناء تناولك أكسيلا أو بعد عامين من التوقف عن العلاج، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور لإجراء اختبار الحمل. إذا أكذ لك الاختبار أنك حامل، فقد يقترح طبيبك العلاج بأدوية معينة لتسريع إزالة مادة التيريفلونوميد من جسمك، لأن هذا يقلل من المخاطر على طفلك.

لإبلاغ عن الآثار الجانبية:
إذا ظهرت عليك أي أعراض جانبية ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو المرضة. يشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة.

يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً عن طريق الاتصال:
الممثل المحلي / ام اس فارما السعودية
طريق الملك عبد العزيز- حي الريبع- جراند سنتر الطابق الاول- أمام مستشفى المملكة
ص.ب. 54850 الرياض ، 11524 المملكة العربية السعودية

- هاتف: 966112790122 + تحويلة. 6013

- الفاكس: +966112790122

- الجوال: +966548933555

المركز الوطني للتبيظ والسلامة الدوائية (NPC) : (الهيئة العامة للغذاء والدواء)

- مركز اتصال الهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999

- هاتف مجاني: 8002490000

- فاكس: +966-11-2057662

- البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

- الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfda.gov.sa>

المراجع:

[1] Axyla®Leaflet

[2] Teriflunomide patient card Medicines.org.uk. [cited 25 February 2021]. Available from: <https://www.medicines.org.uk/emc/rmm/293/Document>