

الأعراض الجانبية الشائعة والنادرة للتطعيمات

قطاع الدواء

الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي

أغسطس ٢٠٢٢

مقدمة

اللقاحات تمنع حدوث العديد من الأمراض على سبيل المثال (شلل الأطفال) ولذلك فإن قرار عدم تحصين الطفل ينطوي أيضا عليه بالخطر ويمكن أن يضع الأطفال وغيرهم ممن يتصلون معه لخطر الإصابة بأمراض قد تكون قاتلة والتي يمكن الوقاية منها باللقاحات وهي تحول دون الإصابة تقريبا من مليونين إلى ثلاثة ملايين حالة وفاة كل عام ويمكن تجنب وقوع أكثر من مليون ونصف حالة وفاة إذا تحسنت نسبة الأطفال الذين يتلقون اللقاحات الموصى بها عالمياً.

اللقاح مثل أي دواء يمكن ان يتسبب في أعراض جانبية نتيجة استخدامه وتحسن هذه الأعراض خلال غضون أيام ومعظم الأعراض الجانبية التي تسببها اللقاحات خفيفة وغير قوية ويتم رصد ومتابعة سلامة ومأمونية اللقاحات بشكل مستمر.

تحدث الأعراض الجانبية الشائعة للقاحات بعد التطعيم مباشرة وتستمر من يوم إلى يومين ولا تلزم العلاج وبعض الأشخاص لا يحصلون على أعراض جانبية جراء استخدام اللقاحات على الإطلاق.

أبرز الأعراض الجانبية الشائعة للقاحات:

- الحرارة.
- الغثيان.
- الاستفراغ.
- التهاب الحلق.
- الصداع.
- آلام في المفاصل والعضلات وكذلك آلام في البطن.
- الكحة.
- الاسهال.
- الحساسية كالحكة والاحمرار وانتفاخ الجلد.
- الإرهاق.

أما عن أبرز الأعراض الجانبية النادرة مع بعض اللقاحات:

- التشنج
- الإغماء
- انخفاض عدد الصفائح الدموية بشكل مؤقت مما قد يؤدي الى حدوث النزيف.

في حال ظهور أي أعراض جانبية، يتم إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق مركز الاتصال الموحد

١٩٩٩، أو النظام الإلكتروني لرصد الأعراض الجانبية (تيقظ) [/https://ade.sfda.gov.sa](https://ade.sfda.gov.sa)

وللحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بسلامة اللقاحات من خلال الرابط ادناه



المصادر

١. منظمة الصحة العالمية (WHO) <https://www2.health.vic.gov.au/about/publications/factsheets/vaccine-side-effects>
٢. المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية (CDC) <http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-effects.htm>