

إيداسيو® - أداليموماب

بطاقة تذكير المريض

تستعرض هذه البطاقة معلومات السلامة الهامة،
والتي لابد وأن تكون على دراية كاملة بها قبل
بدء استخدامه وأثناء العلاج بدواء إيداسيو®.

Idacio®

Version 1.0, dated: Jan 2021

في حالة الاشتباه بوجود أي آثار سلبية عند استخدام الدواء،
لابد من الإبلاغ على الفور عبر جهات الاتصال الآتية:

◀ الممثل المحلي لشركة فريستنيوس كابي:

شركة فيصل مساعد السيف السعودية للأدوية

- الفاكس: +966 11 2789829

- الهاتف: +966 50 523 5998

- البريد الإلكتروني: Ali.alharbi@elseif.com.sa

◀ المركز الوطني للبيقظ الدوائي (NPC)

- رقم مركز الاتصالات لـ "الهيئة العامة للغذاء والدواء" (SFDA) : 19999

- البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

- الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfda.gov.sa>

إيداسيو® هو دواء يهدف إلى معالجة بعض الأمراض محددة، والتي تؤثر على جزء من الجهاز المناعي لدى مريض. وفي حين أن دواء **إيداسيو®** من الممكن أن يكون عالاً لغاية في علاج هذه الأمراض، إلا أنه من الممكن أيضاً أن يظهر على بعض المرضى واحد أو أكثر من الآثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء. ولذلك، من الهام للغاية استشارة الطبيب فيما يتعلق بالفوائد المتوقعة والآثار

- كما أنه من الممكن أيضاً اختلاف هذه الأعراض من شخص لآخر.

نهدف هذه البطاقه إلى تعريف المستخدم ببعض الآثار جانبية المحتملة لدواء **إيداسيو®**.

كما تتضمن البطاقه استعراض بعض الآثار الجانبية خطيرة التي قد تحدث مثل الإصابة بكل من: العدوى، سرطان، ومشكلات الجهاز العصبي.

ولا تعبر هذه الأمثلة المذكورة أعلاه عن كافة الآثار جانبية المحتملة لدواء **إيداسيو®**.

يل بدم العلاج باستخدام دواء **إيداسيو®**

لذلك، لا يُ

إذا كنت تعاني من عدوى، وإذا كان لديك اعراض
عدوى ما (مثل: الحمى، والجروح، والشعور بالتعب،
مشكلات الأسنان).

إذا كنت تعاني من أي مرض من أمراض القلب.

إذا كنت تعاني من مرض الدرن، وإذا كنت على اتصال
شيق مع شخص يعاني من مرض الدرن.

إذا كنت تعاني من مرض السرطان حالياً أو في أي وقت
ضد.

إذا كنت تعاني من أي تنميم أو وخز، وإذا كنت تعاني
من مشكلة ما تؤثر على الجهاز العصبي لديك (مثل:
إصابة بمرض التصلب المتعدد).

وفي هذا الصدد، لابد وأن يقوم الطبيب المعالج بإجراء
فحص طبي من أجل التأكد من عدم وجود أي علامات أو
عراض للإصابة بمرض الدرن قبل البدء في استخدام دواء
إيداسيو®؛ فقد تكون بحاجة إلى تلقي العلاج لمرض
درن أولاً قبل البدء في تعاطي دواء إيداسيو®.

في حالة تعاطي دواء **إيداسيو®** أثناء فترة الحمل، من بهام لغاية استشارة طبيب الأطفال المختص قبل تلقي مولود لأي تطعيمات. كما يجب ألا يتلقى المولود أي تطعيمات حية (مثل: لقاح بي.سي.جي. BCG)، المستخدم لمكافحة إصابة بمرض الدرن)، وذلك طوال مدة (5) أشهر من تاريخ حياة.

- ي سبيل التأكيد من عمل دواء إيداسيو® على نحو ملائم
نماء العلاج باستخدام دواء إيداسيو®

بسكن امن لدى المريض، لا بد من المتابعة الدائمة مع طبيب بشكل منتظم، وذلك من أجل مناقشة حالة المريض؛ ولا بد من إخبار الطبيب على الفور في حالة حدوث أي تغيرات لحالة المريض.

لذلك، لا بد من إبقاء الطبيب على دراية واطلاع دائم كييفية عمل دواء **إيداسيو®** لدى المريض.

سوف يساعد ذلك على ضمان تلقي الرعاية الطبية الصحيحة، كما سوف يؤدي ذلك أيضاً إلى الحد من وجود أي أعراض غير عادية قد تظهر لديك؛ حيث

وفي حالة إخبار الطبيب على الفور، سوف يكون من ممكناً السيطرة على العديد من الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك الإصابة بأنواع العدوى المختلفة.

وفي حالة الإصابة بعرض جانبي ما، سوف يقرر طبيبك إذا كان يجب موافلته أو إيقاف العلاج باستخدام دواء **بداسيو®** ولذلك، من الهام للغاية استشارة الطبيب عرفة ما هو مناسب للمرتضى.

وحيث أنه من الممكن حدوث بعض الآثار الجانبية بعد تناول الجرعة الأخيرة من دواء إيداسيو[®]، لذا، لا بد من استشارة الطبيب في حالة حدوث أي مشكلات قد تظهر

وَفِيمَا يَتَعْلَقُ بِالْمَوَالِيدِ حَدِيثُ الولادةِ الَّذِينَ كَانُوا قَدْ
رَفَقُتْ أَمْهَاتِهِمْ جَرِعَاتٍ مِّنْ دَوَاءِ **إِيَادِاسِيُّو®** أَثْنَاءَ فَتْرَةِ الْحَمْلِ
عَلَيْهِمْ، فَيَجِبُ أَلَا يَتَلَقَّى هُؤُلَاءِ الْمَوَالِيدِ أَيْ لِقَاحًا حَيَّةً عَلَى
مَدَارِفَرْتَةِ (٥) أَشْهُرٍ مِّنْذِ تَارِيخِ تَلَقِّيِ الْأَمْ لِلْجَرْعَةِ الْأُخْرَى مِنْ
إِيَادِاسِيُّو®

فـ حـالـةـ ظـاهـرـاءـانـ حـالـقـطـنـ قـحـانـقـلـاـكـ كـمـاـ يـجـبـ أـيـضاـ إـخـبـارـ الطـبـيـبـ فـيـ حـالـةـ حدـوثـ أيـ مـاـ يـلـيـ:

من الممكن ظهور بعض الآثار الجانبية الخطيرة لدى بعض المرضى ومن يتعاطون دواء إيداسيو® بما في ذلك كل حالات البداء في تعاطي أي أدوية جديدة.

20

إذا كنت تعان
من مشكلة ما

وفي هذا الصدد، لابد وأن يقوم الطبيب المعالج بإجراء حص طبي من أجل التأكد من عدم وجود أي علامات أو عراض للإصابة بمرض الدرن قبل البدء في استخدام دواء **إيداسيو®**؛ فقد تكون بحاجة إلى تلقي العلاج لمرض درن أولاً قبل البدء في تعاطي دواء **إيداسيو®**.

يمكنك تلقي التطعيمات المختلفة، فيما عدا اللقاحات حيّة.

يُوصى به تطعيم المولود لأي تطعيمات، كما يجب ألا يتلقى المولود أي تقاولات حية (مثل: لقاح بي.سي.جي. BCG)، المستخدمة لمكافحة الإصابة بمرض الدرن، وذلك طوال مدة (5) أشهر من تاريخ تلقي الحقن الأخير من دواء **إيداسيو®** أثناء فترة الحمل.

ي سبيل التأكيد من عمل دواء **إيداسيو®** على نحو ملائم بشكل آمن لدى المريض، لابد من المتابعة الدائمة مع طبيب بشكل منتظم، وذلك من أجل مناقشة حالته

عذوٰث أي تغييرات لحالتك المريض.
لذلك، لا بد من إبقاء الطبيب على دراية واطلاع دائم
كيفية عمل دواء **إيداسيو®** لدى المريض.
ومن الهام للغاية الاتصال بالطبيب على الفور في حالة
وجود أي عراض غير عادي قد تظهر لديك؛ حيث

سوف يساعد ذلك على ضمان تلقي الرعاية الطبية
صحيحة، كما سوف يؤدي ذلك أيضاً إلى الحد من
ris تطور هذا العرض الجانبي إلى الأسوأ.
ففي حالة إخبار الطبيب على الفور، سوف يكون من
الصعب تحديد ما إذا كان العرض مرتبطاً بالأشد أو الخفيف.

محتملة، بما في ذلك الإصابة بأنواع العدوى المختلفة.
وفي حالة الإصابة بعرض جانبي ما، سوف يقرر طبيبك
إذا كان يجب مواصلة أو إيقاف العلاج باستخدام دواء
بداسيو® ولذلك، من الهام للغاية استشارة الطبيب
عمره ما هو مناسب للمرضى.

وحيث أنه من الممكن حدوث بعض الآثار الجانبية بعد تناول الجرعة الأخيرة من دواء **إيداسيو®**، لهذا، لا بد من استشارة الطبيب في حالة حدوث أي مشكلات قد تظهر في خلال مدة (70) يوماً بعد تلقي الحقن الأخير من

وَفِيمَا يَتَعْلَقُ بِالْمَوَالِيدِ حَدِيثِي الولادةِ الَّذِينَ كَانَتْ قَدْ
عَثَتْ أَمْهَاتِهِمْ جَرَعَاتٍ مِنْ دَوَاءِ **إِيدَاسِيُو®** أَثْنَاءَ فَتْرَةِ الْحَمْلِ
عَهُمْ، فَيُجَبُ أَلَا يَتَقْرِبُ هُؤُلَاءِ الْمَوَالِيدِ أَيْ لِتَقْاحَاتِ حَيَّةٍ عَلَى
دَارِفَتْرَةِ (٥) أَشْهُرٍ مِنْذِ تَارِيخِ تَلْقِيِ الْأَمْرِ لِلْجَرْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ
وَاءِ **إِيدَاسِيُو®**.

كما يجب أيضاً إخبار الطبيب في حالة حدوث أي مما يلي:
في حالة ظهور أي حالة طبية جديدة لديك.

أثار جانبية (متابعة)

السرطان

- عند تعاطي دواء **إيداسيو®**، قد تصبح فرص الإصابة بأنواع معينة من السرطان أكثر احتمالاً.

مشكلات الجهاز العصبي

- تتم الإبلاغ عن ظهور مشكلات جديدة فيما يخص الجهاز العصبي أو تدهور حالة بعض المشكلات الموجودة بالفعل لدى بعض الأفراد من يتعاطون دواء **إيداسيو®**; وقد شمل ذلك مرض "التصلب المتعدد".

قصور القلب

لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة النشرة الداخلية لعبوة دواء **إيداسيو®** حيث أن الآثار المذكورة أعلاه لا تمثل كافة الآثار الجانبية المحتملة التي قد تحدث أثناء العلاج باستخدام دواء **إيداسيو®**.

في حالة ظهور أي من الأعراض الآتية بمحاجبة هذه الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، فلابد من الاتصال بالطبيب المعالج أو طلب الرعاية الطبية على الفور:

الأعراض المصاحبة للعدوى

- الحمى، والتشعيرية، والتعرق بشكل غير طبيعي، والشعور بالآلام أو التعب بشكل أكثر من المعتاد، والشعور بالمرض (مثل: الغثيان أو التقيق)، والآسها، وألم المعدة، وفقدان الشهية أو فقدان الوزن، والكحة أو سعال الدم أو سعال المخاط، وضيق التنفس، ومشكلات التبول، وتقرحات الجلد، والجرح، وألم العضلات، ومشكلات الأسنان.

الأعراض المصاحبة للسرطان

- التعرق الليلي، وتوهُّر الفقد الليلي (توهُّر الفقد) في الرقبة والإبطين أو الفخذ أو أي مناطق أخرى بالجسم، وفقدان الوزن، وظهور آفات جلدية جديدة أو حدوث تغير بالأفات الجلدية الموجودة لديك بالفعل (مثل: الشامات أو النمش)، وحالات الحكة الشديدة غير المبررة.

الأعراض المصاحبة لمشكلات الجهاز العصبي

- التنميم أو الوخز، وتفيرات الرؤيت، ووهن العضلات، وحالات الدوار والدوخة غير المبررة.

ولذلك، لابد من إخبار الطبيب المعالج على الفور في حالة ظهور أي أعراض غير اعتيادية أثناء العلاج باستخدام دواء **إيداسيو®**. كما أن هذه الأعراض المذكورة أعلاه لا تمثل كافة الأعراض المحتملة لهذه الآثار الجانبية الخطيرة.

المعلومات التالية موجهة لكل من المريض وأخصائي الرعاية الصحية المعنيين بتقديم الرعاية الطبية أو العلاج للمريض:

فحوصات وعلاج مرض الدرن

- ضع علامة بالمربيع في حالة إن كنت قد خضعت لفحص مرض الدرن في أي وقت مضى.

نعم. (يرجى مراجعة الطبيب في حالة عدم التأكد).

- ضع علامة بالمربيع في حالة إن كانت قد ثبتت إيجابية فحصك لمرض الدرن من قبل.

نعم. (يرجى مراجعة الطبيب في حالة عدم التأكد).

- ضع علامة بالمربيع في حالة إن كنت قد تعاطيت أي حبوب من قبل لمعالجة أو منع الإصابة بمرض الدرن.

نعم. (يرجى مراجعة الطبيب في حالة عدم التأكد).

* لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة النشرة الداخلية لعبوة دواء **إيداسيو®** وإن كان لديك أي استفسارات أخرى، يمكنك استشارة الطبيب أو أي أخصائي آخر للرعاية الصحية.

ملاحظات (التعليقات والأسئلة الموجهة للطبيب)
