

بطاقة تنبيه عقار مابثيرا® الخاصة بالمرضى المصابين بأمراض غير الأورام

لماذا تم إعطائي هذه البطاقة؟

متى يجب تجنب العلاج بعقار مابثيرا؟

قد يجعلك هذا الدواء أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. تخبرك هذه البطاقة بما يلي:

لا تخضع للعلاج بعقار مابثيرا إذا كنت مصابا بعدوى نشطة أو مشكلة خطيرة في جهازك المناعي.

- ما الذي تحتاج الى معرفته قبل استخدام عقار مابثيرا®؟
- ما هي علامات الإصابة بعدوى؟
- ما الذي عليك فعله إذا اعتقدت أنك قد تكون أصبت بعدوى؟

كما تتضمن اسمك واسم الطبيب ورقم هاتفه على الجهة الخلفية؟

ماهي علامات الإصابة بعدوى؟

ابحث عن علامات العدوى المحتملة التالية:

- الحمى أو السعال طوال الوقت
- فقدان الوزن.
- ألم دون أن تجرح نفسك
- شعور بالتوعك أو الخمول بشكل عام.

إذا أصبت بأي مما سبق، فأخبر طبيبك أو الممرض(ة) الخاص (ة) بك فوراً. عليك أيضا إخبار طبيبك بشأن علاجك بعقار مابثيرا.

ماذا أفعل بهذه البطاقة؟

- احتفظ بهذه البطاقة معك دائما وضعها في محفظتك أو كيس النقود على سبيل المثال.
- أظهر هذه البطاقة إلى أي طبيب أو ممرض (ة) أو طبيب أسنان تزوره وليس فقط الأخصائي الذي وصف لك عقار مابثيرا.

احتفظ بهذه البطاقة معك لمدة عامين بعد تلقيك لآخر جرعة من عقار مابثيرا. ذلك لأن الآثار الجانبية قد تحدث بعد عدة أشهر من تلقك العلاج.

ما الذي عليه معرفته بعد؟

أين يمكنني تلقي المزيد من المعلومات؟

انظر نشرة عبوة عقار مابثيرا ل لاطلاع على مزيد من المعلومات.

تأكد من إحضار قائمة بجميع أدويةك معك عند زيارتك لأحد أخصائيي الرعاية الصحية.

يرجى التحدث إلى طبيبك أو الممرض (ة) الخاص (ة) بك إذا كان لديك أية أسئلة بشأن المعلومات الواردة في هذه البطاقة.

في حالات نادرة قد يسبب عقار مابثيرا عدوى خطيرة في المخ تسمى «اعتلال بيبضاء الدماغ عديد البور المترقي». قد تكون هذه العدوى مميتة.

- ارتباك، فقدان الذاكرة أو مشاكل في التفكير
- فقدان التوازن أو حدوث تغير في طريقة المشي أو التحدث
- انخفاض القوة أو الإصابة بضعف على أحد جانبي جسمك.
- عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر.

إذا أصبت بأي مما سبق، فأخبر طبيبك أو الممرض (ة) الخاص (ة) بك فوراً. عليك أيضاً إخبارهم بشأن علاجك بعقار مابثيرا.

تاريخ بدء العلاج وبيانات الاتصال

تاريخ التسريب الأول: / / ٢٠ تاريخ آخر عملية تسريب: / / ٢٠

اسم الطبيب: اسم المريض:

بيانات الاتصال الخاصة بالطبيب: