

# بطاقة تنبيه للمريض

## بلاسييف® (أبيكسابان)

احمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات

اعرض هذه البطاقة على الصيدلي وطبيب الأسنان وأي من متخصصي الرعاية الصحية الآخرين الذين يقدمون لك العلاج.

### معلومات للمرضى

- تناول بلاسييف® بانتظام حسب تعليمات الطبيب المعالج.
- إذا فاتتك إحدى الجرعات، فتناولها بمجرد تذكرها ومن ثم واصل اتباع جدول جرعاتك المعتاد.
- لا تتوقف عن تناول بلاسييف® دون التحدث مع طبيبك، نظرًا لأنك قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو غيرها من المضاعفات. (انظر النشرة الطبية المرفقة).
- يساعد بلاسييف® على تخفيف كثافة دمك. إلا أن هذا قد يزيد من خطر التعرض للزيف. (يمكنك الرجوع للنشرة الداخلية).
- علامات وأعراض الزيف تتضمن كدمات أو الزيف تحت الجلد أو براز أسود اللون، وجود دم في البول، نزيف الأنف، الدوار، التعب أو الشحوب، الصداع الشديد المفاجئ، خروج دم مع السعال أو خروج دم مع القيء.
- إذا لم يتوقف الزيف من تلقاء نفسه، فعليك طلب الرعاية الطبية فورًا.
- إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية، فأخبر طبيبك بأنك تتناول بلاسييف®.

### للإبلاغ عن الأعراض الجانبية

شركة مصنع الرأي للصناعات الدوائية:  
هاتف: +966 12 2888949  
البريد الإلكتروني: [PV@alraipharma.com](mailto:PV@alraipharma.com)  
الموقع الإلكتروني: [www.alraipharma.com](http://www.alraipharma.com)

المركز الوطني للتبليغ والسلامة الدوائية  
الاتصال الموحد: 19999  
البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfd.gov.sa](mailto:npc.drug@sfd.gov.sa)  
الموقع الإلكتروني: [www.sfd.gov.sa/npc](http://www.sfd.gov.sa/npc)

"المزيد من المعلومات اسأل الطبيب أو الصيدلي"  
"المعلومات الواردة في هذه المادة هي لأغراض تثقيفية وتعليمية فقط، ولا غنى عن النصيحة التي يقدمها الطبيب أو أي مختص مؤهل للرعاية الصحية"



## أنا أخضع لعلاج مضاد للتجلط باستخدام بلاسييف® (أبيكسابان) لمنع تكوّن الجلطات الدموية

يُطلب من المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية الإبلاغ عن أي تفاعلات ضارة مشتبه بها عبر نظام الإبلاغ الوطني.

### معلومات لمتخصصي الرعاية الصحية

- بلاسييف® (أبيكسابان) هو مضاد للتجلط يتم تناوله عن طريق الفم ويعمل عن طريق تثبيط تلقائي مباشر للعامل العاشر النشط.
- قد يزيد بلاسييف® من خطر الإصابة بنزيف. في حالة حدوث نزيف شديد، ينبغي إيقاف بلاسييف® على الفور.
- لا يتطلب العلاج باستخدام بلاسييف® لمتابعة روتينية. قد تكون مقايسة الكميّة المعاييرة لمضاد العامل العاشر النشط مفيدة في حالات استثنائية، على سبيل المثال، الجرعة الزائدة والجراحة الطارئة.
- (لا يوصى باختبارات التجلط بزمن البروثرومبين (PT) ونسبة تجلط الدم (INR) وزمن الثرومبوبلاستين الجزئي المنشط (aPTT) – انظر ملخص خصائص المنتج.

### يُرجى إكمال هذا القسم أو اطلب من طبيبك القيام بذلك

الاسم: \_\_\_\_\_

تاريخ الميلاد: \_\_\_\_\_

داعي الاستخدام: \_\_\_\_\_

الجرعة: \_\_\_\_\_ ملجم مرتين يوميًا

اسم الطبيب: \_\_\_\_\_

هاتف الطبيب: \_\_\_\_\_

\* لمزيد من النسخ الرجاء التواصل مع شركة مصنع الرأي للصناعات الدوائية على [PV@alraipharma.com](mailto:PV@alraipharma.com)  
\* هذا المستند تم اعتماده من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

