

ما الذي ينبغي على معرفته حول ريفاروكسابان إس بي سي؟

أخبر مقدم الرعاية الصحية بشأن أي أدوية أخرى تتناولها حالياً أو تناولتها مؤخراً أو قد تتناولها قبل بدء العلاج بدواء ريفاروكسابان.

أخبر مقدم الرعاية الصحية أنك تتناول ريفاروكسابان قبل إجراء أي عملية جراحية أو أي إجراء جراحي.

يعمل ريفاروكسابان إس بي سي على زيادة سيولة الدم، حيث يعمل على منع الإصابة بجلطات دموية خطيرة.

يجب تناول ريفاروكسابان إس بي سي بالضبط كما وصفه لك الطبيب المعالج، ويُرجى الاستمرار والمواظبة على تناول الجرعات المحددة، لضمان الحماية الكاملة من الإصابة بالجلطات الدموية.

يُحظر وقف تناول ريفاروكسابان إس بي سي دون إخبار الطبيب المعالج لك أولاً، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر الإصابة بالجلطات النزيف هو أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً. يُحظر البدء في استخدام ريفاروكسابان إس بي

متى ينبغي على استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بي؟

سي، إذا كنت تعلم أن لديك قابلية للنزيف، دون استشارة الطبيب المعالج لك أولاً. يُرجى إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في الحالات التالية: يرجى إبلاغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فوراً، إذا ظهرت عليك أي علامات أو أعراض حدوث نزيف مثل:

- ◆ شعور بألم.
- ◆ تورم أو تعب.
- ◆ صداع أو دوخة أو ضعف.

ظهور كدمات مفاجئة، نزيف الأنف، نزيف اللثة، جروح تستغرق وقتاً طويلاً حتى يتم إيقاف النزيف. طمث أو نزيف مهبلي أكثر غزارة بشكل أكثر من المعتاد.

وجود دم في البول يجعل لونه وردي أوبني أو تحول لون البراز إلى اللون الأحمر أو الأسود.

بطاقة تنبيه وإخبار المريض

- ريفاروكسابان إس بي سي® ١٠ مجم
- ريفاروكسابان إس بي سي® ١٥ مجم
- ريفاروكسابان إس بي سي® ٢٠ مجم



اللدنية
SPC

- ◆ يُرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات.
- ◆ يُرجى تقديم هذه البطاقة للطبيب المعالج لك أو طبيب الأسنان قبل بدء العلاج.

تمت مراجعة واعتماد هذا الملف من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- ◆ خروج دم مع البصاق أو السعال أو القيء أو خروج مادة تشبه "نفل القهوة".

كيفية يمكنني تناول ريفاروكسابان إس بي سي؟

- ◆ ينبغي تناول ريفاروكسابان كما هو موضح أدناه، لضمان الحصول على الحماية القصوى لمنع الإصابة بتخثر الدم:
 - ١٠ مجم يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه.
 - ١٥ مجم يجب تناوله مع الطعام.
 - ٢٠ مجم يجب تناوله مع الطعام.

يجب الإبلاغ عن الأعراض الجانبية إلى:
المركز الوطني للتقيظ والسلامة الدوائية
الموقع الإلكتروني:
<https://ade.sfda.gov.sa>
الإيميل:
npc.drug@sfda.gov.sa
مركز الإتصال:
١٩٩٩٩

قسم التقيظ الدوائي بشركة سدير للأدوية:
هاتف: ٩٢٠٠٠١٤٣٢
تحويلة: ١٠٧
جوال: ٥٤٦٣٠٥٠٧
إيميل: pharmacovigilance@sudairpharma.com

معلومات لمقدمي الرعاية الصحية:

يُرجى تكملة وتعبئة البيانات التالية

**يرجى تكملة وتعبئة البيانات التالية
للرجوع إليها عند حدوث حالة**

استخدم ريفاروكسابان إس بي سي (ريفاروكسابان) كمضاد لتخثر الدم

♦ لا يجب الاعتماد على النسبة المعيارية الدولية (أحد الفحوصات المعملية لتحديد زمن البروثرومبين) "INR" حيث أنها ليست مقياساً لتحديد مدى فاعالية ريفاروكسابان إس بي سي المضادة لـ تختثر الدم.



SPC
سدی
لندور

الاسم:

هاتف رقم:

صلة القرابة:

اسم الطبيب المعالج:

رقم هاتف الطبيب المعالج:

توقيع الطبيب المعالج: