

# Patient Alert Card

For patients with non-oncology diseases

Show this card to any doctor involved in your treatment.

## Where can I get more information?

See the Truxima® package leaflet for more information.

## Treatment start date

Date of most recent infusion :

.....

Date of first infusion :

.....

## Contact details

Patient's name :

.....

Doctor's name :

.....

Doctor's contact details :

.....

Make sure you have a list of all your medicines when you see a health care professional. Please talk to your doctor or nurse if you have any questions about the information in this card.

If you get any side effects, including any not listed in the package leaflet, talk to your doctor, nurse or pharmacist.

## Why have I been given this card?

This medicine may make you more likely to get infections.

This card tells you:

- What you need to know before having Rituximab.
- What the signs of an infection are.
- What to do if you think you might be getting an infection.

It also includes your name and doctor's name and phone number.

## What should I do with this card?

- Keep this card with you all the time – such as in your wallet or purse.
- Show this card to any doctor, nurse or dentist you see – not just the specialist who prescribes your Rituximab.

Keep this card with you for 2 years after your last dose of Rituximab. This is because side effects can develop several months after you have had treatment.



Truxima®  
Rituximab

## When should I not have Rituximab?

Do not have Rituximab if you have an active infection or a serious problem with your immune system.

Tell your doctor or nurse if you are taking or have previously taken medicines which may affect your immune system; this includes chemotherapy.

## What are the signs of an infection?

Look out for the following possible signs of infection:

- Fever or cough all the time.
- Weight loss.
- Pain without injuring yourself.
- Feeling generally unwell or listless.

**If you notice any of these symptoms, tell a doctor or nurse straight away. You should also tell them about your Rituximab treatment.**

## What else do I need to know?

Rarely Rituximab can cause a serious brain infection, called Progressive Multifocal Leukoencephalopathy or PML. This can be fatal.

- Signs of PML include:
  - Confusion, memory loss or problems thinking.
  - Loss of balance or a change in the way you walk or talk.
  - Decreased strength or weakness on one side of your body.
  - Blurred vision or loss of vision.

If you notice any of these signs, tell a doctor or nurse straight away. You should also tell them about your Rituximab treatment.

▼ This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. You can help by reporting any side effects you may get to the National Pharmacovigilance and Drug Safety Centre (NPC).

**Channels for reporting Adverse Drug Reactions exist, mentioned below, and it is encouraged to use them and report as soon you so experience or become aware of one.**

**The National Pharmacovigilance Center (NPC)**

- Fax: +966-11-205-7662
- SFDA Call Center: 199999
- E-mail: npc.drug@sfd.gov.sa
- Website: <https://ade.sfd.gov.sa/>

And to: **Company Contact Point** Abdulkareem bin Mubarak  
Mobile: +966550017554. Telephone: 00966114173731 Ext. 1086  
Email: SAPV@hikma.com.

# بطاقة تنبيه المريض

للمرضى من دون الامراض السرطانية

قدم هذه البطاقة لطبيبك المعالج

تروكسيما®  
ريتوكسيماب

من أين يمكنني الحصول على معلومات أكثر؟

أنظر الى النشرة بداخل علبة تروكسيما® لمعلومات أكثر

تاريخ بداية العلاج :

تاريخ آخر جرعة حقن وريدي البطئ:

تاريخ أول جرعة حقن وريدي البطئ:

البيانات :

اسم المريض:

اسم الطبيب المعالج:

بيانات الطبيب المعالج:

لماذا يتم اعطائك هذه البطاقة ؟

هذا الدواء قد يزيد احتمالية تعرضك للعدوى أو الالتهابات  
هذه البطاقة تخبرك عن:

- ماذا تحتاج أن تعرف قبل استخدام تروكسيما®.

- ما هي أعراض العدوى؟

- ماذا تفعل في حال إعتقادك تعرضك للعدوى؟

هذه البطاقة تحتوي أيضا على اسمك وإسم طبيبك المعالج ورقم هاتفه.

ما عليك فعله بهذه البطاقة؟

- احتفظ بهذه البطاقة معك طوال الوقت، ضعها معك في المحفظة مثلا .

- اظهر هذه البطاقة لاي طبيب، ممرضة، أو طبيب اسنان، ليس فقط  
للطبيب الذي وصف لك دواء تروكسيما®.

احتفظ بهذه البطاقة لمدة عامين من تاريخ آخر جرعة من تروكسيما®. هذا  
لأن الاعراض الجانبية قد تحدث بعد أشهر من الانتهاء من العلاج.

متي لا استخدم تروكسيما®

إذا كان لديك عدوى أو مشكلة خطيرة بالجهاز المناعي لا تستخدم

تروكسيما®

أخبر طبيبك أو الممرضة ما إذا كنت تستخدم أو قد استخدمت دواء يؤثر  
على الجهاز المناعي وهذا يتضمن العلاج الكيميائي.

أخبر طبيبك المعالج إذا كنت تأخذ أدوية قد تؤثر على المناعة كأدوية  
العلاج الكيميائي مثلا.

ما هي أعراض العدوى؟

إبحث عن العلامات المحتملة التالية للعدوى:

- الحمى أو السعال طوال الوقت.

- نقص الوزن.

- الألم دون جرح نفسك.

- الشعور بشكل عام بالمرض أو نقص في الطاقة.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور.

عليك أيضاً إخبارهم باستخدامك دواء تروكسيما®.

ماذا أحتاج أن أعرف أيضا؟

نادرًا ما يُحدث تروكسيما® عدوى خطيره بالدماغ التي تسمى اعتلال دماغي

مترق متعدد البؤر (Progressive Multifocal Leukoencephalopathy)

قد يكون هذا قاتل.

علامات PML مثل:

- الارتباك، فقدان الذاكرة أو مشاكل في التفكير.

- فقدان التوازن أو تغيير في طريقة المشي أو الحديث.

- انخفاض القوة أو الضعف على جانب واحد من جسمك.

- عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور.

يجب عليك أيضاً إخبارهم عن علاج تروكسيما® الخاص بك.

تأكد من احضار قائمة بجميع ادويةك عند رويتك لاصصائي العناية الطبية.

تحدث مع طبيبك أو الممرضة إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص معلومات

في هذه البطاقة .

إذا ظهر لديك أي عرض جانبي، حتى وإن لم يكن مذكوراً في النشرة التي

في العلبة، أخبر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي بها.

▼ هذا المنتج الطبي يخضع للمراقبة الإضافية. سيسمح ذلك بالكشف السريع عن معلومات السلامة

الجديدة. يمكنك المساعدة بالإبلاغ عن أي عرض جانبي الى هيئة الغذاء والدواء - المركز

الوطني للتبليغ والسلامة الدوائية على عنوان البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

والى شركة أدوية الحكمة على عنوان البريد الإلكتروني: SAPV@hikma.com

او رقم الهاتف التالي: ٠٠٩٦٦١١٤١٧٢٧٢١ • تحويلة ١٠٨٦