



أولميينت®

(باريسيتينيب) أقراص

بطاقة تنبيه للمريض

Lilly | RHEUMATOLOGY

تمت الموافقة على وسيلة خفض المخاطر هذه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

7March 2023

بطاقة تنبيه للمريض

الحمل	معلومات للمريض حول OLUMIANT® (baricitinib)
<ul style="list-style-type: none">• لا تأخذي OLUMIANT® إذا كنت حاملاً أو تشكين في أنك حاملاً.• استخدمي وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء تناول OLUMIANT® ولمدة أسبوع بعد التوقف عن العلاج.• أخبري طبيبك على الفور إذا أصبحت حاملاً (أو رغبت في الحمل).	<p>هذا المستند يحتوي على معلومات هامة يجب أن تكون على دراية بها قبل وأثناء العلاج بـ OLUMIANT®.</p> <p>احتفظ بهذه المعلومات معك وشاركها مع متخصصي الرعاية الصحية الآخرين المشاركين في رعايتك الطبية أو علاجك.</p>
<p>الالتهابات</p> <p>قد يجعل OLUMIANT® العدوى الموجودة أسوأ أو يزيد من فرصة إصابتك بعدوى جديدة أو يزيد من فرصة إعادة تنشيط الإصابة بالفيروس. إذا كنت مصاباً بداء السكري أو عمرك أكبر من 65 عاماً، فقد تزداد فرصة إصابتك بالعدوى. يمكن أن تصبح العدوى خطيرة إذا لم يتم علاجها. أخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت أي أعراض للالتهابات مثل:</p> <ul style="list-style-type: none">• الحمى والجروح والشعور بالتعب أكثر من المعتاد أو مشاكل الأسنان.• سعال لا يتوقف، تعرق ليلي، ونقص في الوزن. يمكن أن تكون هذه أعراض مرض السل (مرض معد يصيب الرئتين).• طفح جلدي مؤلم مع ظهور بثور. قد تكون هذه علامة على الإصابة بعدوى الهربس النطاقي.	<p>اسمك:</p> <hr/> <p>اسم الطبيب (من وصف الـ OLUMIANT®)</p> <hr/> <p>رقم هاتف الطبيب</p> <hr/>
<p>سرطان الجلد غير الميلانيني</p> <p>لوحظ سرطان الجلد غير الميلانيني في المرضى الذين يتناولون OLUMIANT®. إذا ظهرت بقع جلدية جديدة أثناء أو بعد العلاج أو إذا تغير شكل البقع الموجودة سابقاً، يجب عليك أن تخبر طبيبك.</p>	

جلطات الدم

قد يسبب OLUMIANT® حالة تتشكل فيها جلطة دموية في ساقيك وقد تنتقل إلى رئتيك. أخبر طبيبك فوراً إذا واجهت أيّاً من الأعراض التالية:

- تورم أو ألم في إحدى الساقين أو الذراعين .
- دفء أو إحمرار في إحدى الساقين أو الذراعين .
- تنفس سريع .
- ضيق في التنفس غير متوقع .
- ألم بالصدر .

نوبة قلبية أو سكتة دماغية

أخبر طبيبك فوراً إذا واجهت أيّاً مما يلي :

- ألم شديد أو ضيق في الصدر (قد ينتشر في الذراعين والفك والرقبة والظهر) .
- ضيق في التنفس .
- تعرق بارد .
- ضعف في جانب واحد في الذراع و /أو الساق .
- كلام غير واضح .

للإبلاغ عن أي آثار جانبية, يرجى الاتصال بـ

المركز الوطني للتنقيط الدوائي NPC
الهيئة العامة للغذاء والدواء SFDA

الرقم الموحد: 19999

بريد الكتروني: npc.drug@sFDA.gov.sa
موقع الكتروني: https://ade.sFDA.gov.sa/

أو
قسم التيقظ الدوائي في ايلي ليللي وشركاه

بريد الكتروني:

Saudi_Pharmacovigilance@lilly.com

رقم الهاتف : 00966114617845