عليك الاتصال بطبيبك الذي وصف لك الدواء على الفور إذا أصبحت حاملًا أو تعرضت لأى آثار جانبية أثناء العلاج بدواء **ماسى**®

مركز العلاج: اسم الطبيب الذي وصف لك الدواء :

الذي وصف لك الدواء:.

رقم هاتف الطبيب

@2022 سدير فارما

كاملًا، بكوب من الماء، ولا تمضغ القرص أو تقسمه. يمكنك تناول دواء ماسي® مع الطعام او بدونه. إذا نسيت أن تتناول دواء ماسى®، فتناول الجرعة بمجرد أن تتذكرها، ثم استمر في تناول أقراصك في الوقت المقرر لها. لا تتناول الجرعة مضاعفة لتعويض جرعة فاتتك.

كانت لديك أية أسئلة بخصوص علاجك، فيُرجى سؤال الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة الموصى بها من دواء ماسي® قرص واحد ١٠ ملغم، مرة واحدة يوميًا. إبلع القرص

لمزيد من المعلومات عن دواء ماسي®، يرجى قراءة نشرة معلومات المريض بدقة. إذا

لا بد أن تكون على دراية بها عند تلقي العلاج باستخدام دواء ماسى®. إحمل هذه البطاقة معك دائما وأظهرها لأى طبيب يقدم لك الرعاية الطبية .









لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

تحتوى هذه البطاقة على معلومات مهمة بخصوص الأمان، والتي

فحوص الدم الخاصة بفقر الدم ووظائف الكبد: • الخمول أو الإرهاق (تعب أو إجهاد غير معتاد) المتلازمة الشبيهة بأعراض الأنفلونزا قد يضر دواء ماسي® بالطفل في رحم الأم. لذلك يحظر أن تتاولي دواء ماسي® إذا 🏻 قد يُحفّز دواء ماسي® فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء) وقد يتسبب في (ألم العضلات والمفاصل المصحوب بالحمى) كنت حاملًا ويجب عليك تجنب الحمل أثناء تناول دواء ماسي® أو بعد إيقافه بضترة إصابة الكبد. ستجرى لك فحوص الدم قبل أن تبدأ العلاج ويشكل منتظم أثناء العلاج قصيرة. قد يتسبب الحمل أيضًا في تدهور حاد في أعراض ارتفاع ضغط الدم للتحقق مما إذا: أبلغ طبيبك فورًا إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات: • كنت مصابًا بفقر الدم الشرياني الرئوي. إذا حدثت لك أي آثار جانبية، فيرجى التحدث إلى الطبيب المرض أو الصيدلي. • كانت الكبد تعمل بكفاءة يرجى إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن أي أعراض جانبية وسائل منع الحمل: من خلال: الموقع عبر الإنترنت:https://ade.sfda.gov.sa تتضمن العلامات التي تشير إلى أن الكبد لا يعمل بكفاءة: يلزمك استخدام وسيلة موثوقة من وسائل منع الحمل أثناء تناول دواء ماسي®. npc.drug@sfda.gov.sa :البريد الإلكتروني • الغثيان (الشعور بالرغبة في التقيقُ)، التقيق احرصي على مناقشة طبيبك في أي أسئلة قد تساورك. مركز الاتصال: ١٩٩٩٩ • الحمى (ارتفاع في درجة حرارة الجسم) يوصى أن تجري اختبار حمِل قبل البدء في دواء ماسي® وشهريًا أثناء العلاج حتى لو يرجى أيضًا إبلاغ سدير فارما هاتفيًا على الرقم: +٩٢٠٠١٤٣٢ ٩٦٠٠ داخلي ١٠٧ ، • ألم في المعدة (البطن) كنت تعتقدين أنك لست حاملًا.

• اليرقان (اصفرار الجلد أو بياض العين)

• تغير لون البول إلى لون داكن.

• الحكة الحلدية

أو عبر البريد الإلكتروني:pharmacovigilance@sudairpharma.com

بالإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات عن أمان هذا