

بطاقة تنبيه المريض
دابيتران (دابيجاتران إتيكسيالات)
75 ملجرام ، 110 ملجرام ، 150 ملجرام كبسولات

احتفظ دائما بهذه البطاقة معك!

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتبليظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

➤ دابيتران (دابيجاتران إتيكسيلات) معلومات للمرضى

- دابيتران يخفف الدم ، لذلك سوف يحميك من الاصابة بجلطات دموية خطيرة.
- اتبع تعليمات طبيبك عند تناول دابيتران. لا تتجاوز جرعة أو تتوقف عن تناول دابيتران (دابيجاتران إتيكسيلات) دون التحدث إلى طبيبك.
- أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها حالياً.
- أخبر طبيبك عن تناولك دابيتران قبل أي عملية جراحية / إجراء جراحي.
- يمكن تناول دابيتران مع الطعام أو بدونه. ابتلع الكبسولة كاملة مع كوب من الماء. لا تكسر أو تمضغ أو تفرغ الكريات من الكبسولة.

➤ تحدث إلى طبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من العلامات والأعراض المحتملة التالية:

- قد يؤدي تناول دابيتران إلى زيادة خطر النزيف لذلك تحدث إلى طبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من العلامات والأعراض المحتملة التالية للنزيف: تورم ، عدم الراحة ، ألم أو صداع غير عادي ، دوخة ، شحوب ، ضعف ، كدمات غير عادية ، نزيف في الأنف ، نزيف اللثة ، جروح نزيف طويلة غير عادية ، تدفق الحيض غير الطبيعي أو نزيف مهبلي ، دم في البول قد يكون وردي أو بني ، براز أحمر / أسود ، سعال الدم ، تقيؤ الدم.
- إذا سقطت أو جرحت نفسك ، خاصة إذا اصطدمت برأسك ، فاطلب المشورة الطبية بأسرع وقت.
- لا تتوقف عن تناول دابيتران دون التحدث إلى طبيبك ، إذا كنت تعاني من حرقة المعدة أو الغثيان أو القيء أو عدم الراحة في المعدة أو الانتفاخ أو آلام البطن العلوية.

➤ دابيتران (دابيجاتران إتيكسيالات) معلومات لأخصائي الرعاية الصحية

- دابيتران هو مضاد للتخثر عن طريق الفم (مثبط الثرومبين المباشر).
- قد يلزم إيقاف دابيتران قبل العمليات الجراحية أو غيرها من الإجراءات الجراحية.
- في حالة حدوث نزيف خطير ، يجب إيقاف دابيتران على الفور.
- يتوفر عامل انعكاس محدد للدابيتران هو براكسيند وإيداروسيزوماب (يرجى الرجوع إلى ملخص خصائص المنتج ل لمزيد من المعلومات).
- يتم التخلص من دابيتران بشكل رئيسي عن طريق الكلى, يجب الحفاظ على إدرار البول الكافي, دابيتران قابل للغسيل الكلوي.

➤ يرجى إكمال هذا القسم أو اطلب من طبيبك القيام بذلك.

اسم المريض:

تاريخ الميلاد:

دواعي استعمال مضادات التخثر:

جرعة الدابيجاتران:

معلومات الاتصال بحامل ترخيص التسويق:

شركة أماروكس السعودية الصناعية
رزان المالكي - أخصائي التيقظ الدوائي
شارع الجامعة - الملز - الرياض كود 12629 ، المملكة العربية
السعودية.
الهاتف: +966 11 266 8850
جوال: +966531215235
البريد الإلكتروني: r.almalki@amaroxpharma.com

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

للإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مشتبه بها يرجى التواصل مع:
المركز الوطني للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء
مركز الاتصال الموحد: 19999
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa>