

## بطاقة تنبيه المريض

### أبيكسبان JPI

### أبيكسابان

### احمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات.

برز هذه البطاقة للصيدلي أو طبيب الأسنان أو أي مقدم رعاية يقوم بعلاجك

### معلومات للمرضى

- تناول أبيكسبان JPI بانتظام حسب التعليمات. إذا فاتتك جرعة، تناولها بمجرد أن تتذكرها واستمر في إتباع جدول الجرعات الخاص بك.
- لا تتوقف عن تناول أبيكسبان JPI دون التحدث إلى طبيبك، لأنك قد تكون معرض لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو مضاعفات أخرى.
- يساعد أبيكسبان JPI على سيولة دمك. ومع ذلك، فإن هذا قد يزيد من خطر النزيف.
- علامات وأعراض النزيف تشمل حدوث كدمات أو نزيف تحت الجلد، براز داكن اللون، وجود دم في البول، نزيف الأنف، دوخة، التعب، الشحوب أو الضعف، الصداع الشديد المفاجئ، وجود دم عند السعال أو في القيء.
- إذا لم يتوقف النزيف من تلقاء نفسه، فاطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا كنت بحاجة لعملية جراحية أو أي إجراء جراحي، أخبر طبيبك بأنك تتناول أبيكسبان JPI.

تم اعتماد وسيلة خفض المخاطر هذه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

أنا اخضع لعلاج مضاد لتخثر الدم  
باستخدام أبيكسابان JPI (أبيكسابان) لمنع تجلط الدم

معلومات لمتخصصي الرعاية الصحية

- أبيكسابان JPI (أبيكسابان) هو مضاد للتخثر عن طريق الفم يعمل عن طريق التثبيط الانتقائي المباشر للعامل Xa.
- أبيكسابان JPI قد يؤدي إلى زيادة خطر النزيف. في حالة حدوث نزيف حاد، يجب إيقافه على الفور.
- لا يتطلب العلاج باستخدام أبيكسابان JPI مراقبة روتينية لنسبة التعرض لأبيكسابان. قد يكون فحص الكمي المعايير للعامل المضاد anti-Xa مفيداً في بعض الحالات، مثل، الجرعة الزائدة والجراحة الطارئة (لا يوصى باختبارات تخثر الدم مثل PT، INR، aPTT) - راجع نشرة الممارس الصحي (SPC).

يرجى إكمال هذا القسم أو اطلب من طبيبك القيام بذلك

الإسم: \_\_\_\_\_

تاريخ الميلاد: \_\_\_\_\_

دواعي الاستعمال: \_\_\_\_\_

الجرعة: \_\_\_\_\_ ملغم مرتين يومياً

إسم الطبيب: \_\_\_\_\_

هاتف الطبيب: \_\_\_\_\_

يرجى الإبلاغ عن آثار الجانبية المشتبه بها إلى شركة أدوية الحكمة عبر البريد الإلكتروني: SAPV@hikma.com و/أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عن طريق معلومات التواصل التالية:  
البريد الإلكتروني: npc.drug@sFDA.gov.sa  
الموقع الإلكتروني: https://ade.sFDA.gov.sa  
الهاتف: 19999 أو رمز الاستجابة السريعة:

