

تيكفايلي (تيكليستيماب) - بطاقة المريض

احمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات.

اعرض هذه البطاقة لأي متخصص رعاية صحية مشارك في رعايتك وفي حالة ذهابك إلى المستشفى

يمكن أن يسبب دواء تيكفايلي (تيكليستيماب) **TECVAYLI** آثارًا جانبية مثل متلازمة إطلاق السيتوكين / السيتوكينات **cytokine release syndrome (CRS)** تعد متلازمة إفراز السيتوكينات تفاعلًا مناعيًا خطيرًا يمكن أن تحدثه مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك مجموعة من الأدوية.

تمت مراجعة واعتماد البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

اسم المريض:

Blank area for patient name entry.

معلومات سلامة مهمة للمرضى

تمت مراجعة واعتماد البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

احصل على مساعدة طبية على الفور إذا واجهت أيًا مما يلي:

- الحمى (38 درجة مئوية أو أعلى).
- غثيان.
- رجفة.
- صداع.
- ازدياد في معدل ضربات القلب.
- الشعور بالدوار.
- صعوبة في التنفس.

من المهم أن تتذكر دائمًا: ابق قريبًا من المكان الذي تلقيت فيه علاج تيكفايلي (تيكليستيماب) TECVAYLI الخاص بك لمدة يومين على الأقل للمراقبة اليومية بعد تناول الجرعات الثلاث الأولى (عادةً جرعتان تحضيريتان وجرعة المداومة الأولى). إذا كان لديك أي من الأعراض المذكورة في هذه البطاقة ، فاتصل بطبيبك أو اطلب العناية الطبية الطارئة على الفور! هذه ليست كل الآثار الجانبية المحتملة ل تيكفايلي (تيكليستيماب) TECVAYLI. أخبر طبيبك إذا كان لديك أي آثار جانبية تزعجك أو لا تختفي.

الطبيب المعالج

اسم الطبيب المعالج:

رقم هاتف الطبيب المعالج:

اسم المستشفى وعنوانها:

رقم التليفون:

معلومات تَملاً بواسطة فريق الرعاية الصحية

يرجى إعطاء هذه البطاقة لفريق الرعاية الصحية الخاص بك لملء المعلومات والعودة إليك.

مواعيد حقن TECVAYLI (جدول الجرعات التصعيدية):

الجرعة التحضيرية 1

الجرعة التحضيرية 2

جرعة المداومة الأولى *

* هذه هي أول جرعة علاج كاملة (1.5 مجم / كجم)

معلومات سلامة مهمة لأخصائيي الرعاية الصحية

قد تحدث متلازمة إفراز السيتوكينات CRS، بما في ذلك من الاستجابات القاتلة أو المهددة للحياة في بعض المرضى الذين يتلقون TECVAYLI. غالبية أحداث متلازمة إفراز السيتوكينات CRS التي تمت ملاحظتها بعد العلاج بـ TECVAYLI من الدرجة الأولى أو الثانية. قد تؤدي متلازمة إفراز السيتوكينات CRS إلى إصابة العديد من أعضاء الجسم المتعددة. قم بتقييم المريض بحثاً عن علامات وأعراض متلازمة إطلاق السيتوكين CRS. إذا أبلغ المريض عن أي علامات أو أعراض على النحو المشار إليه في هذه البطاقة، فيرجى الاتصال بالطبيب المعالج للمريض على الفور للحصول على مزيد من المعلومات.

انظر ملخص خصائص المنتج للحصول على التفاصيل الكاملة¹.

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية ترتبط باستخدام تيكفايلي:

الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية (المركز الوطني للتيقظ الدوائي):

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfga.gov.sa

الرقم الموحد: 19999

عبر الإنترنت: <http://ade.sfga.gov.sa>

للحصول على معلومات عن طريقة استخدام الدواء , يرجى الرجوع الى النشرة الداخلية او التواصل مع فرع شركة جونسون أند جونسون ميدل ايس (الرياض)

العنوان: شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، برج ب، الطابق 30 ، أبراج العليا.

الهاتف: 00966114339133

ص.ب: 65305 الرياض 11556 ، السعودية

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية و شكاوى عن المنتجات او اي استفسارات طبية, يرجى التواصل معنا عبر:

البريد الإلكتروني: GCC-PV2@its.jnj.com

الخط المباشر: 00966540015811

يخضع هذا الدواء لمراقبة إضافية. وسيتيح ذلك إمكانية التعرف السريع على معلومات السلامة الجديدة. ويمكنك المساعدة من خلال الإبلاغ عن أي آثار جانبية قد تواجهها. راجع نهاية القسم 4 لمعرفة كيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية.



Scan Here

للمزيد من المعلومات عن تيكفايلي، برجاء مراجعة نشرة معلومات المريض من خلال هذا الرابط