

## بطاقة تنبيه المريض

نصائح السلامة للمرضى الذين يتناولون شابرينا (تولفابتان)  
يرجى حمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات

### الإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

إذا عانيت من أي أعراض جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. وهذا يشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في النشرة الداخلية للدواء.

يمكن أيضًا الإبلاغ عن الأعراض الجانبية إلى المركز الوطني للتيقظ الدوائي:

البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfda.gov.sa](mailto:npc.drug@sfda.gov.sa)

الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfda.gov.sa>

الهاتف: 19999

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع سبيماكو على الهاتف: +966 11252 3393 أو عبر الإيميل:

[GPV@spimaco.sa](mailto:GPV@spimaco.sa)

من خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

اسم المريض: \_\_\_\_\_

تاريخ أول صرف لتولفابتان: \_\_\_\_\_

اسم الطبيب: \_\_\_\_\_



اسم مركز العلاج: \_\_\_\_\_  
رقم هاتف مركز العلاج: \_\_\_\_\_

**معلومات هامة للسلامة موجهة إلى المرضى**  
من الممكن أن يؤثر شابرينا (تولفابتان) على طريقة عمل الكبد.

سيقوم طبيبك بترتيب اختبارات الدم لاختبار وظائف الكبد:

- قبل بدء العلاج بـ تولفابتان
- شهرتاً لأول 18 شهراً من العلاج
- ثم كل 3 أشهر بعد ذلك

استشر طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من أعراض التعب، فقدان الشهية، آلام في البطن ، بول داكن ، اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان) ، جفاف الشديد ، غثيان ، قيء ، حمى ، حكة في الجلد أو اعتلال شبيه بالإنفلونزا (آلام بالمفاصل والعضلات مع حمى).

يجب عليك عدم تناول تولفابتان إذا كنتِ حاملاً أو تعتقدين بأنكِ قد تكونين حاملاً، حيث إنه قد يؤدي إلى آثار جانبية عليك وتشوهات في النمو لدى طفلك.

يجب على النساء في سن الإنجاب استخدام طريقة فعالة واحدة على الأقل لمنع الحمل لمدة 4 أسابيع قبل بدء العلاج، وأثناء العلاج وحتى بعد إيقاف تولفابتان على الأقل لمدة 4 أسابيع أخرى.

يجب أن تناقشي مع طبيبك لاستخدام الوسيلة المناسبة لمنع الحمل.