



دليلك لاستخدام

أيليا®

(أفليبرسبت)

أيليا® ١١٤,٣ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
أفليبرسبت

أيليا® ٤٠ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
أفليبرسبت

جدول المحتويات

- ٢ علاج ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر.
- ٨ علاج الوذمة البقعية الصفراء (الشبكية) الناتجة عن داء السكر.
- ١٤ علاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي.
- ٢٠ علاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي.
- ٢٦ علاج ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر.

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

دليلك لاستخدام

أيليا®

(افليبرسبت)

أيليا® ١١٤,٣ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
افليبرسبت

أيليا® ٤٠ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
افليبرسبت

يستخدم أيليا لـ

علاج ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر.

تم إنتاج الكتيب للأشخاص الذين تم وصف لهم أيليا (محلول افليبرسبت للحقن) لعلاج ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر. تمت دراسة جرعة أيليا ٢ ملغ وجرعة أيليا ٨ ملغ في ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر و وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر. قد يعطيك طبيبك إما جرعة أيليا ٢ ملغ أو جرعة أيليا ٨ ملغ، حسب حالتك. إذا تم إعطاء جرعة أيليا ٢ مجم، فسيستخدم طبيبك محلول أيليا ٤٠ مجم / مل. إذا تم إعطاء جرعة أيليا ٨ ملغ، فسيستخدم طبيبك محلول أيليا ١١٤,٣ ملغ/مل.

مزيد من المعلومات متاحة لك في نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

وصف طبيبك أيليا لأنه تم تشخيص إصابتك بضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر

ما هو ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر ؟

شبكية العين هي طبقة الخلايا المبطنة للجدار الخلفي داخل العين تستشعر الضوء وترسل الرسائل إلى الدماغ، مما يتيح لك الرؤية. البقعة الصفراء هي منطقة مهمة في مركز الشبكية تسمح لك برؤية تفاصيل الأشياء التي أمامك بوضوح، مثل الوجوه والكلمات في الكتب. يحدث ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر عندما تنمو أوعية دموية جديدة غير طبيعية تحت شبكية العين. يمكن أن يحدث هذا مع تقدم العمر وتراكم نواتج تحلل المركبات في شبكية العين. ويعود نمو هذه الأوعية غير الطبيعية إلى ارتفاع المستويات الطبيعية في العين لبروتين يسمى Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) أو عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، ويشارك VEGF في تكوين الأوعية الدموية غير الطبيعية في العين. قد تسرب هذه الأوعية دماً أو سوائل أخرى وقد تسبب تندب في البقعة الصفراء. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الرؤية المركزية بشكل دائم.

ما هو إيليا؟

أيليا هو نوع من العلاج يُعرف بالعوامل المضادة لنمو بطانة الأوعية الدموية (Anti-VEGF)، وهذا وصف لكيفية عمل أيليا لحماية نظرك. أيليا يحجب البروتين المسؤول عن تشكيل الأوعية الدموية الجديدة ، وهذا الإجراء يساعد على تقليل السوائل في شبكية العين ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الرؤية والحفاظ عليها.

أيليا هو محلول (سائل) يتم حقنه في العين. وهو متوفر بجرعة ٢ ملغ وجرعة ٨ ملغ. سيحدد طبيبك الجرعة الأنسب لحالتك. سيوصي طبيبك أيضاً بجدول علاجي لك ومن المهم جداً أن تتبعه.

لمن يوصف عقار أيليا ؟

أيليا مخصص للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر.

ما الذي يجب أن يعرفه طبيبك قبل العلاج بـ أيليا ؟

قبل بدء علاج أيليا ، تأكد من إخبار طبيبك ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين بالتالي:

- إذا كانت لديك عدوى في عينك أو المنطقة المحيطة بها
- إذا كان لديك حاليًا احمرار في عينك أو إذا كان هناك أي ألم في عينك
- إذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية تجاه اليود أو أي مسكنات للألم أو أي من مكونات أيليا

- إذا واجهت أي مشاكل مع حقن العين من قبل
- إذا كان لديك الجلوكوما أو (المياه الزرقاء) أو تاريخ من ارتفاع الضغط في عينك
- إذا رأيت ومضات من الضوء أو "أجسام طافية" أثناء رؤيتك
- إذا تناولت أي أدوية، بوصفة طبية أو بدونها
- إذا أجريت أو كنت ستخضع لعملية جراحية للعين في غضون ٤ أسابيع قبل أو بعد العلاج بـ أيليا

- إذا كنت حامل أو تخططين للحمل أو الرضاعة.

استخدام أيليا والحمل

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة :

- هناك القليل جداً من المعلومات حول سلامة استخدام أيليا لدى النساء الحوامل.
- لا ينبغي استخدام أيليا ٢ ملغ و أيليا ٨ ملغ أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفائدة تفوق المخاطر على الجنين. ناقش هذا مع طبيبك قبل العلاج بـ أيليا.
- يجب على النساء ذوات القدرة على الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء علاجهن بـ أيليا.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا ٢ ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع

- الحمل الفعالة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا ٨ ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع الحمل الفعالة لمدة أربعة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.
- قد يدخل كميات صغيرة من أيليا في حليب الأم.
- آثار افليبرسبت على الرضيع غير معروفة.
- لا ينصح باستخدام أيليا أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيف يمكنني الاستعداد لموعدى مع أيليا ؟

- قد يطلب منك طبيبك استخدام قطرات العين لبضعة أيام قبل موعدك.
- بعد العلاج، قد تصبح رؤيتك ضبابية لذا لا يجب عليك القيادة إلى المنزل.
- خطط لجعل صديق أو فرد من العائلة يصطحبك إلى موعدك أو قم بترتيب طريقة أخرى للوصول إلى هناك والعودة إلى المنزل مرة أخرى.
- تجنبى استخدام او وضع مساحيق التجميل في يوم موعدك.

ماذا يمكنني أن أتوقع بعد علاج أيليا ؟

قد يقوم طبيبك بإجراء بعض اختبارات العين بعد حقن أيليا. قد يشمل ذلك اختبارًا يقيس الضغط داخل عينك. بعد الحقن، ستكون رؤيتك ضبابية لذا يجب ألا تخطط للقيادة إلا بعد عودة رؤيتك إلى وضعها الطبيعي.

خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تحصل على عين محتقنة بالدم أو ترى بقعًا متحركة في رؤيتك. يجب أن تختفي هذه الأعراض خلال بضعة أيام، وإذا لم تختفي، أو إذا تفاقت، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

قد يشعر بعض الأشخاص بقليل من الألم أو الانزعاج في أعينهم بعد الحقن. إذا لم يختفي هذا أو أصبح أسوأ، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

هل لدى أيليا آثار جانبية؟

مثل أي دواء، لدى أيليا القدرة على التسبب في آثار جانبية.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض من المذكورة في الجدول أدناه، حيث قد تكون هذه علامات على وجود مضاعفات خطيرة في العلاج:

حالة	بعض العلامات أو الأعراض المحتملة
العدوى أو التهاب داخل العين	ألم في العين أو زيادة الانزعاج تفاقم احمرار العين حساسية للضوء تورم الجفن تغيرات في الرؤية مثل انخفاض مفاجئ في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.
تغيم العدسة (إعتام عدسة العين)	رؤية ضبابية رؤية الظلال خطوط وأشكال أقل حيوية تغيرات في رؤية الألوان (على سبيل المثال، تبدو الألوان "باهتة")
زيادة في الضغط في العين	رؤية الهالات حول الأضواء ألم في العين تجربة العين الحمراء الغثيان أو القيء

تغيرات الرؤية	
ومضات مفاجئة من الضوء ظهور مفاجئ أو زيادة الطوافات تأثير يشبه الستارة على جزء من منطقة الرؤية تغيرات الرؤية.	أنفصال أو تمزق طبقة من شبكية العين

للاطلاع على قائمة الآثار الجانبية كاملة، يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).
الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك عن طريق وسائل الاتصال المذكورة في آخر الكتيب

ماذا لو كانت لدي مخاوف أو أسئلة؟

إذا كانت لديك أية مخاوف أو أسئلة، فإن طبيبك أو ممرضتك هم أفضل الأشخاص الذين يمكنك التحدث إليهم. إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ويعرفون حالتك لذا يمكنهم تزويدك بالإجابات التي تحتاجها.

دليلك لاستخدام

أيليا®

(افليبرسبت)

أيليا® ١١٤,٣ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
افليبرسبت

أيليا® ٤٠ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
افليبرسبت

يستخدم أيليا لـ

علاج الوذمة البقعية الصفراء (الشبكية) الناتجة عن داء السكر.

تم إنتاج الكتيب للأشخاص الذين تم وصف لهم أيليا (محلول افليبرسبت للحقن) لعلاج ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر. تمت دراسة جرعة أيليا ٢ ملغ وجرعة أيليا ٨ ملغ في ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر وفي وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر. قد يعطيك طبيبك إما جرعة أيليا ٢ ملغ أو جرعة أيليا ٨ ملغ، حسب حالتك. إذا تم إعطاء جرعة أيليا ٢ مجم، فسيستخدم طبيبك محلول أيليا ٤٠ مجم / مل. إذا تم إعطاء جرعة أيليا ٨ ملغ، فسيستخدم طبيبك محلول أيليا ١١٤,٣ ملغ/مل.

مزيد من المعلومات متاحة لك في نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

لقد وصف طبيبك أيليا لأنه تم تشخيص إصابته بـ وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر.

ما هو وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر؟

وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر هي حالة تحدث عندما يتراكم السائل في شبكية العين. شبكية العين هي طبقة الخلايا المبطنة للجدار الخلفي داخل العين تستشعر الضوء وترسل رسائل إلى الدماغ، مما يتيح لك الرؤية. البقعة الصفراء هي منطقة مهمة في مركز الشبكية تسمح لك برؤية تفاصيل الأشياء التي أمامك بوضوح، مثل الوجوه والكلمات في الكتب.

يصاحب مرض السكري ارتفاع قيم السكر في الدم أو التقلبات العالية في نسبة السكر في الدم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة وانخفاض الدورة الدموية في العين، ويؤدي إلى تورم في شبكية العين وضبابية الرؤية. ويعود التورم إلى ارتفاع المستويات الطبيعية في العين لبروتين يسمى Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) أو عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، ويؤدي VEGF إلى رشح الأوعية الدموية التي تسبب إلى التورم. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي التورم إلى تلف شبكية العين، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الرؤية المركزية بشكل دائم.

ما هو أيليا؟

أيليا هو نوع من العلاج يُعرف بالعوامل المضادة لنمو بطانة الأوعية الدموية (Anti-VEGF)، وهذا وصف لكيفية عمل أيليا لحماية نظرك. أيليا يحجب البروتين المسؤول عن تشكيل الأوعية الدموية الجديدة، ويساعد هذا الإجراء على تقليل التورم في شبكية العين ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الرؤية وصيانتها.

أيليا هو محلول (سائل) يتم حقنه في العين. وهو متوفر بجرعة ٢ ملغ وجرعة ٨ ملغ. سيحدد طبيبك الجرعة الأنسب لحالتك. سيوصي طبيبك بجدول علاجي لك ومن المهم جدًا أن تتابعه.

لمن يوصف عقار أيليا ؟

أيليا مخصص للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بوزمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر.

ما الذي يجب أن يعرفه طبيبك قبل العلاج بـ أيليا ؟

قبل بدء علاج أيليا ، تأكد من إخبار طبيبك ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين بالتالي:

- إذا كانت لديك عدوى في عينك أو المنطقة المحيطة بها
- إذا كان لديك حاليًا احمرار في عينك أو إذا كان هناك أي ألم في عينك
- إذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية تجاه اليود أو أي مسكنات للألم أو أي من مكونات أيليا
- إذا واجهت أي مشاكل مع حقن العين من قبل
- إذا كان لديك الجلوكوما أو (المياه الزرقاء) أو تاريخ من ارتفاع الضغط في عينك
- إذا رأيت ومضات من الضوء أو "أجسام طافية" أثناء رؤيتك
- إذا تناولت أي أدوية، بوصفة طبية أو بدونها
- إذا أجريت أو كنت ستخضع لعملية جراحية للعين في غضون ٤ أسابيع قبل أو بعد العلاج بـ أيليا
- إذا كنت حامل أو تخططين للحمل أو الرضاعة.

استخدام أيليا والحمل

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة :

- هناك القليل جداً من المعلومات حول سلامة استخدام أيليا لدى النساء الحوامل.
- لا ينبغي استخدام أيليا ٢ ملغ و أيليا ٨ ملغ أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفائدة تفوق المخاطر على الجنين. ناقش هذا مع طبيبك قبل العلاج بـ أيليا.
- يجب على النساء ذوات القدرة على الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء علاجهن بـ أيليا.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا ٢ ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع

- الحمل الفعالة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا ٨ ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع الحمل الفعالة لمدة أربعة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.
- قد يدخل كميات صغيرة من أيليا في حليب الأم.
- آثار افليبرسبت على الرضيع غير معروفة.
- لا ينصح باستخدام أيليا أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيف يمكنني الاستعداد لموعدى مع أيليا ؟

- قد يطلب منك طبيبك استخدام قطرات العين لبضعة أيام قبل موعدك.
- بعد العلاج، قد تصبح رؤيتك ضبابية لذا لا يجب عليك القيادة إلى المنزل.
- خطط لجعل صديق أو فرد من العائلة يصطحبك إلى موعدك أو قم بترتيب طريقة أخرى للوصول إلى هناك والعودة إلى المنزل مرة أخرى.
- تجنبي استخدام أو وضع مساحيق التجميل في يوم موعدك.

ماذا يمكنني أن أتوقع بعد علاج أيليا ؟

قد يقوم طبيبك بإجراء بعض اختبارات العين بعد حقن أيليا. قد يشمل ذلك اختبارًا يقيس الضغط داخل عينك. بعد الحقن، ستكون رؤيتك ضبابية لذا يجب ألا تخطط للقيادة إلا بعد عودة رؤيتك إلى وضعها الطبيعي.

خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تحصل على عين محتقنة بالدم أو ترى بقعًا متحركة في رؤيتك. يجب أن تختفي هذه الأعراض خلال بضعة أيام، وإذا لم تختفي، أو إذا تفاقت، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

قد يشعر بعض الأشخاص بقليل من الألم أو الانزعاج في أعينهم بعد الحقن. إذا لم يختفي هذا أو أصبح أسوأ، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

هل لدى أيليا آثار جانبية؟

مثل أي دواء، لدى أيليا القدرة على التسبب في آثار جانبية.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض المذكورة في الجدول أدناه، حيث قد تكون هذه علامات على وجود مضاعفات خطيرة في العلاج:

حالة	بعض العلامات أو الأعراض المحتملة
العدوى أو التهاب داخل العين	ألم في العين أو زيادة الانزعاج تفاقم احمرار العين حساسية للضوء تورم الجفن تغيرات في الرؤية مثل انخفاض مفاجئ في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.
تغيم العدسة (إعتام عدسة العين)	رؤية ضبابية رؤية الظلال خطوط وأشكال أقل حيوية تغيرات في رؤية الألوان (على سبيل المثال، تبدو الألوان "باهتة")
زيادة في الضغط في العين	رؤية الهالات حول الأضواء ألم في العين تجربة العين الحمراء الغثيان أو القيء

تغيرات الرؤية	
ومضات مفاجئة من الضوء ظهور مفاجئ أو زيادة الطوافات تأثير يشبه الستارة على جزء من منطقة الرؤية تغيرات الرؤية.	أنفصال أو تمزق طبقة من شبكية العين

للاطلاع على قائمة الآثار الجانبية كاملة، يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).
الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك عن طريق وسائل الاتصال المذكورة في آخر الكتيب

ماذا لو كانت لدي مخاوف أو أسئلة؟

إذا كانت لديك أية مخاوف أو أسئلة، فإن طبيبك أو ممرضتك هم أفضل الأشخاص الذين يمكنك التحدث إليهم. إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ويعرفون حالتك لذا يمكنهم تزويدك بالإجابات التي تحتاجها.

دليلك لاستخدام

أيليا®

(افليبرسبت)

أيليا® ٤٠ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
افليبرسبت

يستخدم أيليا لـ

علاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي.

تم إنتاج الكتيب للأشخاص الذين تم وصف جرعة أيليا ٢ ملغ لهم (محلول افليبرسبت للحقن) الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي. تمت دراسة جرعة أيليا ٢ ملغ وجرعة أيليا ٨ ملغ في ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر وفي وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر. لم تتم دراسة جرعة أيليا ٨ ملغ في الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي.

مزيد من المعلومات متاحة لك في نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

وصف طبيبك أيليا لأنه تم تشخيص إصابتك بالوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي.

ما هو الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي ؟

شبكية العين هي طبقة الخلايا المبطنة للجدار الخلفي داخل العين تستشعر الضوء وترسل الرسائل إلى الدماغ، مما يتيح لك الرؤية. البقعة الصفراء هي منطقة مهمة في مركز الشبكية تسمح لك برؤية تفاصيل الأشياء التي أمامك بوضوح، مثل الوجوه والكلمات في الكتب. تحتوي شبكية العين على شريان رئيسي واحد ووريد رئيسي واحد. مع تقدم العمر، تتغير مرونة الأوعية الدموية ويمكن أن تصبح مسدودة أو محتقنة بسهولة أكبر. تحدث الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي عندما ينسد الوريد الشبكي الرئيسي. وهذا يشبه حدوث تجلط في شبكية العين، ويؤدي إلى تراكم الدم في الأوعية الدموية.

يؤدي هذا إلى إطلاق الشبكية لبروتين يسمى Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) أو عامل نمو بطانة الأوعية الدموية و يشارك VEGF في نمو الأوعية الدموية، ولكنه قد يؤدي إلى رشح الأوعية الدموية . تتسبب هذه الأوعية الدموية الراشحة في التورم و تسرب دم غير مرغوب فيه في العين، مما قد يؤدي إلى تلف شبكية العين. وفي الوقت نفسه، قد لا يزال الانسداد الأصلي موجودًا مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة. ونتيجة لذلك، يمكن أن تتأثر رؤيتك المركزية بشدة.

ما هو إيليا؟

أيليا هو نوع من العلاج يُعرف بالعوامل المضادة لنمو بطانة الأوعية الدموية (Anti-VEGF)، وهذا وصف لكيفية عمل أيليا لحماية نظرك. أيليا يحجب البروتين المسؤول عن تشكيل الأوعية الدموية الجديدة، ويساعد هذا الإجراء على تقليل التورم في شبكية العين ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الرؤية وصيانتها.

أيليا هو محلول (سائل) يتم حقنه في العين. لعلاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي ، يتوفر أيليا بجرعة ٢ ملغ. سيوصي طبيبك أيضًا بجدول علاجي لك ومن المهم جدًا أن تتبعه.

لمن يوصف عقار أيليا ؟

أيليا مخصص للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي.

ما الذي يجب أن يعرفه طبيبك قبل العلاج بـ أيليا ؟

قبل بدء علاج أيليا ، تأكد من إخبار طبيبك ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين بالتالي:

- إذا كانت لديك عدوى في عينك أو المنطقة المحيطة بها
- إذا كان لديك حاليًا احمرار في عينك أو إذا كان هناك أي ألم في عينك
- إذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية تجاه اليود أو أي مسكنات للألم أو أي من مكونات أيليا

- إذا واجهت أي مشاكل مع حقن العين من قبل
- إذا كان لديك الجلوكوما أو (المياه الزرقاء) أو تاريخ من ارتفاع الضغط في عينك
- إذا رأيت ومضات من الضوء أو "أجسام طافية" أثناء رؤيتك
- إذا تناولت أي أدوية، بوصفة طبية أو بدونها
- إذا أجريت أو كنت ستخضع لعملية جراحية للعين في غضون ٤ أسابيع قبل أو بعد العلاج بـ أيليا
- إذا كنت حامل أو تخططين للحمل أو الرضاعة.

استخدام أيليا والحمل

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة :

- هناك القليل جداً من المعلومات حول سلامة استخدام أيليا لدى النساء الحوامل.
- لا ينبغي استخدام أيليا ٢ ملغ أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفائدة تفوق المخاطر على الجنين. ناقش هذا مع طبيبك قبل العلاج بـ أيليا.
- يجب على النساء ذوات القدرة على الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء علاجهن بـ أيليا.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا ٢ ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع

الحمل الفعالة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.

- قد يدخل كميات صغيرة من أيليا في حليب الأم.
- آثار افليبرسبت على الرضيع غير معروفة.
- لا ينصح باستخدام أيليا أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيف يمكنني الاستعداد لموعدى مع أيليا ؟

- قد يطلب منك طبيبك استخدام قطرات العين لبضعة أيام قبل موعدك.
- بعد العلاج، قد تصبح رؤيتك ضبابية لذا لا يجب عليك القيادة إلى المنزل.
- خطط لجعل صديق أو فرد من العائلة يصطحبك إلى موعدك أو قم بترتيب طريقة أخرى للوصول إلى هناك والعودة إلى المنزل مرة أخرى.
- تجنبى استخدام او وضع مساحيق التجميل في يوم موعدك.

ماذا يمكنني أن أتوقع بعد علاج أيليا؟

قد يقوم طبيبك بإجراء بعض اختبارات العين بعد حقن أيليا. قد يشمل ذلك اختبارًا يقيس الضغط داخل عينك. بعد الحقن، ستكون رؤيتك ضبابية لذا يجب ألا تخطط للقيادة إلا بعد عودة رؤيتك إلى وضعها الطبيعي.

خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تحصل على عين محتقنة بالدم أو ترى بقعًا متحركة في رؤيتك. يجب أن تختفي هذه الأعراض خلال بضعة أيام، وإذا لم تختفي، أو إذا تفاقت، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

قد يشعر بعض الأشخاص بقليل من الألم أو الانزعاج في أعينهم بعد الحقن. إذا لم يختفي هذا أو أصبح أسوأ، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

هل لدى أيليا آثار جانبية؟

مثل أي دواء، لدى أيليا القدرة على التسبب في آثار جانبية.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض المذكورة في الجدول أدناه، حيث قد تكون هذه علامات على وجود مضاعفات خطيرة في العلاج:

حالة	بعض العلامات أو الأعراض المحتملة
العدوى أو التهاب داخل العين	ألم في العين أو زيادة الانزعاج تفاقم احمرار العين حساسية للضوء تورم الجفن تغيرات في الرؤية مثل انخفاض مفاجئ في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.
تغير العدسة (إعتام عدسة العين)	رؤية ضبابية رؤية الظلال خطوط وأشكال أقل حيوية تغيرات في رؤية الألوان (على سبيل المثال، تبدو الألوان "باهتة")
زيادة في الضغط في العين	رؤية الهالات حول الأضواء ألم في العين

تجربة العين الحمراء الغثيان أو القيء تغيرات الرؤية	
وَمُضَات مفاجئة من الضوء ظهور مفاجئ أو زيادة الطوافات تأثير يشبه الستارة على جزء من منطقة الرؤية تغيرات الرؤية.	أنفصال أو تمزق طبقة من شبكية العين

للاطلاع على قائمة الآثار الجانبية كاملة، يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).
الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك عن طريق وسائل الاتصال المذكورة في آخر الكتيب

ماذا لو كانت لدي مخاوف أو أسئلة؟

إذا كانت لديك أية مخاوف أو أسئلة، فإن طبيبك أو ممرضتك هم أفضل الأشخاص الذين يمكنك التحدث إليهم. إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ويعرفون حالتك لذا يمكنهم تزويدك بالإجابات التي تحتاجها.

دليلك لاستخدام

أيليا®

(افليبرسبت)

أيليا® ٤٠ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
افليبرسبت

يستخدم أيليا لـ

علاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي.

تم إنتاج الكتيب للأشخاص الذين تم وصف جرعة أيليا ٢ ملغ لهم (محلول افليبرسبت للحقن) لعلاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي. تمت دراسة جرعة أيليا ٢ ملغ وجرعة أيليا ٨ ملغ في ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر وفي وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر.. لم تتم دراسة جرعة أيليا ٨ ملغ في الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي.

مزيد من المعلومات متاحة لك في نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

وصف طبيبك أيليا لأنه تم تشخيص إصابتك بالوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي.

ما هو الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي ؟

شبكية العين هي طبقة الخلايا المبطنة للجدار الخلفي داخل العين تستشعر الضوء وترسل الرسائل إلى الدماغ، مما يتيح لك الرؤية. البقعة الصفراء هي منطقة مهمة في مركز الشبكية تسمح لك برؤية تفاصيل الأشياء التي أمامك بوضوح، مثل الوجوه والكلمات في الكتب. مع تقدم العمر، تتغير مرونة الأوعية الدموية ويمكن أن تصبح مسدودة أو محتقنة بسهولة أكبر. يحدث الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي عندما ينسد واحد أو أكثر من فروع الوريد الشبكي الرئيسي. وهذا يشبه تجلط الدم في جزء واحد من شبكية العين. ويؤدي إلى تراكم الدم في الأوعية الدموية.

يؤدي هذا إلى إطلاق الشبكية لبروتين يسمى Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) أو عامل نمو بطانة الأوعية الدموية و يشارك VEGF في نمو الأوعية الدموية، ولكنه قد يؤدي إلى رشح الأوعية. . تتسبب هذه الأوعية الدموية الراشحة في التورم و تسرب دم غير مرغوب فيه في العين. يمكن أن يشمل التورم البقعة الصفراء، وإذا حدث ذلك، فقد تتأثر رؤيتك المركزية بشدة. مع مرور الوقت، إذا لم تكن هناك دورة دموية في هذه المنطقة، يمكن أن تموت الخلايا العصبية في العين ويمكن أن تصبح رؤيتك أسوأ.

ما هو إيليا؟

أيليا هو نوع من العلاج يُعرف بالعوامل المضادة لنمو بطانة الأوعية الدموية (Anti-VEGF)، وهذا وصف لكيفية عمل أيليا لحماية نظرك. أيليا يحجب البروتين المسؤول عن تشكيل الأوعية الدموية الجديدة ، ويساعد هذا الإجراء على تقليل التورم في شبكية العين ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الرؤية وصيانتها.

أيليا هو محلول (سائل) يتم حقنه في العين. لعلاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي ، يتوفر أيليا بجرعة ٢ ملغ. طبيبك سيوصي لك أيضًا بجدول علاجي ومن المهم أن تتبعه.

لمن يوصف عقار أيليا ؟

أيليا مخصص للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ الوذمة البقيعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي.

ما الذي يجب أن يعرفه طبيبك قبل العلاج بـ أيليا ؟

قبل بدء علاج أيليا ، تأكد من إخبار طبيبك ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين بالتالي:

- إذا كانت لديك عدوى في عينك أو المنطقة المحيطة بها
- إذا كان لديك حاليًا احمرار في عينك أو إذا كان هناك أي ألم في عينك
- إذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية تجاه اليود أو أي مسكنات للألم أو أي من مكونات أيليا

- إذا واجهت أي مشاكل مع حقن العين من قبل
- إذا كان لديك الجلوكوما أو (المياه الزرقاء) أو تاريخ من ارتفاع الضغط في عينك
- إذا رأيت ومضات من الضوء أو "أجسام طافية" أثناء رؤيتك
- إذا تناولت أي أدوية، بوصفة طبية أو بدونها
- إذا أجريت أو كنت ستخضع لعملية جراحية للعين في غضون ٤ أسابيع قبل أو بعد العلاج بـ أيليا
- إذا كنت حامل أو تخططين للحمل أو الرضاعة.

استخدام أيليا والحمل

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة :

- هناك القليل جداً من المعلومات حول سلامة استخدام أيليا لدى النساء الحوامل.
- لا ينبغي استخدام أيليا ٢ ملغ و أيليا ٨ ملغ أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفائدة تفوق المخاطر على الجنين. ناقش هذا مع طبيبك قبل العلاج بـ أيليا.
- يجب على النساء ذوات القدرة على الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء علاجهن بـ أيليا.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا ٢ ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع

الحمل الفعالة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.

- قد يدخل كميات صغيرة من أيليا في حليب الأم.
- آثار افليبرسبت على الرضيع غير معروفة.
- لا ينصح باستخدام أيليا أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيف يمكنني الاستعداد لموعدى مع أيليا ؟

- قد يطلب منك طبيبك استخدام قطرات العين لبضعة أيام قبل موعدك.
- بعد العلاج، قد تصبح رؤيتك ضبابية لذا لا يجب عليك القيادة إلى المنزل.
- خطط لجعل صديق أو فرد من العائلة يصطحبك إلى موعدك أو قم بترتيب طريقة أخرى للوصول إلى هناك والعودة إلى المنزل مرة أخرى.
- تجنبى استخدام او وضع مساحيق التجميل في يوم موعدك.

ماذا يمكنني أن أتوقع بعد علاج أيليا؟

قد يقوم طبيبك بإجراء بعض اختبارات العين بعد حقن أيليا. قد يشمل ذلك اختبارًا يقيس الضغط داخل عينك. بعد الحقن، ستكون رؤيتك ضبابية لذا يجب ألا تخطط للقيادة إلا بعد عودة رؤيتك إلى وضعها الطبيعي.

في الأيام القليلة المقبلة، قد تحصل على عين محتقنة بالدم أو ترى بقعًا متحركة في رؤيتك. يجب أن تختفي كلتا الحالتين في غضون أيام قليلة، وإذا لم يحدث ذلك، أو إذا تفاقت، فيجب عليك الاتصال بطبيبك.

قد يشعر بعض الأشخاص بقليل من الألم أو الانزعاج في أعينهم بعد الحقن. إذا لم يختفي هذا أو أصبح أسوأ، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

هل لدى أيليا آثار جانبية؟

تمامًا مثل أي دواء، لدى أيليا القدرة على التسبب في آثار جانبية.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض المذكورة في الجدول أدناه، حيث قد تكون هذه علامات على وجود مضاعفات خطيرة في العلاج:

حالة	بعض العلامات أو الأعراض المحتملة
العدوى أو التهاب داخل العين	ألم في العين أو زيادة الانزعاج تفاقم احمرار العين حساسية للضوء تورم الجفن تغيرات في الرؤية مثل انخفاض مفاجئ في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.
تغيم العدسة (إعتام عدسة العين)	رؤية ضبابية رؤية الظلال خطوط وأشكال أقل حيوية تغيرات في رؤية الألوان (على سبيل المثال، تبدو الألوان "باهتة")
زيادة في الضغط في العين	رؤية الهالات حول الأضواء ألم في العين تجربة العين الحمراء

الغثيان أو القيء تغيرات الرؤية	
ومضات مفاجئة من الضوء ظهور مفاجئ أو زيادة الطوافات تأثير يشبه الستارة على جزء من منطقة الرؤية تغيرات الرؤية.	أنفصال أو تمزق طبقة من شبكية العين

للاطلاع على قائمة الآثار الجانبية كاملة، يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).
الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك عن طريق وسائل الاتصال المذكورة في آخر الكتيب

ماذا لو كانت لدي مخاوف أو أسئلة؟

إذا كانت لديك أية مخاوف أو أسئلة، فإن طبيبك أو ممرضتك هم أفضل الأشخاص الذين يمكنك التحدث إليهم. إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ويعرفون حالتك لذا يمكنهم تزويدك بالإجابات التي تحتاجها.

دليلك لاستخدام

أيليا®

(افليبرسبت)

أيليا® ٤٠ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
افليبرسبت

يستخدم أيليا لـ

علاج ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر.

تم إنتاج الكتيب للأشخاص الذين تم وصف جرعة أيليا ٢ ملغ لهم (محلول افليبرسبت للحقن) لعلاج ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر. تمت دراسة جرعة أيليا ٢ ملغ وجرعة أيليا ٨ ملغ في ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر وفي وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر. لم يتم دراسة جرعة أيليا ٨ ملغ لعلاج ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر.

مزيد من المعلومات متاحة لك في نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

وصف طبيبك أيليا لأنه تم تشخيص إصابتك بضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر.

ما هو ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر ؟

شبكة العين هي طبقة الخلايا المبطنة للجدار الخلفي داخل العين و تستشعر الضوء وترسل رسائل إلى الدماغ، مما يتيح لك الرؤية. في الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشديد (قصر النظر)، يحدث تضخم أو استطالة في كرة العين. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تمدد وترقق شبكة العين. هذا الترقق يمكن أن يسبب نمو أوعية دموية جديدة من المشيمية. المشيمية هي طبقة من العين تقع خلف شبكة العين، والتي توفر إمدادات الدم إلى العين. ويعود نمو هذه الأوعية المتسربة إلى ارتفاع مستويات بروتين يسمى Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) أو عامل نمو بطانة الأوعية، ويشارك VEGF في تكوين هذه الأوعية الدموية الجديدة في العين. يمكن أن تسبب هذه الأوعية الدموية الجديدة تسرب الدم والسوائل إلى العين، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المركزية أو تشويهها.

ما هو إيليا؟

أيليا هو نوع من العلاج يُعرف بالعوامل المضادة لنمو بطانة الأوعية الدموية (Anti-VEGF)، وهذا وصف لكيفية عمل أيليا لحماية نظرك. أيليا يحجب البروتين المسؤول عن تشكيل الأوعية الدموية الجديدة ، ويساعد هذا الإجراء على تقليل التورم في شبكة العين ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الرؤية وصيانتها.

أيليا هو محلول (سائل) يتم حقنه في العين. لعلاج ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر ، يتوفر أيليا بجرعة ٢ ملغ. سيوصي طبيبك أيضًا بجدول علاجي لك ومن المهم أن تتبعه.

لمن يوصف عقار أيليا ؟

ايليا مخصص للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بضعف الرؤية الناتج عن تكوين أو عية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر.

ما الذي يجب أن يعرفه طبيبك قبل العلاج بـ أيليا ؟

قبل بدء علاج أيليا ، تأكد من إخبار طبيبك ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين بالتالي:

- إذا كانت لديك عدوى في عينك أو المنطقة المحيطة بها
- إذا كان لديك حاليًا احمرار في عينك أو إذا كان هناك أي ألم في عينك
- إذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية تجاه اليود أو أي مسكنات للألم أو أي من مكونات أيليا

- إذا واجهت أي مشاكل مع حقن العين من قبل
- إذا كان لديك الجلوكوما أو (المياه الزرقاء) أو تاريخ من ارتفاع الضغط في عينك
- إذا رأيت ومضات من الضوء أو "أجسام طافية" أثناء رؤيتك
- إذا تناولت أي أدوية، بوصفة طبية أو بدونها
- إذا أجريت أو كنت ستخضع لعملية جراحية للعين في غضون ٤ أسابيع قبل أو بعد العلاج بـ أيليا

- إذا كنت حامل أو تخططين للحمل أو الرضاعة.

استخدام أيليا والحمل

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة :

- هناك القليل جداً من المعلومات حول سلامة استخدام أيليا لدى النساء الحوامل.
- لا ينبغي استخدام أيليا ٢ أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفائدة تفوق المخاطر على الجنين. ناقش هذا مع طبيبك قبل العلاج بـ أيليا.
- يجب على النساء ذوات القدرة على الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء علاجهن بـ أيليا.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا ٢ ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع

الحمل الفعالة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.

- قد يدخل كميات صغيرة من أيليا في حليب الأم.
- آثار افليبرسبت على الرضيع غير معروفة.
- لا ينصح باستخدام أيليا أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيف يمكنني الاستعداد لموعدى مع أيليا ؟

- قد يطلب منك طبيبك استخدام قطرات العين لبضعة أيام قبل موعدك.
- بعد العلاج، قد تصبح رؤيتك ضبابية لذا لا يجب عليك القيادة إلى المنزل.
- خطط لجعل صديق أو فرد من العائلة يصطحبك إلى موعدك أو قم بترتيب طريقة أخرى للوصول إلى هناك والعودة إلى المنزل مرة أخرى.
- تجنبى استخدام او وضع مساحيق التجميل في يوم موعدك.

ماذا يمكنني أن أتوقع بعد علاج أيليا؟

قد يقوم طبيبك بإجراء بعض اختبارات العين بعد حقن أيليا. قد يشمل ذلك اختبارًا يقيس الضغط داخل عينك. بعد الحقن، ستكون رؤيتك ضبابية لذا يجب ألا تخطط للقيادة إلا بعد عودة رؤيتك إلى وضعها الطبيعي.

في الأيام القليلة المقبلة، قد تحصل على عين محتقنة بالدم أو ترى بقعًا متحركة في رؤيتك. يجب أن تختفي كلتا الحالتين في غضون أيام قليلة، وإذا لم يحدث ذلك، أو إذا تفاقت، فيجب عليك الاتصال بطبيبك.

قد يشعر بعض الأشخاص بقليل من الألم أو الانزعاج في أعينهم بعد الحقن. إذا لم يختفي هذا أو أصبح أسوأ، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

هل لدى أيليا آثار جانبية؟

مثل أي دواء، لدى أيليا القدرة على التسبب في آثار جانبية.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض المذكورة في الجدول أدناه، حيث قد تكون هذه علامات على وجود مضاعفات خطيرة في العلاج:

حالة	بعض العلامات أو الأعراض المحتملة
العدوى أو التهاب داخل العين	ألم في العين أو زيادة الانزعاج تفاقم احمرار العين حساسية للضوء تورم الجفن تغيرات في الرؤية مثل انخفاض مفاجئ في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.
تغير العدسة (إعتام عدسة العين)	رؤية ضبابية رؤية الظلال خطوط وأشكال أقل حيوية تغيرات في رؤية الألوان (على سبيل المثال، تبدو الألوان "باهتة")
زيادة في الضغط في العين	رؤية الهالات حول الأضواء ألم في العين تجربة العين الحمراء

الغثيان أو القيء تغيرات الرؤية	
ومضات مفاجئة من الضوء ظهور مفاجئ أو زيادة الطوافات تأثير يشبه الستارة على جزء من منطقة الرؤية تغيرات الرؤية.	أنفصال أو تمزق طبقة من شبكية العين

للاطلاع على قائمة الآثار الجانبية كاملة، يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).
الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك عن طريق وسائل الاتصال المذكورة في آخر الكتيب

ف

ماذا لو كانت لدي مخاوف أو أسئلة؟

إذا كانت لديك أية مخاوف أو أسئلة، فإن طبيبك أو ممرضتك هم أفضل الأشخاص الذين يمكنك التحدث إليهم. إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ويعرفون حالتك لذا يمكنهم تزويدك بالإجابات التي تحتاجها.

تمت مراجعة هذا الكتيب والموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك إلى:

المركز الوطني للتبقيظ

الرقم الموحد لهيئة الغذاء والدواء : ١٩٩٩٩

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

الموقع الإلكتروني : <https://ade.sfda.gov.sa/Home/Report>

أو

شركة باير العربية السعودية المحدودة

برج طريق الملك – طريق الملك عبد العزيز

جدة، المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦١٢٦٥٧٣٠١٥

البريد الإلكتروني: pv.me@bayer.com

أو الموقع الإلكتروني: <https://www.safetrack-public.bayer.com/>

للاستفسارات الطبية : med-info.me@bayer.com

تخضع المعلومات المرسلة إلى تفاصيل الاتصال المذكورة أعلاه لبيان خصوصية شركة باير
https://dps.bayer.com/ph/sa/en/data_privacy_statement و/أو بيان خصوصية شركة باير لبيانات
اليقظة الدوائية <https://www.bayer.com/en/privacy-statement-pv> وقد يتم نقلها خارج بلدك، بما في ذلك
على سبيل المثال لا الحصر، النقل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية.

