

# معلومات هامة لمريض تيبكينلي™ (إيكوريتاماب)

المريض [اسم/رقم هوية]
اسم الطبيب المعالج بعقار إيكوريتاماب
رقم هاتف الطبيب المعالج (خلال ساعات العمل)
رقم هاتف الطبيب المعالج لحالات رعاية الطوارئ (بعد ساعات العمل) معلومات الاتصال تجنب هذه الأنشطة في حال ظهرت عليك أحد الأعراض المذكورة في هذه البطاقة.
أحد الأقارب في حالات الطوارئ
تاريخ الجرعة الأولى من إيكوريتاماب

abbvie

أعدت في يناير 2024

SA-EPCOR-240003

إصدار 1.0 (يناير 2023)

نُرجى حمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات. أظهرها لأي مقدم رعاية صحية معنى بفحصك خلال زيارتك الطبية وعند الذهاب إلى أي مستشفى.

أخبر أي مقدم رعاية صحية معنى بفحصك أنك تعالج بعقار تيبكينلي™ (إيكوريتاماب).

إذا تعرضت لأي آثار جانبية بعد العلاج بإيكوريتاماب، فنُرجى استشارة طبيبك أو ممرضتك.

كن حذراً أثناء القيادة، أو ركوب الدراجات، أو استخدام الآلات الثقيلة أو الخطرة.  
تجنب هذه الأنشطة في حال ظهرت عليك أحد الأعراض المذكورة في هذه البطاقة.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً بالاتصال بشركة أبفي بايفارماسيوتيكاالس جي إم بي إنلش عبر البريد الإلكتروني:  
[PV.MEA@abbvie.com](mailto:PV.MEA@abbvie.com) أو عبر الخط الساخن: 2010 00966 55 828 أو المركز الوطني للتبيّط الدوائي، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مركز الاتصال الموحد SFDA: 19999 ، البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfda.gov.sa](mailto:npc.drug@sfda.gov.sa)، الموقع الإلكتروني:



تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتبيّط الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

## معلومات لمقدمي الرعاية الصحية

- يُعالج هذا المريض بابكوريتامب، وهو جسم مضاد ثانوي الخصوصية يتفاعل مع الخلايا الثانية (a T-Cell engaging bispecific antibody).
- بعد العلاج بابكوريتامب، قد تحدث متلازمة إفراز السيتوكين (CRS) ومتلازمة السمية العصبية المرتبطة بخلايا المناعة المستفعلة (ICANS)، والتي قد تكون خطيرة إذا لم يتم علاجها على الفور.
- قد تحدث متلازمة إفراز السيتوكين (CRS) بعد عدة ساعات أو أيام من العلاج بابكوريتامب، عادةً بعد أول جرعة كاملة في الدورة الأولى.
- قد تحدث متلازمة السمية العصبية المرتبطة بخلايا المناعة المستفعلة (ICANS) بعد عدة أيام أو أسبوع من العلاج بابكوريتامب.

اتصل بالطبيب المعالج للمريض على الفور للحصول على مزيد من المعلومات ([تفاصيل الاتصال في ظهر الصفحة](#)).

## معلومات للمريض

قد يسبب إبكوريتامب آثاراً جانبية يمكن أن تكون خطيرة.

اتصل بطبيبك أو احصل على مساعدة الطوارئ على الفور إذا كان لديك أي من الأعراض التالية:

- الحمى (38 درجة مئوية أو أعلى)
- صعوبة في التحدث أو الكتابة
- نَوْخَة أو دوار
- ثغاس
- قشعريرة
- ارتباك/تَوْهَان
- ضعف العضلات
- نوبات صرع
- صداع فقدان الذاكرة