

# بطاقة تنبيه المريض



إحمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات  
أبرز هذه البطاقة للصيدلي أو طبيب الأسنان أو أي مقدم رعاية  
صحية يقوم بعلاجك

## معلومات للمرضى:

- تناول **بيكسار®** بشكل منتظم وفقاً للتعليمات ، اذا نسيت الجرعة يجب ان تتناولها بمجرد أن تتذكر، واستمر بمتابعة جدول الجرعات الخاص بك
- لا توقف تناول **بيكسار®** بدون استشارة الطبيب ، حيث ستكون في خطر التعرض للسكتة الدماغية أو غيرها من المضاعفات.
- بيكسار®** يساعد على ترقيق / تخفيف الدم. ومع ذلك ، فهذا قد يزيد من خطر النزيف.
- علامات وأعراض النزيف تشمل مايلي: كدمات أو نزيف تحت الجلد ، براز بلون القطران ، دم في البول ، نزيف في الأنف ، دوخة ، تعب ، شحوب أو ضعف ، صداع حاد مفاجئ ، سعال دموي أو تقيؤ دم.
- إذا لم يتوقف النزيف من تلقاء نفسه ، فابحث عن رعاية طبية بشكل عاجل.
- إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية ، فأبلغ طبيبك أنك تتناول **بيكسار®**.

# أنا أتناول علاج التخثر بيكسار® لمنع تجلط الدم

## معلومات لممارسين الرعاية الصحية:

- **بيكسار®** هو مُضاد للتخثر عن طريق الفم يعمل عن طريق تثبيط انتقائي مباشر للعامل Xa.
- **بيكسار®** قد يزيد من خطر النزيف. لذلك في حالات حدوث الكثير من النزيف ، يجب أن يتوقف على الفور.
- العلاج باستخدام **بيكسار®** لا يتطلب رصد التعرض بشكل روتيني ، قد يكون قياس كمية المعايرة للعامل Xa مفيدًا في حالات استثنائية مثل الجرعة الزائدة أو تدخل جراحي عاجل. (اختبارات التخثر التالية PT, INR & aPPT غير موصى بها) - انظر لنشرة خواص الدواء.
- تتوفر مواد لعكس عمل ابيكسابان التثبيطي للعامل Xa .

الرجاء تعبيئة البيانات بالأأسفل أو اطلب من الطبيب تعبيتها لك

الإسم:

تاريخ الميلاد:

دواعي الإستعمال:

الجرعة:

إسم الطبيب:

هاتف الطبيب:

كما يمكنكم إبلاغ شركة سدير فارما:

يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً إلى المركز الوطني للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء:

الهاتف: 920001432 تحويلة رقم 107



الموقع الإلكتروني:

npc.drug@sfda.gov.sa



الإيميل:

مركز الاتصال الموحد: 19999

Pharmacovigilance@SudairPharma.com

هذا المستند معتمد من قبل الادارة التنفيذية للتبيّظ  
الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية

نسخة رقم: ٢٠٠

تاريخ: ٢٠٢٥/١