

معلومات سلامة المريض

سيبينكو (أبروسيتيتنيب) – بطاقة المريض

هذه البطاقة معتمدة من الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء

اسمك:

اسم طبيبك (الذي وصف دواء سيبينكو):

رقم هاتف الطبيب:

تاريخ بدء تلقيك لدواء سيبينكو:

معلومات السلامة للمرضى:

- تحتوي هذه البطاقة على معلومات السلامة الهامة التي يجب أن تكون على علم بها – قبل وأثناء العلاج بدواء سيبينكو.
- للحصول على معلومات إضافية، قم بقراءة نشرة معلومات المريض الموجودة في كل عبوة من دواء سيبينكو.
- اسأل الطبيب أو الصيدلي إذا كانت أي معلومة غير واضحة.

احتفظ بهذه البطاقة معك واعرضها على أي مقدم للرعاية يشارك في رعايتك الطبية، على سبيل المثال، طبيبك الصيدلي أو طبيب الطواريء.

يجب أن تكون على وعي بخصوص بعض الآثار الجانبية والمواضيعات المدرجة أدناه، تحدث إلى طبيبك عند إصابتكم بأي آثار جانبية:

موانع استعمال سيبينكو:

إذا كنت تعاني من عدوى خطيرة مستمرة، بما في ذلك السل.¹

الاحتياطات عند استعمال سيبينكو:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل وأثناء العلاج بسيبينكو إذا:

- كنت مصاباً بعدوى أو إذا كنت تصاب بالعدوى كثيراً. أخبر طبيبك إذا ظهرت عليك أعراض مثل الحمى، أو الحروق، أو الشعور بالتعب بمعدل أكثر من المعتاد، أو مشكلات في الأسنان لأن هذه يمكن أن تكون علامات على وجود عدوى.¹

سبقت لك الإصابة بعدوى هربس (الحلا النطقي)، لأن تناول سيبينكو قد يؤدي إلى الإصابة بها مجدداً. أخبر طبيبك إذا أصبت بطفح جلدي مؤلم مع وجود بثور، فقد تكون هذه علامات على الإصابة بالحلا النطقي.¹

كنت مصاباً بالسل حالياً، أو سبق أن أصبت به، أو خالطت عن قرب شخصاً مصاباً بالسل.¹

اللقاحات:

تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي إذا كنت قد تلقيت لفاحاً مؤخراً أو تخطط لتلقي لفاح (تطعيم) - وذلك لأنه لا يوصى بتلقي لقاحات معينة (اللقاحات الحية) أثناء استخدام سيبينكو.¹

Pfizer

شركة فايزر العلمية الفنية المحدودة:

الرياض - حي العقيق

حي الملك عبدالله المالي، مبنى ٤٧،

الرمز البريدي: ١٣٥١٩

الهاتف: +٩٦٦١٢٢٩٩٥٥٠

الفاكس: +٩٦٦١٢٢٩٩٣٩٥

معلومات سلامة المريض

سيبينكو (أبروسيتنيب) – بطاقة المريض

سيقت لك الإصابة بجلطات دموية في أوردة ساقيك (الخثار الوريدي العميق) أو رئتيك (الانصمام الرئوي). أخبر طبيبك إذا أصبت بضيق التنفس المفاجئ، أو صعوبة في التنفس، أو ألم في الصدر أو ألم في الجزء العلوي من الظهر، أو تورم في الساق أو الذراع، أو ألم في الساق أو إيلام، أو احمرار الساق أو الذراع أو تغير في اللون، فقد تكون هذه علامات على وجود جلطات دموية في الأوردة.¹

الفحوصات المختبرية:

سيُجري طبيبك فحوصات الدم قبل وأثناء العلاج بسيبينكو، وقد يُعدّ علاجك إذا لزم الأمر.¹

الحمل ومنع الحمل:

إذا كنت سيدة قادرة على الإنجاب، ينبغي أن تستخدمي وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء فترة العلاج بسيبينكو ولمدة شهر واحد على الأقل بعد تلقي آخر جرعة من العلاج. يمكن لطبيبك تقديم المشورة إليك بشأن وسائل منع الحمل المناسبة.¹

لا تتناولي سيبينكو إذا كنت حاملاً أو تعتقدين أنك ربما تكونين حاملاً أو تخططين للحمل نظراً لأنه قد يسبب ضرراً للجنين النامي. أخبري طبيبك على الفور إذا أصبحت حاملاً أو كنت تعتقدين أنك ربما أصبحت حاملاً أثناء العلاج.¹

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

يجب الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها إلى

- المركز الوطني للبيقظة الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء:

مركز الاتصال الموحد في الهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999

هاتف مجاني: 8002490000

فاكس: +966-11-2057662

بريد إلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfda.gov.sa/>

- قسم البيقظة الدوائية لدى الشركة

بريد إلكتروني: SAU.AEReporting@pfizer.com

- للحصول على نسخ إضافية، يرجى إرسال بريد إلكتروني وتفاصيل الاتصال بك والكمية المطلوبة إلى

بريد إلكتروني: SAU.AEReporting@pfizer.com

المرجع:

1. Cibinco Patient Information Leaflet, Saudi Arabia, March 2024.



شركة فايزر العلمية الفنية المحدودة:

الرياض - جي العقيق

حي الملك عبد الله المالي، مبني ٧،

١٣٥١٩

الرمز البريدي: ٢٣٩٥٠

الهاتف: +٩٦٦١٢٢٣٩٥٠

الفاكس: +٩٦٦١٢٢٣٩٦٥