

KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Important Safety information to minimize the risk of immune-mediated adverse reactions.

May cause some serious side effects which can sometimes become life-threatening. These may happen any time during treatment or even after your treatment has ended. You may experience more than one side effect at the same time.¹

Contact your doctor right away if you develop any signs or symptoms including those not listed on this card. Your doctor may give you other medicines in order to prevent more severe complications and reduce your symptoms. Your doctor may withhold the next dose of Pembrolizumab or stop treatment with Pembrolizumab.¹

For more information, consult the Package Leaflet for KEYTRUDA containing information for the patient at [نظام معلومات الأدوية \(sfda.sa.gov.sa\)](http://sfda.sa.gov.sa)

IMPORTANT

- Do not attempt to treat side effects yourself.
- Do not stop your treatment with KEYTRUDA unless you have discussed this with your doctor
- **Carry this card for at least 4 months after last dose of pembrolizumab**, especially when you travel, whenever you go to the emergency room, or when you must see another doctor.
- Be sure to notify any health care professional you see that you are being treated with KEYTRUDA and show them this card.

Patient Card

Lungs¹

- Shortness of breath
- Chest pain
- Coughing
- **Intestines¹**
- Diarrhea or more bowel movements than usual
- Stools that are black, tarry, sticky, or contain blood or mucus
- Severe stomach pain or tenderness
- Nausea or vomiting

Liver¹

- Nausea or vomiting
- Feeling less hungry
- Pain on the right side of stomach
- Yellowing of skin or whites of eyes
- Dark urine
- Bleeding or bruising more easily than normal

Kidneys¹

- Changes in the amount or color of your urine

Hormone glands¹

- Rapid heartbeat
- Weight loss or weight gain
- Increased sweating
- Hair loss
- Feeling cold
- Constipation
- Deeper voice
- Muscle aches
- Dizziness or fainting
- Headaches that will not go away or unusual headache

Type 1 diabetes, including diabetic ketoacidosis¹

- Feeling more hungry or thirsty
- Needing to urinate more often
- Weight loss
- Feeling tired or feeling sick
- Stomach pain
- Fast and deep breathing
- Confusion
- Unusual sleepiness
- A sweet smell to your breath
- A sweet or metallic taste in your mouth
- A different odour to your urine or sweat.

- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in the package leaflet. You can also report side effects directly via Dpoc.saudi@merck.com.
- By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine

Important Contact Information

Name of Doctor

Office Phone

After-hours Phone

My Name

My Phone

Emergency Contact (Name and Phone)

Important Information for Health Care Providers

This patient is being treated with KEYTRUDA® (pembrolizumab), which can cause serious side effects that may appear any time during treatment or even after treatment. Assess patients for signs and symptoms of immune-mediated adverse reactions.¹ Early diagnosis and appropriate management are essential to minimize any consequences of immune-mediated adverse reactions.²

Consultation with an oncologist or other medical specialist may be helpful for management of organ-specific immune-mediated adverse reactions.



Copyright © 2025 Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Saudi Arabia is a subsidiary of Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

SA-KEY-00542. Expiry date: 30.Oct.2026

To report an adverse event, product quality complaint and other reportable information or if you have a medical inquiry, you can contact: Tel: +966112506700 Fax: +966 11 2506870

Email: DPOC.SAUDI@MERCK.COM

MSD Building #3, Business Gate, Airport Road, Qurtubah, Riyadh 13244
PO Box 17098 Saudi Arabia

Call for Reporting:

As a reminder, there is a need to report any suspected adverse reactions to:

National Pharmacovigilance Centre at Saudi Food and Drug Authority (SFDA):

SFDA call centre: 19999

E-mail: [npc.drug@sfda.gov.sa](mailto: npc.drug@sfda.gov.sa)

Website: <https://ade.sfda.gov.sa>

This card has been reviewed and approved by The Saudi Food and Drug Authority (SFDA)

كيترودا® (بيمبروليزوماب)

معلومات مهمة لتقليل مخاطر التفاعلات المناعية الضارة

قد يُسبب هذا الدواء بعض الأعراض الجانبية الخطيرة، قد يحدث هذا في أي وقت أثناء العلاج أو حتى بعد انتهاء العلاج. قد تواجهه أكثر من عرض جانبي في نفس الوقت.¹

راجع طبيبك على الفور إذا ظهرت لديك أي علامات أو أعراض بما في ذلك تلك غير المدرجة في هذه البطاقة. قد يصف لك طبيبك أدوية أخرى بهدف منع حدوث مضاعفات أكثر شدة وتقليل الأعراض لديك. قد يقوم طبيبك بتأجيل جرعتك التالية من بيمبروليزوماب أو يوقف علاجك بيمبروليزوماب.¹

لمزيد من المعلومات، راجع نشرة المعلومات الخاصة
بكيترودا التي تحتوي على معلومات للمرضى على الموقع
نظام معلومات الأدوية (fda.gov.sa) الإلكتروني

ملاحظات مهمة

- لا تناول علاج الأعراض الجانبية بنفسك.
- لا تتوقف عن العلاج بكيترودا إلا بعد أن تناوش هذا الأمر مع طبيبك.
- احتفظ بهذه البطاقة لمدة لا تقل عن 4 أشهر بعد آخر جرعة من بيمبروليزوماب، خاصة أثناء سفرك أو كلما ذهبت إلى غرفة الطوارئ أو عندما يتوجب عليك زيارة طبيب آخر.
- تتأكد من إبلاغ أي أخصائي رعاية صحية تراجعيه أنك تخضع للعلاج بكيترودا وقم بإبراز هذه البطاقة له.



تمت مراجعة واعتماد هذه البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

بطاقة المريض

الغدد الهرمونية¹

- تسارع ضربات القلب
- فقدان الوزن أو زيادة الوزن
- زيادة التعرق
- تساقط الشعر
- شعور بالبرد
- إمساك
- خسونة في الصوت أو صوت أعمق
- ألم العضلات
- دوخة أو إغماء
- صداع مستمر أو صداع غير عادي
- داء السكري من النوع الأول، بما في ذلك الحمض اللكيوني السكري¹

الرئتين¹

- ضيق في التنفس
- ألم في الصدر
- سعال

الأمعاء¹

- إسهال أو زيادة حرارة الأمعاء أكثر من المعتاد
- براز أسود لزج كالقطaran أو يحتوي على دم أو مخاط
- ألم حاد في المعدة أو أيام (ألم عند اللمس)
- غثيان أو قيء

الكلية¹

- غثيان أو قيء
- شعور بالجوع أقل من المعتاد
- ألم في الجانب الأيمن من البطن
- اصفرار الجلد أو بياض العينين
- بول داكن
- حدوث نزيف أو كدمات بسهولة أكثر من المعتاد

الكلية¹

- تغيرات في كمية أو لون البول لديك

- شعور بالجوع والعطش أكثر من المعتاد
- الحاجة إلى التبول المتكرر
- فقدان الوزن
- شعور بالتعب أو شعور بالمرض
- ألم المعدة
- تنفس سريع وعميق
- ارتيك
- تعبان غير عادي
- ظهور رائحة فواكه في أنفاسك
- طعم حلو أو معدني في فمك
- رائحة مختلفة للبول أو العرق لديك

إذا تعرضت لأي اعراض جانبية فتحت إلى طبيبك أو الصيدلي أو المرضية. وهذا يشمل أي اعراض جانبية محتملة غير مدرجة في نشرة الدعوة. يمكنك أيضا الإبلاغ عن الأعراض الجانبية مباشرة عبر Dpoc.saudi@merck.com يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول مامونية هذا الدواء من خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية.

اسم الطبيب	رقم هاتف العيادة	رقم هاتف ما بعد ساعات العمل
اسمي	رقم هاتف	جهة الاتصال في حالات الطوارئ (الاسم والهاتف)

معلومات مهمة لمقدمي الرعاية الصحية

يخضع هذا المريض للعلاج بكيترودا (بيبروليلزوماب)، والذي يمكن أن يسبب ردود فعل جانبية قد تظهر في أي وقت أثناء العلاج أو حتى بعد إيقاف العلاج. قم بتقدير المرضى فيما يتعلق بعلامات وأعراض ردود الفعل الجانبية المعاينة¹. التخخيص المبكر وتقدير العلاج المناسب ضروريان لتفادي أي عواقب لردود الفعل الجانبية المعاينة.² قد يكون التشاور مع أخصائي الأورام أو أخصائي طبي آخر مفيدا في علاج ردود الفعل الجانبية المعاينة التي تؤثر على أعضاء معينة في الجسم.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

للإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مشتبه بها يرجى التواصل مع:
المركز الوطني للتبيط الدوائي في الهيئة العامة للغذاء
والدواء:

199999 مركز الاتصال الموحد:

البريد الإلكتروني:

npc.drug@sfda.gov.sa

الموقع الإلكتروني:

<https://ade.sfda.gov.sa>



شركة ميرك شارب آند دوه

المكتب العلمي، الرياض، البوابة الاقتصادية مبني 3
SA-KEY-00542 . تاريخ الانتهاء: 30.أكتوبر.2026 .

في حال كان لديك استفسار أو رغبت في الإبلاغ عن عرض جانبي يمكنك التواصل
Tel: +966112506700 Fax: +966 11 2506870 Email: DPOC.SAUDI@MERCK.COM