

بطاقة تذكير للمريض

كابيتان® 10 & 20 ملجم (ايزوتريتينوين)

لقد حصلت على هذه البطاقة لأنه تم وصف كابيتان® 10 & 20 ملجم (ايزوتريتينوين) لك وتحتاج إلى معرفة الآثار الجانبية المحتملة.

يرجى قراءة هذه البطاقة ونشرة معلومات المريض جيدا قبل بدء العلاج بكابيتان® 10 & 20 ملجم (ايزوتريتينوين) للتأكد من فهم نطاق الآثار الجانبية المرتبطة بتناول كابيتان® 10 & 20 ملجم (ايزوتريتينوين).

يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض الخاصة بكابيتان® 10 & 20 ملجم (ايزوتريتينوين) لمزيد من المعلومات.

رقم الإصدار: 01

تاريخ الاتفاقية: 2025/05

تمت المراجعة والموافقة على هذا المستند من قبل الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

مخاطر الحمل

- يجب ألا تتناول الإيزوتريتينوين أثناء الحمل أو إذا كنت تخططين للحمل.
- إن التعرض للايزوتريتينوين يمكن أن يسبب ضرراً خطيراً للجنين.
- يجب عليك تجنب الحمل في الشهر السابق لبدء العلاج بالإيزوتريتينوين، أثناء تناول الإيزوتريتينوين، ولددة شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.
- تحدث إلى طبيبك للتتأكد - إذا كنت قادرة على الحمل، فيجب عليك استخدام وسائل منع الحمل الفعالة خلال هذا الوقت تأكيد من أنك تستخدم النوع الصحيح من وسائل منع الحمل.
- إذا فاتتك الدورة الشهرية، أو أصبحت حاملاً، أو اعتقديت أنك قد تكونين حاملاً، توقفي عن تناول الإيزوتريتينوين على الفور، واتصل بطبيب الأمراض الجلدية الخاص بك، واطلب المشورة الطبية. ينطبق هذا أثناء العلاج بالإيزوتريتينوين ولددة شهر واحد بعد التوقف.
- إذا كان هناك أي احتمال لحدوث الحمل، فيجب عليك إجراء اختبار حمل منتظم وفقاً لتعليمات طبيب الأمراض الجلدية. المزيد من المعلومات، راجع ملخص خصائص المنتج أو نشرة معلومات المريض



رقم الإصدار: 01

تاريخ الاتفاقية: 2025/05

تمت المراجعة والموافقة على هذا المستند من قبل الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

تذكيرات هامة للمرضى

- لا تشارك هذا الدواء مع أي شخص. يجب إعادة أي كبسولات من كابيتان® 10 & 20 ملجم (ايزوتريتينوين) غير مستخدمة بعد انتهاء العلاج أو بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية في عبوتها الأصلية إلى الطبيب أو الصيدلي للتخلص منها بشكل سليم.
- يجب عليك حضور مواعيد العيادة أثناء العلاج للمراقبة والرعاية المنتظمة.
- الصحة العقلية: تحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية حول علاجك أو إذا كانت لديك أية مخاوف.
- يجب عليك التوقف عن تناول كابيتان® 10 & 20 ملجم (ايزوتريتينوين) والاتصال بالطبيب الأخصائي بالأمراض الجلدية للحصول على مزيد من النصائح إذا كانت لديك أي مخاوف جدية بشأن صحتك العقلية أو أفكار حول إيذاء نفسك أو غيرها من الآثار الجانبية الخطيرة.
- يجب عدم التبع بالدم أثناء العلاج بكابيتان® 10 & 20 ملجم (ايزوتريتينوين) ولمدة شهر واحد بعد التوقف.
- إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن تناول كابيتان® 10 & 20 ملجم (ايزوتريتينوين)، فتحدث إلى طبيب الأخصائي بالأمراض الجلدية.

رقم الإصدار: 01

تاريخ الاتفاقية: 2025/05

تمت المراجعة والموافقة على هذا المستند من قبل الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

للإبلاغ عن الآثار الجانبية:

يمكنك الإبلاغ عن أي اعراض جانبية عن طريق:

- قسم التيقظ الدوائي في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما):

البريد الإلكتروني : pharmacovigilance@avalon.com.sa

الموقع الإلكتروني : <https://www.avalonpharmaceutical.com/>

الجوال : +966 55 222 1704

- المركز الوطني لتيقظ الدوائي (NPC):

البريد الإلكتروني : npc.drug@sfda.gov.sa

مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء : 19999

الموقع الإلكتروني : <https://ade.sfda.gov.sa/>



رمز الاستجابة السريع (QR Code)

رقم الإصدار: 01
تاريخ الاتفاقية: 2025/05

تمت المراجعة والموافقة على هذا المستند من قبل الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء