

# مقدمة عن إمبافيلي™ (بيجسيتاكوبلان)

دليل للمرضى و يقدمى الرعاية

تمت الموافقة على أنشطة خفض المخاطر من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

▼ يخضع هذا الدواء لرقابة إضافية. سيسمح ذلك بالتعرف السريع على معلومات السلامة الجديدة. يمكنك المساعدة عن طريق الإبلاغ عن أي آثار جانبية قد تتعرض لها. انظر نهاية القسم 4 من نشرة العبوة لمعرفة كيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية.



# المحتويات

## مقدمة

تم إعطاؤك هذا الكتيب لأنه قد تم وصف إيمبافيلي لك أو لشخص تحت رعايتك.

قد يبدو حقن نفسك أو شخص تحت رعايتك أمراً صعباً عند البدء لأول مرة، إلا أن هناك إرشادات قد تساعد في تسهيل دمج طريقة الاستخدام في روتينك اليومي. أثناء قراءتك لهذا الكتيب، ضع في اعتبارك أن كل مريض يختلف عن الآخر. يجب عليك التحدث مع طبيبك حول كيفية تطبيق هذه المعلومات.

سيقوم طبيبك بتبسيط بطاقة المريض وتزويشك بها. يرجى استخدامها للرجوع بسرعة إلى علاجك ورقم هاتف الطبيب ومعلومات السلامة الهامة.

يمكن لطبيبك أو المرض/المريض الإجابة على أي أسئلة محددة حول التشخيص وإدارة العلاج.

## ما هو دواء إيمبافيلي؟

إيمبافيلي هو دواء يستخدم لعلاج المرضى البالغين المصابين بمرض يسمى البيلة الهيماوغلوبينية الانثيابية الليلية. يُعطى العلاج مرتين أسبوعياً عن طريق الحقن تحت الجلد.

إيمبافيلي هو دواء يحتوي على المادة الفعالة بيسجستاكوبلان. تم تصميم بيسجستاكوبلان للارتباط بالبروتين التكميلي C3، وهو جزء من دفاعات الجسم ضد العدو يسمى "النظام التكميلي". يمنع بيسجستاكوبلان جهاز المناعة في جسمك من تدمير خلايا الدم الحمراء.

### بطاقة المريض:

- سوف تتلقى بطاقة مريض من طبيبك.
- ستحتوي هذه البطاقة على الرقم المرجعي الفريد الخاص بك للتوزيع المراقب.
- احمل هذه البطاقة في جميع الأوقات أثناء العلاج لمدة 8 أسابيع بعد آخر جرعة لك.
- أظهر هذه البطاقة لأي مقدم رعاية صحية يعالجك. سيساعدهم ذلك في تشخيصك وعلاجك بشكل صحيح.
- أظهر هذه البطاقة للصيدلية عند استلام وصفتك الطبية.
- احصل على العلاج فوراً لأي أعراض لعدوى بكثيرية خطيرة حتى لو لم تكن بطاقةك بحوزتك.

|   |    |
|---|----|
| مقدمة .....   | 3  |
| ما هو إيمبافيلي؟ .....                                      | 3  |
| خطر الإصابة بعدوى خطيرة .....                               | 5  |
| التطعيمات أو العلاج بالمضادات الحيوية .....                 | 5  |
| خطر حدوث تفاعلات تحسسية .....                               | 7  |
| خطر انحلال الدم داخل الأوعية الدموية بعد إيقاف الدواء ..... | 7  |
| توصيات بشأن وسائل منع الحمل .....                           | 8  |
| الإعداد للإعطاء الذاتي .....                                | 8  |
| وصف الأدوات المستخدمة للتسريب الذاتي: .....                 | 9  |
| الإبلاغ عن الآثار الجانبية .....                            | 10 |
| مزيد من المعلومات .....                                     | 11 |
| دون أي أسئلة لديك لزيارتكم القادمة للطبيب .....             | 11 |

## التطعيمات أو العلاج بالمضادات الحيوية

### اعتبارات السلامة

#### خطر الإصابة بعدوى خطيرة

- اللقاحات ضد البكتيريا تقلل من خطر الإصابة بعدوى خطيرة. ومع ذلك، فإن اللقاحات لا تمنع جميع أنواع العدوى الخطيرة.
- سيضمن طبيبك حصولك على التطعيم ضد بكتيريا المكوره الرئوية والنيisserية السحاچية والمستدمية النزلية وفقاً للإرشادات المحلية المعمول بها إذا لم تكن قد تلقيت هذه اللقاحات في الماضي.
- إذا كنت قد تلقيت هذه اللقاحات في الماضي، قد لا تزال بحاجة إلى تطعيمات إضافية قبل البدء في العلاج بـإيمبافيلي.
- يجب أن تلقي هذه التطعيمات قبل أسبوعين على الأقل من بدء العلاج بـإيمبافيلي.
- إذا لم تتمكن من الحصول على التطعيم قبل أسبوعين من بدء العلاج بـإيمبافيلي، سيصف لك طبيبك مضادات حيوية (أدوية لعلاج العدوى البكتيرية) لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، والتي يتبعها أن تستمر لمدة أسبوعين بعد التطعيم الخاص بك.
- عندما يتم تطعيمك، سيتم إعطاء طبيبك رقمًا مرجعياً للتوزيع المراقب. يتبعك على طبيبك كتابة هذا الرقم على بطاقة المريض الخاصة بك. ستحتاج إلى إظهار هذا الرقم للصيدلي قبل أن يتمكن من صرف إيمبافيلي.

### خطر حدوث تفاعلات تحسسية

قد تظهر تفاعلات تحسسية لدى بعض المرضى. أوقف تسرير إيمبافيلي واطلب المساعدة الطبية فوراً، في حال عانيت من أي من هذه العلامات والأعراض لتفاعل تحسسي:

- |  |   |
|--|---|
| صعوبة في التنفس  | • |
| ألم في الصدر أو ضيق في الصدر   | • |
| الشعور بالدوار/الإغماء   | • |
| حكة شديدة في الجلد أو نتوءات بارزة على الجلد                                       | • |
| تورم الوجه وأو الشفتيين وأو اللسان وأو الحلق، مما قد يسبب صعوبة في البلع أو انهيار | • |

اتصل بطبيبك أو احصل على رعاية طارئة على الفور إذا كان لديك أي من هذه العلامات والأعراض لعدوى خطيرة:

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| صداع وحمى                             | • |
| حمى وطفح جلدي                         | • |
| حمى مصحوبة بقشعريرة أو رعشة أو بدونها | • |
| ضيق التنفس                            | • |
| ارتفاع معدل ضربات القلب               | • |
| رطوبة الجلد                           | • |
| صداع مع تييس في الرقبة أو الظهر       | • |

## الإعداد للإعطاء الذاتي


يُعطى إيمبافيلي بالضخ تحت الجلد باستخدام مضخة تسريب. سيهتم طبيبك بعمليات الحقن الخاصة بك في البداية. بعد الحصول على التدريب المناسب على الحقن تحت الجلد من قبل طبيبك، يمكنك إعطاء جرعتك بنفسك مرتين أسبوعياً.

يأتي إيمبافيلي في قارورة زجاجية، يتعين حفظها في الثلاجة داخل العبوة الكرتونية الأصلية لحماية السائل من الضوء. تحتوي القارورة الواحدة على جرعة لاستخدام واحد.

يمكنك العثور على وصف مفصل لكيفية الإعطاء الذاتي في نشرة معلومات مريض إيمبافيلي وتعليمات الشركة المصنعة لمضخة التسريب.

## وصف الأدوات المستخدمة للتسريب الذاتي:

### للحقن تحت الجلد ستحتاج إلى:



للتوسيح فقط. قد تبدو المستلزمات التي تتلقاها مختلفة

- مضخة تسريب بنظام المحقنة وتعليمات الشركة المصنعة (غير موضحة).
- أ. مضخة تسريب بنظام المحقنة
- ب. محقنة متوافقة
- ج. إبرة نقل أو
- ج. 2. جهاز نقل بدون إبرة لسحب المنتج من القارورة
- د. مجموعة تسريب (غير موضحة؛ تختلف حسب تعليمات الشركة المصنعة للجهاز)
- هـ. أنبوب تسريب وموصل حرف واي "Y" (إذا لزم الأمر)
- وـ. حاوية أدوات حادة
- زـ. مسحات كحولية
- حـ. شاش وشريط لاصق، أو ضمادة شفافة

## خطر انحلال الدم داخل الأوعية الدموية بعد إيقاف الدواء

- إذا كنت تخاطط لإيقاف العلاج بإيمبافيلي، تأكد من مناقشة هذا الأمر مسبقاً مع طبيبك.
- من المهم جداً التأكد من أنك/المريض الذي تحت رعايتك لا تقوّت/يُفوت أو تؤجل/ يؤجل أي علاجات مجدولة.
- إذا تم إيقاف علاج إيمبافيلي تماماً، أو تم تأجيله (أو إذا تم تفويت العلاجات). هناك خطر من أن تحدث إحدى السمات الخطيرة لبيلة الهيموغلوبين الانتيابية الليلية، وهي انحلال الدم. يحدث انحلال الدم عندما تتكسر خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين عبر جسمك. ويرتبط انحلال الدم بأعراض مختلفة لبيلة الهيموغلوبين الانتيابية الليلية، مثل:

التعب (الإرهاق)

بول داكن (بيلة الهيموغلوبين)

ألم في البطن

ضيق التنفس

تكون جلطات دموية (التحثر)

صعوبة في البلع

ضعف الانتصاب

•

•

•

•

•

•

•

•

أبلغ طبيبك فوراً إذا لاحظت أي علامة أو عرض لانحلال الدم.

## توصيات بشأن وسائل منع الحمل

تأثيرات إيمبافيلي على الجنين غير معروفة. يوصى باستخدام وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء العلاج ولمدة تصل إلى 8 أسابيع بعد العلاج للنساء اللاتي في سن الإنجاب. اسأل طبيبك للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.

## الإبلاغ عن الآثار الجانبية

**مزيد من المعلومات**  
إذا كان لديك أي أسئلة حول صحتك أو حول إيمبافيلي، تحدث إلى طبيبك أو تواصل مع:

سويدش اورفان بيوتيرم اي بي (بوبيل):  
البريد الإلكتروني: [pv-ksa@sobi.com](mailto:pv-ksa@sobi.com)

الرقم المرجعي الخاص بي للتوزيع المراقب:

يرجى كتابة رقم التوزيع المراقب المخصص لك في المربع للرجوع إليه

دون أي أسئلة لديك لزيارتكم القادمة للطبيب

يُعد الإبلاغ عن الآثار الجانبية لعلاجك أمرًا مهمًا لأنه يسمح بجمع المزيد من المعلومات حول سلامة إيمبافيلي. إذا واجهت أي آثار جانبية (وهذا يشمل أيضًا أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في نشرة معلومات المريض)، وبشكل خاص العدوى الخطيرة بالبكتيريا الملغفة أو تفاعلات فرط الحساسية الشديدة أو انحلال الدم بعد إيقاف الدواء، أبلغ طبيبك أو الصيدلي أو المرض/المرضة.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية عن طريق الاتصال بطبيبك أو عن طريق الاتصال ب:



### المركز الوطني للبيط

مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء 19999

البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfda.gov.sa](mailto:npc.drug@sfda.gov.sa)

الموقع الإلكتروني <http://ade.sfda.gov.sa>

سويدش اورفان بيوتيرم اي بي (بوبيل):  
البريد الإلكتروني: [pv-ksa@sobi.com](mailto:pv-ksa@sobi.com)  
الموقع الإلكتروني: [Sobi in Middle East | Focus on Rare Diseases](http://Sobi in Middle East | Focus on Rare Diseases)  
رقم الهاتف: [+966 800 850 1523](tel:+9668008501523)

سوبی (Sobi) و ایمبافیلی (EMPAVELI®) هما علامتان تجاریتان لشرکة سویدش اورفان بیوتیرم ای بی (بوبل).  
© 2021-2022 شرکة سویدش اورفان بیوتیرم ای بی (بوبل) - جمیع الحقوق محفوظة. [www.sobi.com](http://www.sobi.com)

NP- 43527  
2025 يوليو

