



بطاقة المريض كلافيكت® سيلناتاكياباتاجين أوتولوسيل®

يرجى ملء معلوماتك واحتفظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم المقدم على بطاقة وانتقل إلى مركز علاج الخلايا الثانية أو المستشفى المحلي على الفور، اعرض هذه البطاقة على المتخصصين في علاج حالتك (الطبيب- الممرضة.. الخ)

اسم المريض:

جهة الاتصال عند الطوارئ

رقم هاتف مقدم الرعاية للمريض:

اسم مقدم الرعاية للمريض:

اطر هنا

جرى مراجعة هذه البطاقة والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA). الإصدار ١ أغسطس ٢٠٢٥

أخصائي الرعاية الصحية الأساسي لعلاج CAR-T

رقم هاتف أخصائي الرعاية الصحية:

اسم أخصائي الرعاية الصحية:

رقم هاتف مركز CAR-T:

عنوان مركز CAR-T:

اطر هنا

جرى مراجعة هذه البطاقة والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA). الإصدار ١ أغسطس ٢٠٢٥

معلومات مهمة للمريض

يرجى حمل هذه البطاقة معك طوال الوقت. أظهرها لأي طبيب يتبع حالتك وعندما تذهب إلى المستشفى.

أخبر أي اختصاصي رعاية صحية يتبع حالتك بأنك تستخدم دواء سيلناتاكياباتاجين أوتولوسيل.

خطط للبقاء بالقرب من المستشفى الذي تم علاجك فيه لمدة 4 أسابيع على الأقل بعدأخذك لجرعة دواء سيلناتاكياباتاجين أوتولوسيل.

لانق السيارة أو تستخدم الأدوات أو الآلات حتى 8 أسابيع على الأقل بعد أخذك لجرعة سيلناتاكياباتاجين أوتولوسيل.

راجع نشرة معلومات المريض لمزيد من المعلومات.

اطر هنا

جرى مراجعة هذه البطاقة والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA). الإصدار ١ أغسطس ٢٠٢٥

إذا واجهت أي أعراض جديدة، خاصةً أي من الأعراض المذكورة في هذه البطاقة، فيرجى إبلاغ طبيبك الخاص أو أخصائي الرعاية الصحية المعالج لك أو أي أخصائي رعاية صحية متاح على الفور.

يمكن أن يسبب سيلناتاكياباتاجين أوتولوسيل آثاراً جانبية خطيرة في أجزاء مختلفة من جسمك. يمكن أن تكون هذه الأعراض مهددة للحياة أو حتى مميتة ويجب معالجتها على الفور.

قد تتفاقم الأعراض التي تبدو طفيفة بسرعة.
وقد تتأخر الأعراض وقد تظهر بعد أسابيع من أخذك لجرعة.

اطر هنا

جرى مراجعة هذه البطاقة والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA). الإصدار ١ أغسطس ٢٠٢٥



اتصل بـأخصائي الرعاية الصحية المعالج لك على الفور إذا كنت تعاني من أيٍ من هذه الأعراض:

السُّمْيَةُ الْعَصِيبِيَّةُ

1. الشعور بالارتباك
2. الشعور بقلة اليقظة أو التوهان أو القلق أو فقدان الذاكرة
3. صعوبة في التحدث أو التلعثم في الكلام
4. حركات أبطأ أو تغيرات في خط اليد

متلازمة إطلاق السيتوكين (CRS)

1. حمى (38 درجة مئوية أو أعلى)
2. قشعريرة
3. سرعة ضربات القلب
4. صعوبة في التنفس
5. الشعور بالدوار أو الدوخة

اطو هنا

جزي مراجعة هذه البطاقة والمواقف عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA). الإصدار ١ أغسطس ٢٠٢٥

معلومات يقوم فريق الرعاية الصحية بتعبئتها

يرجى إعطاء هذه البطاقة لفريق الرعاية الصحية في مركز CAR-T لملء المعلومات وإعادتها إليك.

في (التاريخ)

تلقي هذا المريض سيلناتابنجين أو تولوسيل، وهو علاج بالخلايا الثانية ذات مستقبلات المستضدات الخيميرية (علاج بخلايا CAR-T) للورم النقوي المتعدد.

(رقم الكتف)

اطو هنا

جزي مراجعة هذه البطاقة والمواقف عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA). الإصدار ١ أغسطس ٢٠٢٥

معلومات مهمة لأخصائي الرعاية الصحية

تلقي هذا المريض علاجاً مناعياً بالخلايا الثانية الذاتية المعدلة وراثياً، والذي قد يسبب متلازمة إطلاق السيتوكين (CRS) والسمية العصبية الشديدة. قد تؤثر متلازمة CRS على أي جهاز عضوي. لذلك، قم بتقدير المريض للبحث عن علامات وأعراض متلازمة CRS والسمية العصبية.

راجع ملخص خصائص المنتج للحصول على التفاصيل الكاملة.

اطو هنا

جزي مراجعة هذه البطاقة والمواقف عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA). الإصدار ١ أغسطس ٢٠٢٥

قبل تقديم أي علاج، اتصل بـأخصائي الرعاية الصحية الأساسي على الرقم الموجود على وجه البطاقة.

يجب ألا يتبرع هذا المريض بالدم أو الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا لعمليات الزرع.

اطو هنا

جزي مراجعة هذه البطاقة والمواقف عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA). الإصدار ١ أغسطس ٢٠٢٥

للحصول على معلومات الوصفة الطبية الكاملة، يرجى
الرجوع إلى ورقة البيانات أو الاتصال بشركة

Johnson & Johnson Trading Limited

(الرياض)

العنوان: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، البرج بـ،
المبنى 30، أبراج العليا.

هاتف المكتب 00966-11-4339133

العنوان البريدي: ص.ب: 65305 الرياض 11556،

المملكة العربية السعودية

للإبلاغ عن الآثار العكسية بشكوى المنتج أو أي استفسارات

بشأن المعلومات الطبية، يرجى الاتصال بنا على:

البريد الإلكتروني: GCC-PV2@its.jnj.com

الخط الساخن: 00966540015811

إرشادات الإبلاغ عن الآثار العكسية:

الهيئة العامة للذاء والدواء السعودية (المركز الوطني
للبيطري الدوائي)

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

الهاتف: 19999

إرشادات الإبلاغ عن الآثار العكسية:

الهيئة العامة للذاء والدواء السعودية (المركز الوطني
للبيطري الدوائي)

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

الهاتف: 19999

عبر الإنترنت: <http://ade.sfda.gov.sa>



اطلب هنا

جزء من مراجعة هذه البطاقة وموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للذاء والدواء السعودية (SFDA). الإصدار ١ أغسطـس ٢٠٢٥