

تاسيجنا® (نيلوتينيب)
تُعد مواد معلومات المريض
ضرورية لضمان الاستعمال
الآمن والفعال للدواء والتعامل
مع المخاطر المهمة المحددة
بشكل صحيح.

تمت الموافقة على هذه المادة من قبل الادارة التنفيذية للتبيظ الدوائي في الهيئة العام للغذاء
والدواء في المملكة العربية السعودية



نشرة المريض

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى أو لطلب نسخ إضافية من خلا لـ:
شركة نوفارتس - السعودية - قسم سلامة المرضى:
الرقم المجاني: 80001240078
الهاتف: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠
الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧
الايميل: adverse.events@novartis.com
أو عن طريق الانترنت: <https://www.report.novartis.com/ar>



 NOVARTIS

Tasigna®(nilotinib) SFDA approved RMP Educational Materials V 19.1 Aug 2025

ما هي استخدامات تاسيجنا (نيلوتنيب)؟

يستعمل تاسيجنا لعلاج أحد أنواع سرطان الدم يُدعى سرطان الدم النخاعي المُزمن الإيجابي لكرهوموسوم فيلادلفيا سرطان الدم النخاعي المُزمن هو سرطان Ph-positive" الدم يجعل الجسم ينتج كمية أكبر مما يجب من خلايا "CML" الدم البيضاء غير الطبيعية يستعمل تاسيجنا للمرضى البالغين والأطفال ممن تم تشخيص إصابتهم حديثاً بمرض سرطان الدم النخاعي المُزمن أولى المرضى المصابين بسرطان الدم النخاعي المُزمن الذي لم يعودوا يستفيدون من العلاج السابق بما في ذلك إيماتينيب. يستخدم أيضاً في المرضى من البالغين والأطفال الذين تعرّضوا لأعراض جانبية خطيرة مع علاج سابق وليس بإمكانهممواصلة تناولها.

ما ينبغي ألا تفعله

- لا تتناول تاسيجنا مع الوجبات.
- يؤدي تناول الوجبات في آن واحد مع تاسيجنا إلى ارتفاع تركيز تاسيجنا في الدم وقد يؤدي إلى آثار جانبية شديدة مثل إطالة فترة موجات رسم القلب (QT prolongation) (QT prolongation)
- لا تتناول أي وجبات قبل ساعتين وبعد ساعة من تناول جرعة الدواء
- لا تتناول أي جريب فروت أو عصيره في أي وقت أثناء فترة العلاج بتاسيجنا
- يتفاعل الجريب فروت مع إحدى الإنزيمات داخل الجسم مما يؤدي إلى ارتفاع تركيز تاسيجنا في الدم إلى حد ضار استشر الطبيب المعالج عن أي مأكولات ينبغي الابتعاد عنها أثناء العلاج بتاسيجنا
- لا تتناول أي نوع علاج آخر دون استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي حتى إذا كان العلاج المذكور من الأدوية التي يتم صرفها دون أمر الطبيب أو كان علاجاً بالأعشاب (مثل سان جون وورت) وسيقرر الطبيب التغييرات الازمة في العلاجات والأدوية التي تتناولها في الوقت الحالي.
- لا تتوقف عن تناول عقار التاسيجنا إلا بمعرفة الطبيب

ما الذي ينبغي أن أفعله إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أكبر من اللازم من تاسيجنا؟

إذا تناولت جرعة أكبر من اللازم من تاسيجنا عمماً وصفه الطبيب المعالج أو إذا تناول أحد العلاج عن طريق الخطأ، اتصل بالطبيب المعالج أو أقرب مستشفى على الفور واعرض لهم العبوة الخاصة بالدواء حيث أن الأمر قد يتطلب علاجاً طبياً عاجلاً.

ما الذي ينبغي أن أفعله إذا شعرت بالغثيان أو القيء بعد تناول تاسيجنا، لا تتناول

إذا شعرت بالغثيان أو القيء بعد تناول تاسيجنا، لا تتناول جرعة أخرى واتصل بالطبيب المعالج على الفور

أفعل ولا تفعل عند تناولك تاسيجنا ما ينبغي أن تفعله

تناول الجرعة مرتين يومياً ويفضل أن يتم ذلك في نفس التوقيت كل يوم حسب توصيات الطبيب المعالج علماً بأن الجرعات تختلف عن جرعات (جلايفك®) الذي يتناوله المريض مرة واحدة يومياً - راعي ألا يفوتك ذلك تناول الأقراص كاملة بكمب ماء كامل - لا قصعها تناول الجرعة التالية بعد مرور 12 ساعة من تناولك الجرعة الأولى - وإذا تناولت الجرعة الأولى في العاشرة صباحاً، انتظر حتى العاشرة مساءً لتناول الجرعة التالية تناول تاسيجنا فور صرف أقراص الدواء بعرفة الطبيب المعالج وراعي أن تخلص من أي علاج آخر كنت تتناوله سابقاً، أما إذا نسيت أن تتناول الجرعة في موعدها المحدد، فلا تتعوه بالاحرص أن تتناول الجرعة التالية في الموعده. تحت اشراف الطبيب، في حالة قد حصلت إستجابة طويلة المدى (على سبيل المثال MR4.5 على الأقل)، قد تكون مؤهلاً لوقف تاسيجنا. في حالة توقفت عن علاج تاسيجنا سوف تحتاج اختبار دم متكرر لاختبار حالة مرض CML ، ولمعرفة إذا كنت بحاجة لمواصلة تناول عقار التاسيجنا.

أخبر الطبيب المعالج إذا كنت :

- تعانى من إطالة موجات رسم القلب (QTprolongation) لديك تاريخاً مرضياً بتلك الحالة عانيت من حالة إغما أو تعرضت لاضطرابات في ضربات القلب أثناء علاجك بتاسيجنا (نيلوتنيب) حيث أنها قد تكون علامات إطالة موجات رسم القلب (QT prolongation) تعانى من انخفاض تركيز أيونات وأملاك حالدم مثل البوتاسيوم أو المغنيسيوم
- تعانى من تورم القدمين أو اليدين أو تورم عام في الجسم أو زيادة سريعة في الوزن حيث أنها قد تكون علامات احتباس شديد للسوائل في الجسم، علماً أن عدد حالات احتباس السوائل في الجسم التي أبلغ عنها من قبل كانت قليلة تعانى من اضطرابات في القلب أو الكبد أو ارتفاع نسبة الكوليستيول في الدم أو مرض البول السكري
- أو كنت تتناول علاج ما للأمراض المذكورة أعلاه حامل أو تقومين بإرضاع طفلك أو كنت تعانى من صعوبة هضم الالكتروز أو كنت تعانى من أي آثار جانبية أثناء العلاج
- تعانى من آلام بالصدر أو تشعر بعدم الارتياح بالصدر أو تميل أو ضعف أو اضطرابات أثناء السير أو اضطرابات في الكلام أو آلام أو تغيرات في اللون أو شعور بالبرودة في أحد الأطراف - أخبر الطبيب فوراً حيث أنها قد تكون أعراض وعلامات إصابة في الجهاز الدورى فقد تم الإبلاغ من قبل عن إصابات خطيرة في الجهاز الدورى ومنها اضطرابات في تدفق الدم في الساق (مرض انسداد الشريان الطرفية) وانسداد الشريان التاجية المغذية للقلب واضطرابات في تغذية المخ بالدم) (مرض انسداد الشريان (كما يتعين على الطبيب المعالج قياس نسبة السكر والدهون في الدم قبل الخوض في العلاج وكذلك إذا شعرت بألم في العضلات والمفاصل والأطراف أو آلام في ظهرك بعد توقفك عن عقار التاسيجنا .