

<p style="text-align: center;">210 mm</p> <p style="text-align: center;">60 mm</p> <p style="text-align: center;">60 mm</p> <p style="text-align: center;">60 mm</p> <p style="text-align: center;">35 mm</p>	<p style="text-align: center;">ما هي أعراض ندرة المحببات؟</p> <p>قد لا تظهر عليك أعراض. اختبار الدم لقياس عدد خلايا الدم البيضاء لديك. هو الوسيلة الوحيدة لتحقق من وجود ندرة المحببات. ذلك يساعد طبيبك في معرفة إن كنت أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.</p> <p><b>عند معاييرك من أي من هذه الإعراض، أعلم طبيبك على الفور!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إلتهاب بما في ذلك الجلد أو الحلق أو المسالك البولية أو المهبل أو الالتهاب الرئوي أو أي عدوى أخرى حمى أو قشعريرة</li> <li>• تقرحات أو بثور داخل الفم أو اللثة أو على الجلد جروح تحتاج وقتاً طويلاً للشفاء</li> <li>• الشعور بالإنفلونزا</li> <li>• ألم أو حرق أثناء التبول حكة أو افراز غير معتاد بالمهبل</li> <li>• آلام بالبطن</li> <li>• قرح أو ألم في المنطقة الشرجية أو حولها</li> <li>• الشعور بالضعف أو الإرهاق الشديدين</li> </ul> <p><b>ما تحتاج معرفته عن زابينيكس وخطر الإصابة بندرة المحببات:</b></p> <p><b>ما الذي أستطيع فعله لخفض خطر الإصابة بندرة المحببات؟</b></p> <p><b>يمكنك فعل ثلاثة أشياء مهمة:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. اختبار الدم كما يصف الطبيب</li> <li>2. إعلام الطبيب بالأدوية التي تأخذها (سواء كانت بوصفة طبية أم لا)، وإن كنت تبدأ بدواء جديد</li> <li>3. إعلام الطبيب مباشرة في حالة الإصابة بالحمى أو الشعور بالإعياء</li> </ol> <p><b>ما هي متطلبات اختبار الدم الخاص بزابينيكس؟</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سينطلب منه الطبيب اختبارات الدم وفقاً للترتيب محدد</li> <li>• سُجّري اختبارات الدم وفقاً للجدول التالي أو كما يصف الطبيب:</li> <li>- اختبارات دم أسبوعية خلال الشهور الـ 6 الأولى منأخذ زابينيكس</li> <li>- كل أسبوعين خلال الشهور الـ 6 التالية استمر عدد الخلايا البيضاء لديك في المعدل الطبيعي.</li> <li>- كل 4 أسابيع بعد السنة الأولى استمر عدد الخلايا البيضاء لديك في المعدل الطبيعي.</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;"><b>اختبار الدم</b></p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان عدد العدلات المطلقة قليل جداً، سينجري الطبيب اختبارات الدم بصورة أكثر تكراراً</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;"><b>رصد النتائج</b></p> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سينطلب منه الطبيب اختبارات الدم وفقاً للترتيب محدد</li> <li>• سُجّري اختبارات الدم وفقاً للجدول التالي أو كما يصف الطبيب:</li> <li>- اختبارات دم أسبوعية خلال الشهور الـ 6 الأولى منأخذ زابينيكس</li> <li>- كل أسبوعين خلال الشهور الـ 6 التالية استمر عدد الخلايا البيضاء لديك في المعدل الطبيعي.</li> <li>- كل 4 أسابيع بعد السنة الأولى استمر عدد الخلايا البيضاء لديك في المعدل الطبيعي.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>اختبار الدم</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان عدد العدلات المطلقة قليل جداً، سينجري الطبيب اختبارات الدم بصورة أكثر تكراراً</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>رصد النتائج</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>دليل المرضي ومقدمي الرعاية الصحية</b></p> <p>ما الذي تحتاج لمعرفته عن زابينيكس وخطر الإصابة بندرة المحببات</p> <p><b>ما هو زابينيكس وفيما يستخدم؟</b></p> <p>زابينيكس هو علاج يوصف بمعرفة الطبيب، ويُستخدم لعلاج المرضي المصابين بالقصاص، والذين لم يستجيبوا للأدوية الأخرى. قد يُخفّض زابينيكس أيضًا من خطر السارك انتحاري.</p> <p>يوصى زابينيكس لمرضي الفصام المقاومين للعلاج، وكذلك مرضي الفصام المصابين بأعراض جانبية عصبية حادة للأدوية الأخرى وغير قابلة للعلاج، توصف مقاومة العلاج بغياب التحسن للمرضى رغمًا عن استخدام الجرعات المناسبة من الاثنين من الأدوية المختلفة على الأقل، والتي توصف لمدة مناسبة. ويوصى أيضًا مع الاضطرابات النفسية التي تحدث خلال مرض باركنسون في حالة اخفاق العلاج.</p> <p><b>ما هي أكثر المعلومات أهمية حول العلاج بزابينيكس؟</b></p> <p>يمكن لزابينيكس التسبب في ندرة المحببات. ندرة المحببات هو نقص في نوع معين من خلايا الدم.</p> <p>يؤدي ذلك إلى صعوبة مقاومة جسمك للعدوى.</p> <p> يجب أن تجري اختبارات دورية للدم قليل بدء استعمال زابينيكس وثناء العلاج، وذلك لقياس عدد العدلات بالدم.</p> <p>يُسمى هذا الاختبار بعد العدلات المطلقة (ANC). إذا كان عدد العدلات (ANC) منخفضًا جدًا، ربما تكون في حاجة لإيقاف زابينيكس. سيحدد الطبيب إذا كانت إعادة بدء العلاج بزابينيكس آمنة، وسيحدد موعد ذلك.</p> <p>ذلك ليس العرض الجانبي الوحيد المرتبط بزابينيكس. تحدث مع الطبيب حول الأخطار الأخرى.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• سينطلب منه الطبيب اختبارات الدم وفقاً للترتيب محدد</li> <li>• سُجّري اختبارات الدم وفقاً للجدول التالي أو كما يصف الطبيب:</li> <li>- اختبارات دم أسبوعية خلال الشهور الـ 6 الأولى منأخذ زابينيكس</li> <li>- كل أسبوعين خلال الشهور الـ 6 التالية استمر عدد الخلايا البيضاء لديك في المعدل الطبيعي.</li> <li>- كل 4 أسابيع بعد السنة الأولى استمر عدد الخلايا البيضاء لديك في المعدل الطبيعي.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>اختبار الدم</b></p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان عدد العدلات المطلقة قليل جداً، سينجري الطبيب اختبارات الدم بصورة أكثر تكراراً</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>رصد النتائج</b></p>					

