

دليل إكسجيد/جادنيو® (ديفراسيروكس)
الخاص بالمرضى لمعرفة فعالية الدواء
والأعراض الجانبية

التاريخ:

الاسم:

تمت مراجعة واعتماد هذا الكتيب من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

جدول المحتويات

دليل إكسجيد

- مقدمة: دليل إكسجيد/جادنيو ® (ديفيرا سيروكس)
- يتتوفر ديفيرا سيروكس في أشكال متعددة
- ما هو إكسجيد/جادنيو ® (ديفيرا سيروكس)؟
- لماذا وُصف لي إكسجيد/جادنيو ؟
- كيف يعمل إكسجيد/جادنيو ؟
- ما دواعي استعمال إكسجيد/جادنيو ؟
- كيف أتناول أقراص جادنيو ® (ديفيرا سيروكس) المغلفة؟
- كيف أتناول أقراص إكسجيد ® (ديفيرا سيروكس) القابلة للذوبان؟
- كيف أحفظ أقراص إكسجيد/جادنيو ؟
- كيف سيخضع علاجي للمراقبة؟
- هل إكسجيد/جادنيو يتضمن آثاراً جانبية؟
- ماذا عن الأدوية الأخرى التي أحتاج أيضاً إلى تناولها من أجل صحتي؟
- منع الحمل
- تقدمي مع إكسجيد/جادنيو
- معلوماتي الأساسية
- بدء تناول إكسجيد/جادنيو

مقدمة: دليل إكسجيد/جادنيو ® (ديفيرا西روكس)

يحتوي هذا الدليل على معلومات مهمة حول إكسجيد وجادنيو. سترى على تناول إكسجيد/جادنيو بالطريقة الصحيحة، وكذلك مراقبة علاجك، والآثار الجانبية المحتملة، وتناول أدوية أخرى أثناء تناول إكسجيد/جادنيو.

يتوفر ديفيرا西روكس في أشكال متعددة. لكل منها شكل ولون مختلف

من المهم أن تتناول دواعك وفقاً لتوجيهات طبيبك.

1) أقراص جادنيو المغلفة عبارة عن أقراص زرقاء ببصارة الشكل. ويجوز ابتلاعها كاملة على معدة فارغة أو مع وجة خفيفة. إذا كنت غير قادر على ابتلاع الأقراص الكاملة، يجوز لك سحق أقراص إكسجيد المغلفة وتنثرها على الطعام اللين.



2) أقراص إكسجيد القابلة للتشتيت هي أقراص دائرية بيضاء إلى صفراء قليلاً. ويجب إذابتها في سائل وتتناولها على معدة فارغة.




الأقراص المعروضة ليست بالحجم الفعلي

جادنيو في شكل أقراص مغلفة و إكسجيد أقراص قابلة للتشتيت في المملكة العربية السعودية.. ومع ذلك، تتوفر الأدوية التي تحتوي على إكسجيد أيضاً في شكل أقراص مغلفة وأقراص قابلة للانتشار يجري تسويفها تحت أسماء تجارية مختلفة كبدائل عامة لإكسجيد/جادنيو في حالة التحويل من أقراص ديفيرا西روكس القابلة للانتشار إلى أقراص إكسجيد المغلفة، سيعين عة أقل من أقراص ديفيرا西روكس القابلة للانتشار. إذا لم تتناول الجرعة الأقل المعدلة وفقاً لتوجيهات طبيبك بشأن طبيعة أقراص إكسجيد المغلفة، فقد تتناول عن غير قصد جرعة من ديفيرا西روكس أكثر مما ينبغي وحينذا قد تعاني عكسية للجرعة الزائدة. في هذه الحالة، أبلغ طبيبك على الفور أو اتصل بخدمات الطوارئ، حيث قد يكون ذلك ضرورياً انظر الصفحة 17 قد تعاني من آثار مثل ألم في البطن، والإسهال، والغثيان، والقيء، ومشكلات في الكبد يمكن أن تكون خطيرة.

كيف يعمل إكسجيد/جادنيو ؟

يعمل إكسجيد من خلال عملية تسمى "الاستخاب".
بعد البلع، يدخل إكسجيد/جادنيو إلى دمك و"يلقط" الحديد الزائد الموجود.



ما دواعي استعمال إكسجيد/جادنيو ؟

يستخدم إكسجيد/جادنيو لعلاج فرط الحديد المزمن الناجم عن عمليات نقل الدم المتكررة لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات وأكثر المصابين باضطراب في الدم يسمى ثلاسيميا بيتا الكبري.

يستخدم إكسجيد/جادنيو أيضاً لعلاج فرط الحديد المزمن عندما لا ينبغي استخدام دواء يسمى ديفيروكسامين أو لم يحسن النتائج لدى المرضى المصابين بالثلاسيميا بيتا الكبري وفرط الحديد الناجم عن عمليات نقل الدم غير المتكررة، وفي المرضى الذين يعانون من أنواع أخرى من اضطرابات الدم تسمى فقر الدم، وفي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 5 أعوام.

يستخدم إكسجيد/جادنيو أيضاً عندما لا ينبغي استخدام ديفيروكسامين أو لم يحسن النتائج لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات أو أكثر من يعانون من فرط الحديد المرتبط بمتلازمات الثلاسيميا، ولكنهم لا يعتمدون على نقل الدم.

ما هو إكسجيد/جادنيو ® (ديفراسيروكس)؟

يساعد إكسجيد/جادنيو على التخلص من الحديد الزائد في الجسم. ولهذا السبب، فإنه يُعرف باسم "مستخلب الحديد" أو "عامل الاستخاب".

لماذا وُصف لي إكسجيد/جادنيو ؟

تحتاج العديد من الحالات إلى عمليات نقل دم. ومن بينها:

- β -الثلاسيميا الكبري
- داء الخلايا المنجلية أو
- متلازمات خلل التنسج النقري منخفضة الخطورة أو
- أنواع فقر الدم الأخرى

إذا كنت تعاني من إحدى هذه الحالات، فمن المحتمل أن تكون قد خضعت للعديد من عمليات نقل الدم. تحتوي عمليات نقل الدم على خلايا الدم الحمراء السليمية التي يحتاجها جسمك ويمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن.

تحتوي كل عملية نقل دم تضمن لها على الحديد. ويعتبر الحديد مهمًا لأن خلايا الدم الحمراء تستخدمه لحمل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك. ومع ذلك، لا يمتلك الجسم طريقة خاصة للتخلص من الحديد الزائد.

تتراكم كمية الحديد مع كل عملية نقل دم، وقد يؤدي هذا الحديد الزائد في جسمك إلى حالة تسمى فرط الحديد المزمن. وقد يكون الإفراط في تناول الحديد ضاراً ويضر بالأعضاء مثل القلب والكبد.

من المهم التخلص من هذا الحديد الزائد للحفاظ على مستوى آمن، وصحي.

كيف أتناول أقراص جادنيو ® (ديفيراسيروكس) المغلفة؟

ما الجرعة التي سأتناولها؟

تعتمد جرعتك الموصوفة من أقراص إكسجيد المغلفة على وزنك، ومستوى الحديد الحالي لديك، ووظائف الكبد والكلى لديك، وعدد مرات نقل الدم التي خضعت لها.

إذا كنت تنتقل من أقراص إكسجيد ® (ديفيراسيروكس) القابلة للتشتيت إلى أقراص جادنيو المغلفة، فسوف تحتاج إلى جرعة أقل. إذا كنت تنتقل من دواء مختلف (مثلاً ديفيروكسامين) إلى أقراص إكسجيد المغلفة، فقد يختار طبيبك جرعة ديفيراسيروكس الخاصة بك استناداً إلى مقدار الدواء السابق الذي كنت تتناوله.

إذا كنت في المملكة العربية السعودية، تسجل الأدوية التي تحتوي على ديفيراسيروكس في شكل أقراص مغلفة وأقراص قابلة للانشقاق بألقاب مختلفة كبدائل عامة لعقار إكسجيد. وإذا كنت تغير من دواء مختلف (مثلاً، ديفيروكسامين) إلى أقراص جادنيو المغلفة، فقد يختار طبيبك جرعة إكسجيد الخاصة بك بناءً على مقدار الدواء السابق الذي كنت تتناوله.

أي قرص (أقراص/أكياس) سأتناول؟


تأتي أقراص جادنيو المغلفة بأحجام مختلفة من الأقراص، وقد تحتاج إلى تناول أكثر من واحد. سيخبرك طبيبك بعدد الأقراص وأي حجم (أحجام) التي ينبغي أن تتناولها كل يوم.

أقراص إكسجيد المغلفة



الأقراص/الأكياس المعروضة ليست بالحجم الفعلي

Option 1



ينبغي ابتلاع أقراص جادنيو المغلفة كاملة مع بعض الماء. وإذا كنت غير قادر على ابتلاع الأقراص الكاملة، يمكنك سحق أقراص جادنيو المغلفة ونشر الجرعة الكاملة على كمية صغيرة من الطعام الطري، مثل الزبادي أو صلصة التفاح (التفاح المهروس).

ينبغي عليك تناول الجرعة بالكامل وعلى الفور وعدم تخزين أي منها لاستخدام في المستقبل.

ينبغي تناول أقراص إكسجيد المغلفة مرة واحدة يومياً. ينبعي أن تتناول جادنيو بشكل مثالي في نفس الوقت كل يوم. يجوز تناول أقراص جادنيو المغلفة على معدة فارغة أو مع وجبة خفيفة.

ماذا لو نسيت تناول جرعي؟


إذا فاتتك جرعة من جادنيو ، فلا يزال ينبغي عليك تناولها عندما تذكر، حتى لو كان ذلك في وقت لاحق من اليوم. وتناول جرعتك كما هو مقرر.

لا تتناول جرعة مضاعفة في اليوم التالي لتعويض القرص (الأقراص) التي نسيتها.

ماذا لو تناولت أقراص إكسجيد أكثر مما ينبغي؟

إذا تناولت الكثير من جادنيو ، أو إذا تناول شخص آخر قرصك (أقراصك) عن طريق الخطأ، فاتصل بطبيبك أو المستشفى للحصول على المشورة على الفور. اعرض على الطبيب عبوة الأقراص أو. قد يكون العلاج الطبي العاجل ضرورياً. قد تتعافى من آثار مثل ألم في البطن، والإسهال، والغثيان، والقيء، ومشكلات في الكلى أو الكبد يمكن أن تكون خطيرة.

Option 2



كيف أحفظ أقراص إكسجيد؟

يجب حفظ أقراص إكسجيد في عبواتها الأصلية لحمايتها من الرطوبة.

ما هي خطوات تناول أقراص إكسجيد القابلة للذوبان؟



الخطوة الثالثة:

ارش خلط إكسجيد بالكامل فوراً. ثم أضف كمية قليلة من الماء أو العصي إيل ما تبقى في الكوب، وأخلط السائل جيداً ورشيه أيضاً.

الخطوة الثانية:

قلب قرص (أو أقراص) إكسجيد ح يتذوب بالكامل. سيمكرون السائل الذي يف الكوب وقد يصبح قوام الخليط سميكاً.

الخطوة الأولى:

ضع قرص (أو أقراص) إكسجيد القابل للذوبان. يف كوب من عصي إل ريقيل أو المفاح أو الماء. يمكنك أيضاً استخدام زجاجة خلط إكسجيد. تاك من استخدامك لنفس كمية السائل ال ت أوصي به الطبيب.

يُمنع مضغ أو بلع الأقراص كاملاً. ويُمنع كسر الأقراص أو طحنها. ويُمنع إذابة أقراص إكسجيد القابلة للذوبان في المياه الغازية أو الحليب.

ماذا لو نسيت تناول جرعتي؟

إذا نسيت تناول جرعتك من أقراص إكسجيد، فيظل عليك تناولها بمجرد أن تذكر، حتى لو تذكرتها في وقت متأخر من اليوم. ويجب تناول جرعتك التالية في الوقت المحدد. لا تتناول جرعتين في اليوم التالي لتعوض الأقراص التي نسيت تناولها.

ماذا لو تناولت أقراص إكسجيد أكثر مما ينبغي؟

إذا تناولت أقراص إكسجيد أكثر مما ينبغي، أخبر طبيبك على الفور أو تواصل مع خدمات الطوارئ الطبية. فربما تحتاج إلى علاج طبي عاجل.

إذا تناولت الكثير من إكسجيد، أو تناول شخص آخر أقراصك عن طريق الخطأ، اتصل بطبيبك أو المستشفى للحصول على المشورة على الفور. واعرض عليهم علبة الأقراص. قد يكون العلاج الطبي العاجل ضروريًا.

كيف أتناول أقراص إكسجيد ® (ديفراسيروكس) القابلة للذوبان؟

ما الجرعة التي سأتناولها؟

تعتمد جرعتك الموصوفة من أقراص إكسجيد القابلة للذوبان على وزنك، ومستوى الحديد الحالي لديك، ووظائف الكبد والكلى، وعدد المرات التي خضعت فيها لنفط الدم. أما إذا كنت انتقلت إلى استخدام أقراص إكسجيد القابلة للذوبان بعد أن كنت تستخدم دواءً مختلفاً (مثل ديفيروكسامين)، فربما يختار طبيبك جرعة إكسجيد بناءً على حجم جرعة الدواء السابق.

أي قرص (أو أقراص) سأتناول؟

تأتي أقراص إكسجيد القابلة للذوبان بأحجام مختلفة وقد تحتاج إلى تناول أكثر من قرص. سيخبرك طبيبك بعد الأقراص التي ينبغي لك تناولها يومياً وحجمها.



500 ملغم



250 ملغم



125 ملغم

الأقراص موضحة بالحجم الفعلي.

متى سأحتاج إلى تناول أقراص إكسجيد القابلة للذوبان؟

يجب تناول أقراص إكسجيد مرة واحدة يومياً والموا拙بة على تناولها في نفس الميعاد كل يوم. إذ إن تناول إكسجيد في نفس الموعد كل يوم سيساعدك على تذكر تناولها دائمًا. ويجب تناول أقراص إكسجيد القابلة للذوبان على معدة فارغة وقبل تناول الطعام بحوالي 30 دقيقة على الأقل.

كيف سيُخضع علاجي للمراقبة؟

أثناء تناول إكسجيد/جادنيو د® (ديفراسيروكس)، ستخضع لاختبارات معملية منتظمة. سترافق هذه الاختبارات كيفية استجابتكم للعلاج. قد يُعد طبيبك جرعة إكسجيد الخاصة بك لأكثر أو أقل بناءً على هذه الاختبارات.

الاختبار	قبل بدء تناول إكسجيد/جادنيو	كل شهر	مرة واحدة في السنة
الحديد* فيروبيتين المصل (مخزن الحديد)	✓	✓	
الكلرياتينين المصل	✓ بالنسبة للشهر الأول وفي الشهر الأول بعد أي تغييرات في الجرعة، ستخضع لاختبار مرة واحدة أسبوعياً؛ ثم مرة واحدة شهرياً	✓ سيجري اختبار الدم هنا مرتين قبل بدء تناول إكسجيد	
كرياتينين شفاف - نسائي وأو سيستاتين سي في البلازما	✓ بالنسبة للشهر الأول وفي الشهر الأول بعد أي تغييرات في الجرعة، ستخضع لاختبار مرة واحدة أسبوعياً؛ ثم مرة واحدة شهرياً		
الكبد ناتلات الأدين في المصل، البيليروبين، الفوسفاتان الكلوي	✓ بالنسبة للشهر الأول، ستخضع لاختبار كل أسبوعين؛ ثم مرة واحدة في الشهر	✓	
البول بروتين في البول	✓	✓	
السمع والرؤية	✓	✓	
الوزن والطول	✓	✓	
المرضي الأطفال: تفقيه ندھر نمو الجسم (على سبيل المثال، وزنك، ونطورةك الجنسي، ومقدار نموك في السنة)	✓	✓	

* بالنسبة للمرضى الذين لا يعتمدون على نقل الدم، تتبعي مراقبة تركيز الحديد في الكبد (LIC) كل 3 أشهر عندما يكون فيروبيتين المصل ≥ 800 ميكروغرام/لتر

قد يستخدم طبيبك أيضًا

- اختباراً يسمى التصوير بالرنين المغناطيسي، أو ، لفحص مستويات الحديد في قلبك أو كبدك
- إجراء خزعة لكتينيك إذا كان يشتبه في وجود مشكلات في الكلى

هل إكسجيد يتضمن آثاراً جانبية؟

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يتضمن إكسجيد آثاراً جانبية. ومع ذلك، لا يعاني منها جميع المرضى. تعد الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً خفيفة إلى متوسطة وعادةً ما تزول بمجرد أن تعتاد على العلاج. وقد يستغرق ذلك بضعة أيام أو أسبوع.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة الغثيان، والقيء، والإسهال، وألم في البطن، والانتفاخ، والإمساك، وعسر الهضم، والطفح الجلدي، والصداع، والحكة.

ستخضع وظائف الكلى والكبد لديك للاختبار قبل أن تبدأ في تناول إكسجيد/جادنيو وستُفحص بانتظام أثناء العلاج. (انظر الجدول في الصفحة السابقة).

قد تكون بعض الآثار الجانبية خطيرة وتحتاج إلى رعاية طبية فورية.

هذه الآثار الجانبية غير شائعة أو نادرة. توقف عن تناول الدواء وأبلغ طبيبك على الفور إذا عانيت من أي مما يلي:

- إذا واجهت صعوبة في التفكير، أو تذكر المعلومات، أو حل المشكلات، أو قلة الانتباه، أو الوعي أو الشعور بالعناس الشديد مع انخفاض الطاقة (علامات متحتملة على ارتفاع مستوى الأمونيا في دمك، والتي قد تكون مرتبطة بمشكلات في الكبد أو الكلى وتؤدي إلى تغيير في وظائف المخ) ألم متكرر في البطن، خاصةً بعد تناول الطعام أو تناول إكسجيد؛
- ألم شديد في الجزء العلوي من المعدة حرقة متكررة في المعدة؛
- فقدان جزئي للرؤية
- طفح جلدي شديد أو صعوبة في التنفس ودوخة، أو تورم الوجه والحلق بشكل أساسي (علامات على رد فعل تحسسي شديد)؛
- طفح جلدي، أحمرار الجلد، تقرح في الشفتين، أو العينين أو الفم، تقرح الجلد، حمى شديدة، أعراض شبيهة بالإلإنفلونزا، تضخم العقد الليمفاوية، (علامات على ردود الفعل الجلدية الشديدة)؛
- انخفاض ملحوظ في كمية البول التي يتوجها جسمك (علامة على وجود مشكلة في الكلى)؛
- تقيؤ دم و/أو إخراج براز أسود مزيج من النعاس، أو ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أو اصفرار أو زيادة اصفرار الجلد أو العينين والبول الداكن علامات على وجود مشكلات في الكبد

تذكر: أخيراً مقدم الرعاية الصحية المتابع لك دائمًا بأي آثار جانبية تتعانى منها. إذا عانيت من أي آثار جانبية خطيرة، فتوقف عن تناول دوائكم واتصل بطبيبك على الفور.

لمزيد من التفاصيل حول الآثار الجانبية والآثار الجانبية الخطيرة، يرجى الاطلاع على نشرة المريض.

إذا كنتِ تستخدمين حالياً وسيلة منع حمل تؤخذ عن طريق الفم أو تستخدمين وسيلة منع حمل لاصقة لمنع الحمل، ينبغي عليك استخدام نوع إضافي أو مختلف من وسائل منع الحمل (على سبيل المثال، الواقي الذكري)، نظراً لأن إكسجيد قد يقلل من فعالية وسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم واللاصقة.

تقديمي مع إكسجيد/جادنيو

هدف علاجي

يتمثل الهدف من علاج إكسجيد في الحصول على كمية صحية من الحديد في جسمك. ستزور طبيبك كل شهر لتبصر تقدمك نحو هدف علاجك.

سيحدد طبيبك أهداف علاجك بناء على اختبار دم بين مي فيريتين المصل(T) أو اختبار(SEER-um) (FAIR-it-in) يوضح هذا الاختبار طبيبك كمية الحديد الموجودة في جسمك. وسيرغّب طبيبك إما في خفض مستوى SF لديك أو الاحتفاظ به في مكانه.

جريعي

قد يقرر طبيبك تغيير جرعتك بناء على مستوى SF لديك، أو الاختبارات المعملية الأخرى، أو عدد المرات التي تخضع فيها إلى نقل الدم.

بعد تناول إكسجيد لمدة **3 إلى 6** أشهر، تحقق مع طبيبك من أنك تحرز تقدماً كما هو مخطط. وإذا لم تكن كذلك، فاسأل طبيبك عن خطته/خطتها لمساعدتك على تحقيق هدف علاجك.

بين كل زيارة

قد تقع أحداث مهمة أخرى بين زيارات الطبيب. وينبغي عليك الاحتفاظ بسجل لها ومشاركتها مع طبيبك. وهي تشمل:

- الآثار الجانبية
- الأدوية الأخرى
- أي انحراف عن الجرعة الموصوفة

ماذا عن الأدوية الأخرى التي أحتاج أيضاً إلى تناولها من أجل صحتي؟

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، أو إذا كنت قد تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى. ويشمل ذلك الأدوية التي تتناولها دون وصفة طبية. قد يحتاج طبيبك إلى إجراء اختبارات معملية لمراقبة هذه الأدوية.

تشمل الأدوية المهمة التي يجب إخبار طبيبك عنها، على وجه الخصوص:

- مستخلبات الحديد الأخرى، التي يجب عدم تناولها مع إكسجيد
- مضادات الحموضة (الأدوية المستخدمة لعلاج حرقة المعدة) التي تحتوي على الألومنيوم، والتي ينبغي عدم تناولها في نفس وقت تناول إكسجيد
- سيكلوسيورين (يُستخدم لمنع الجسم من رفض عضو مزروع أو لحالات أخرى، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الجلد التأتبي)
- سيفماستاتين (يُستخدم لخفض الكوليستيرون)
- بعض مسكنات الألم أو الأدوية المضادة للالتهابات (مثل الأسبرين، والإيبوبروفين، والكورتيكosteroidات)
- الأدوية المضادة للتخثر (تستخدم لمنع تخثر الدم أو علاجه)
- عوامل منع الحمل الهرمونية (أدوية لتحديد النسل)
- بيبيريديل (يُستخدم كعلاج لمشكلات القلب وحالات الصداع النصفي)
- إرجوفوتامين (يُستخدم كعلاج للصداع النصفي)
- ريباجللينيد (يُستخدم لعلاج داء السكري)
- ريفامبيسين (المستخدم لعلاج السل)
- فينيوباربيتال، مكاربامازيبين (يُستخدم لعلاج الصرع)
- ريتونافير (يُستخدم في علاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية)
- باكليناكسيل (يُستخدم في علاج السرطان)
- ثيو فيلين (يُستخدم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو)
- كلوزابين (يُستخدم لعلاج الانضطرابات النفسية مثل الفصام)
- تيزانيدين (يُستخدم كبساط للعضلات)
- كوليسترامين (يُستخدم لخفض مستويات الكوليستيرون في الدم)
- ميدازولام (يُستخدم كهدنأً ولعلاج الفرق وفقدان الذاكرة)
- بوسولفان (يُستخدم كعلاج قبل الزرع لتممير نخاع العظم الأصلي قبل الزرع).

بدء تناول إكسجيد/جادنيو

يمكنك البدء في تتبع تقدمك بمجرد أن يقرر طبيبك مستوى SF المستهدف لديك وجرعة إكسجيد/جادنيو. اعمل مع طبيبك لملء أهداف علاجك ومعلومات أخرى، أدناه.

تعد معلوماتك الأساسية مفيدة لك ولطبيبك عند التخطيط لعلاجك باستخدام إكسجيد/جادنيو ® (ديفيرا西روكسن).

اسأل طبيبك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الإجابة عن هذه الأسئلة.

التاريخ: _____ مستوى SF الحالي الخاص بي: _____

نظام جرعات إكسجيد/جادنيو الخاص
بي أنا أتناول

يتمثل هدف علاجي في:
تقليل مستوى SF إلى

أقراص إكسجيد المغلفة - جادنيو

وزني:

أقراص إكسجيد القابلة للتقطير

معلومات عامة

الاسم الأول

تاريخ الميلاد

التشخيص

• كم عدد الأقراص/الأكياس التي سأتناولها كل يوم؟

هل خضعت لعمليات نقل دم؟ إذا كان الأمر كذلك، فكم مرة وما معدل تكرارها؟

إذا كانت أقراص جادنيو المغلفة:

يمكّنني ابتلاع أقراصي كاملة

سأسحق أقراصي وأرشها على أطعمة لينة مثل الزبادي أو
صلصة التفاح (التفاح المهروس) وأتناولها على الفور

• متى سأتناول دوائي كل يوم؟

ملاحظات: دون أي ملاحظات أو أسئلة من زيارتك.

هل تعاني من أي مشكلات صحية أخرى؟

هل تتناول أي دواء الآن لعلاج مشكلات صحية أخرى؟

هل تعاني من أي حساسية؟

للحصول على نسخ إضافية، يرجى الاتصال بشركة نوفارتس وفقاً لتفاصيل الاتصال أدناه



نشرة دوائية للمرضى - إكسجيد



نشرة دوائية للمرضى - جادنيو

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى أو لطلب نسخ إضافية من خلال:
شركة نوفارتس - السعودية - قسم سلامة المرضى:

الرقم المجاني: 8001240078

الهاتف: ٠٠٩٦٦١٢٦٥٨١٠٠

الفاكس: ٠٠٩٦٦١٢٦٥٨١٠٧

الإيميل: adverse.events@novartis.com
أو عن طريق الإنترنت: <https://www.report.novartis.com/ar>

الهيئة العامة للغذاء والدواء، المركز الوطني للتيقظ الدوائي:

مركز الاتصال الموحد: 19999

الإيميل: npc.drug@sfda.gov.sa

أو عن طريق الإنترنت: <https://ade.sfda.gov.sa>



 NOVARTIS