

Safety Information on the risks of APIXABAN

Patient Alert Card

Atiquix

Apixaban 2.5 mg and Apixaban 5 mg

- Carry this card with you at all times
- This document is approved by The Executive Directorate of Pharmacovigilance, at SFDA
- Keep it in a safe place and show it to any doctor or healthcare professional who is treating you (e.g. in case of an emergency).
- You should also read the patient information leaflet for further information.

WHAT SHOULD I KNOW ABOUT APIXABAN?

- Apixaban thins the blood, preventing potentially harmful blood clots. However, this may increase your risk of bleeding.
- Apixaban must be taken precisely as directed by your physician. **Never skip a dose** to guarantee the best possible protection against blood clots.
- Your risk of blood clots may increase if you stop taking Apixaban without first consulting your doctor.
- If the bleeding does not stop on its own, seek medical attention immediately.
- Before beginning Apixaban, let your doctor know about any other medications you currently take, have recently taken, or plan to start taking
- Before any invasive treatment or surgery, let your doctor know that you are taking Apixaban.

HOW DO I TAKE APIXABAN?

- Apixaban should be swallowed orally with water, with or without food.

WHAT SHOULD I SEEK ADVICE FROM MY HEALTH CARE PROVIDER?

When using a blood thinner like apixaban, it's critical to understand the potential adverse effects. Most frequently, bleeding occurs as a side effect. If you know you are at risk of bleeding, talk to your doctor before beginning to use apixaban. Inform your healthcare professional right away if you experience any of the following symptoms or indicators of bleeding:

- pain
- swelling or discomfort
- headache, dizziness or weakness
- unusual bruising, nosebleeds, bleeding of gums, cuts that take a long time to stop bleeding
- menstrual flow or vaginal bleeding that is heavier than normal
- blood in your urine, which may be pink or brown, red or black stools
- coughing up blood, or vomiting blood or material that looks like coffee grounds

Kindly refer to the Patient Information Leaflet (PIL) for additional details.

PLEASE COMPLETE THIS SECTION OR ASK YOUR DOCTOR TO COMPLETE IT.

Patient name:_____

Patient's date of birth:_____

Dosage:_____

Indications:_____

Doctor's name:_____

Doctor phone:_____

To report side effects, please refer to the below information:

The National Pharmacovigilance Centre (NPC-Saudi Food and Drug Authority (SFDA))

- ▶ **SFDA call center:** 19999
- ▶ **E-mail:** npc.drug@sfda.gov.sa
- ▶ **Website:** <http://ade.sfda.gov.sa/>
- ▶ **Please visit the barcode to report**



Pharmacovigilance Department (PPI)

- ▶ **E-mail:** PV@pharma.com.sa
- ▶ **Mobile:** +966 580303838
- ▶ **Website:** <https://pharma.com.sa/>
- ▶ **Please visit the barcode to report**



بطاقة تنبيه المريض

أتيكويكس (أبيكسابان) 2.5 ملغ و 5 ملغ

- يرجى حمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات.
- هذا المستند معتمد من الإدارة التنفيذية للتبليط الدوائى في هيئة الغذاء والدواء
- توفر هذه البطاقة معلومات سلامة مهمة حول مخاطر دواء أبيكسابان.
- يرجى الاحتفاظ بها في مكان آمن وإبrazها لأي طبيب أو مقدم رعاية صحية يقوم بعلاجك، (خاصة في حالات الطوارئ).
- يرجى أيضاً قراءة النشرة الداخلية للمريض لمزيد من المعلومات.

ماذا يجب أن أعرف عن أبيكسابان؟

- يعمل دواء أبيكسابان على تميع الدم ومنع تكون الجلطات الدموية الضارة، إلا أن ذلك قد يزيد من خطر حدوث النزيف.
- يجب تناول الدواء بدقة حسب تعليمات الطبيب **وعدم تفويت أي جرعة.**
- قد يزيد خطر الإصابة بالجلطات إذا تم إيقاف الدواء دون استشارة الطبيب.
- في حال عدم توقف النزيف تلقائيًا، يجب التوجه فورًا لطلب المساعدة الطبية.
- قبل البدء بالعلاج، يجب إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية المستخدمة حاليًا أو حديثًا أو التي سيتم استخدامها لاحقًا.
- قبل أي إجراء جراحي أو تدخلي، يجب إبلاغ الطبيب بأنك تستخدم دواء أبيكسابان.

كيف أتناول أبيكسابان؟

- يؤخذ دواء أبيكسابان عن طريق الفم مع الماء، مع أو بدون طعام.

متى يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية؟

عند استخدام مميعات الدم مثل أبيكسابان، من المهم معرفة الآثار الجانبية المحتملة. يُعد النزيف من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا. إذا كنت تعلم بوجود خطر للإصابة بالنزيف، فيجب استشارة الطبيب قبل البدء باستخدام أبيكسابان. يرجى إبلاغ مقدم الرعاية الصحية فورًا في حال ظهور أي من الأعراض التالية:

- ألم أو تورم أو شعور بعدم الراحة
- صداع، دوخة أو ضعف عام
- كدمات غير طبيعية، نزيف الأنف أو اللثة
- جروح تستغرق وقتًا طويلًا ليتوقف نزيفها
- نزيف حيضي أو مهبلي أشد من المعتاد
- وجود دم في البول وردي أو بني أو براز أحمر أو أسود
- سعال مصحوب بدم أو قيء بلون القهوة أو يحتوي على دم

لمزيد من المعلومات

يرجى الرجوع إلى النشرة الداخلية للمريض (PIL) للحصول على تفاصيل إضافية.

يرجى استكمال البيانات التالية أو طلب من الطبيب تعبئتها:

اسم المريض: _____

تاريخ الميلاد: _____

الجرعة: _____

الاستطبابات: _____

اسم الطبيب: _____

هاتف الطبيب: _____

للإبلاغ عن الآثار الجانبية
المركز الوطني للتيقظ الدوائي – الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)
مركز الاتصال 19999 :



البريد الإلكتروني npc.drug@sfd.gov.sa :
الموقع الإلكتروني <http://ade.sfd.gov.sa> :
الرجاء مسح الباركود للإبلاغ

قسم اليقظة الدوائية – شركة Pharma Pharmaceutical Industries
(PPI)



البريد الإلكتروني PV@pharma.com.sa :
الجوال +966 580303838 :
الموقع الإلكتروني <https://pharma.com.sa> :
الرجاء مسح الباركود للإبلاغ