

## تيريفلونومايد بي او اس بطاقة المريض

توفر بطاقة المريض هذه معلومات مهمة حول أخطار مادة تيريفلونومايد.  
يرجى إبراز هذه البطاقة لأي طبيب أو أخصائي رعاية صحية مشارك في رعايتك الطبية (على سبيل المثال في حالة الطوارئ). يجب عليك  
أيضاً قراءة نشرة معلومات المريض لمزيد من المعلومات.

يرجى ملء القسم أدناه أو اطلب من طبيبك القيام بذلك

---

تاريخ الميلاد

اسم المريض

---

الجرعة

التشخيص

---

هاتف الطبيب

اسم الطبيب

## أعراض جانبية مهمة

عليك الاتصال بطبيبك على الفور لإجراء اختبار الحمل، إذا أكد الاختبار أنك حامل، فقد يقترح طبيبك العلاج بأدوية معينة لتسريع إزالة مادة تيريفلوفونومايد من جسمك، لأن هذا قد يقلل من المخاطر على طفلك.

• يجب على الآباء أو القائمين على رعايتهم الاتصال بطبيبك أبنتهم عندما تأتي الدورة الشهرية الأولى حتى يتم نصحها بشأن أخطار العيوب الخلقية أثناء الحمل وتقديم المشورة بشأن وسائل منع الحمل المناسبة.

يقلل تيريفلوفونومايد من نشاط الجهاز المناعي، في بعض الأشخاص، يمكن أن يسبب تيريفلوفونومايد تلف الكبد (التهاب الكبد) وقد يقلل أيضًا من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدو (العدلات) والصفائح الدموية التي تشارك في تخثر الدم.

يجب فحص وظائف الكبد وضغط الدم باعتظام أثناء العلاج بتيريفلوفونومايد، ويجب اجراء فحص لصورة الدم إذا لزم الأمر، يجب أيضًا اجراء هذه الاختبارات قبل بدء العلاج.

## إذا كان لديك أي من الآثار الجانبية التالية، يرجى الاتصال بطبيبك على الفور:

- اصفرار الجلد أو اصفرار بياض العين (اليرقان)، غثيان أو قيء غير مبرر، ألم في البطن، أو بوالأخمق من المعتاد. هذه هي أعراض مشاكل الكبد.
- علامات العدوى بما في ذلك، ألم عند التبول، والتتشوش، وارتفاع درجة الحرارة (الحمى)، والسعال، وتضخم الغدد.

## للنساء في سن الإنجاب بما في ذلك الفتيات وآباءهن / مقدمو الرعاية

• لا ينبغي استخدام تيريفلوفونومايد أثناء الحمل أو في النساء في سن الإنجاب إذا لم تكن تستخدم وسائل منع حمل فعالة لأنها يمكن أن تسبب تشوهات خلقيّة خطيرة.

• لا تأخذي دواء تيريفلوفونومايد عندما تكونين حاملاً أو تعتقد أنك حامل. قد يتطلب منك طبيبك إجراء اختبار الحمل للتأكد.

• يجب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء وبعد العلاج بتيريفلوفونومايد حتى تنخفض مستويات الدواء في الدم. سيقدم طبيبك المشورة بشأن المخاطر المحتملة على الجنين وال الحاجة إلى وسائل منع الحمل الفعالة.

• أخبري طبيبك إذا كنت ترغبين في تغيير طريقة منع الحمل أو التخطيط للعمل بعد التوقف عن العلاج بتيريفلوفونومايد. يجب عليك أيضًا مناقشة الأمر مع طبيبك إذا كنت تخططين للرضاعة الطبيعية أو إذا كنت ترضعين طفلتك.

• إذا كنت تشکین في أنك حامل أثناء تناول تيريفلوفونومايد أو في غضون عامين بعد توقفك عن العلاج، يجب

يمكنك الإبلاغ عن أي آثار جانبية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال :

### المجلس الوطني للتبيظ الدوائي (NPC)

مركز اتصال الهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa/>

أو من خلال قسم التبيظ الدوائي لدى شركة بوست أنکولوجی العربية المحدودة عبر

### بوست انکولوجی العربية المحدودة

طريق المطار، 13413، الرياض، المملكة العربية السعودية

الهاتف: +966 547 643 672

البريد الإلكتروني: [pv@bostononcology.com](mailto:pv@bostononcology.com)

إن الإبلاغ عن الآثار الجانبية يساعد في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

للحصول على معلومات كاملة عن جميع الآثار الجانبية المحتملة، يرجى الاطلاع على نشرة معلومات المريض الخاصة بدواء تيريفلوفونومايد.