

**Zynlonta**<sup>®</sup>   
loncastuximab tesirine  
for injection, for intravenous use • 10mg

## دواء زينلونتتا

لونكاستوكسيماب تيسيرين

مستحضر دوائي يُعطى عن طريق الحقن وعبر الوريد - تركيز 10 ملجم

معلومات هامة لسلامة المرضى  
الذين يتناولون دواء زينلونتتا

أنشطة خفض المخاطر هذه معتمدة من  
قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

بطاقة تنبيه  
للمريض

## معلومات للمتخصصين بتقديم الرعاية الصحية

يرجى الانتباه إلى أن المريض يتلقى علاجاً دوائياً باستخدام دواء زينلونتيا [الونكاستوكسيماب تيسيرين] لعلاج سرطان الخلايا اللمفية البائية الكبيرة المنتشرة المنتكسة/المقاومة للعلاج أو سرطان الخلايا اللمفية البائية شديد الفاعلية.

• يمكن لدواء زينلونتيا أن يتسبب بحدوث أعراض تحسسية تجاه الضوء، بما في ذلك أعراض شبيهة بحرق الشمس مثل تقشير وتهيج الجلد بعد التعرض للضوء، وطفح جلدي مثير للحكة، وتقرحات في الجلد، وتهيج لبقع جلدية داكنة، وتورم، وآلم.

• يجب التوقف عن تناول دواء زينلونتيا في حال ظهور أعراض جلدية تحسسية شديدة (من المستوى الثالث) حتى توقف هذه الأعراض التحسسية.

• لا تتردد باستشارة طبيب جلدية عند اللزوم.

• تواصل مع الطبيب الذي وصف الدواء (المذكور في الأسفل) بأسرع ما يمكن.

• الإبلاغ عن أي أعراض أو تأثيرات جانبية أو عكسية بواسطة: 

• المركز الوطني للتبليغ والسلامة الدوائية :

الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية : ١٩٩٩٩

البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfd.gov.sa](mailto:npc.drug@sfd.gov.sa)

الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfd.gov.sa/>

• شركة: Swedish Orphan Biovitrum AB - publ

البريد الإلكتروني: [pv-ksa@sobi.com](mailto:pv-ksa@sobi.com)

للحصول على مزيد من المعلومات عن دواء زينلونتيا، يرجى الاطلاع على ملخص خصائص المنتج لهذا المستحضر أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

[pv-ksa@sobi.com](mailto:pv-ksa@sobi.com)

إن بطاقة تنبيه المريض هذه تحتوي على معلومات سلامة هامة ويجب أن يفهمها المريض أثناء تلقيه العلاج باستخدام دواء زينلونتيا.

نرجو منك الاحتفاظ دائماً بهذه البطاقة معك وإبراز هذه البطاقة لأي طبيب يشارك في تقديم الرعاية الطبية لك.

• يمكن أن يتسبب العلاج بزينلونتيا بحدوث أعراض تحسسية ناتجة عن الضوء من خلال التعرض لأشعة الشمس المباشرة وغير المباشرة (مثل النوافذ الزجاجية في المركبات ووسائل النقل العام) بما في ذلك:

- إستجابة شبيهة بحرق الشمس مثل تقشير الجلد
- وتهيج بعد التعرض للضوء
- طفح جلدي مثير للحكة
- تقرحات في الجلد
- بقع جلدية داكنة
- تهيج، تورم، ألم

• يجب عليك حماية الجلد من التعرض لأشعة الشمس وذلك من خلال ارتداء الملابس الواقية من الشمس و/أو استخدام منتجات الوقاية من الشمس خلال فترة العلاج بأكملها.

• في حالة ظهور أي أعراض جلدية من هذه الأعراض فيجب عليك الاتصال بالطبيب المعالج على الفور أو طلب الرعاية الطبية الطارئة.

## معلومات التواصل

إسم المريض:

---

---

المشفى الذي تم فيه العلاج:

---

---

إسم الطبيب:

---

---

رقم هاتف الطبيب:

---

---

**Zynlonta**<sup>®</sup>  
loncastuximab tesirine  
for injection, for intravenous use • 10mg

