

## بطاقة المريض

احتفظ بهذه البطاقة معك (أو مع مقدم الرعاية) في جميع الأوقات

### معلومات السلامة حول رينفوك (يوباداسيتينيب) للمرضى

- تحتوي هذه البطاقة على معلومات مهمة يجب أن تكون على دراية بها – قبل وأثناء العلاج برينفوك
- اقرأ نشرة المعلومات الخاصة بالمريض لمزيد من المعلومات

إصدار ٦،٠ يناير ٢٠٢٦

اسمك:

اسم الطبيب – الذي وصف لك رينفوك:

رقم الهاتف الخاص بالطبيب:

التاريخ الذي بدأت خلاله تناول رينفوك

أظهر هذه البطاقة لأي من أخصائيي الرعاية الصحية المشاركين في رعايتك الطبية – على سبيل المثال، طبيب الأسنان أو طبيب الطوارئ

للإبلاغ عن أي أعراض جانبية:

يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني:

PV.MEA@abbvie.com

أو عبر الخط الساخن: +966558282010

للاتصال بالمركز الوطني للتيقظ الدوائي، الهيئة العامة للغذاء والدواء

مركز الاتصال الموحد لهيئة الغذاء والدواء السعودية: 19999

الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa/>

البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfda.gov.sa](mailto:npc.drug@sfda.gov.sa)



## خطر الإصابة بالسرطان

من المحتمل أن يزيد رينفوك من خطر إصابتك بالسرطان وخاصةً سرطان الجلد

أبلغ طبيبك في حال لاحظت أي تغيير في مظهر منطقة ما على جلدك، أو لاحظت أي نمو جديد على بشرتك

## خطر الإصابة بثقب في أمعائك

قد يزيد رينفوك من خطر حدوث ثقب في أمعائك خاصةً إذا كنت مصاباً بمرض كرون. أخبر طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من آلام غير مبررة أو غير متوقعة في المعدة

## وسائل منع الحمل، والحمل والرضاعة الطبيعية

- ينبغي عليك عدم تناول رينفوك في أثناء الحمل
- ينبغي عليك استخدام وسائل منع حمل فعالة في أثناء تناول رينفوك – ولمدة ٤ أسابيع بعد تناول جرعتك الأخيرة. تحدثي إلى طبيبك حول وسائل منع الحمل الفعالة
- أخبري طبيبك على الفور إذا كنت تفكرين في الحمل أو إذا أصبحت حاملاً.
- في حال بدء الدورة الشهرية لدى طفلك أثناء العلاج، يرجى إبلاغ الطبيب فوراً لمتابعة الحالة بشكل مناسب.
- لا ترضعي طبيعياً أثناء استخدام رينفوك

## خطر الإصابة بجلطات دموية في الأوردة أو الرئتين

تمت ملاحظة جلطات دموية في الأوردة أو الرئتين عند تناول رينفوك. أبلغ طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك علامات جلطات دموية في الأوردة أو الرئتين، مثل تورم مؤلم في الساقين، أو ضيق في التنفس أو ألم في الصدر

## خطر الإصابة بمرض القلب

قد يزيد رينفوك من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أبلغ طبيبك على الفور إذا لاحظت أعراضاً مثل ألم أو ضيق في الصدر نظراً لأن هذا قد يكون أحد أعراض مرض القلب

## اللقاحات المستخدمة للمساعدة في منع العدوى

يجب عدم إعطاء اللقاحات الحية (علمه سبيل المثال، لقاح الإنفلونزا من خلال بخاخ الأنف، ولقاح جدري الماء، والحصبة/التهاب الغدة النكافية/الحصبة الألمانية) في أثناء العلاج برينفوك، أو قبل بدء العلاج برينفوك مباشرة

قبل تلقي أي لقاحات، تحدثي إلى طبيبك – إذ سيكون علمه علم باللقاحات التي يجب ألا تتلقاها قبل أو في أثناء العلاج برينفوك

## خطر الإصابة بالعدوى

قد يؤدي رينفوك إلى تفاقم العدوى الموجودة لديك أو يزيد من فرصة إصابتك بعدوى جديدة – علمه سبيل المثال السل، أو الهربس المنطقي أو التهاب الكبد الفيروسي.

أخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت ظهور علامات العدوى عليك، مثل:

- الحمى، أو التعرق، أو القشعريرة، أو فقدان الوزن أو السعال الذي لا ينتهي – قد تكون تلك علامات علمه مرض السل.
- طفح جلدي مؤلم مع ظهور بثور – قد يكون هذا علامة علمه الهربس المنطقي (الحزام الناري).
- الشعور بالتعب أو ضيق التنفس – قد يكون هذا علامة علمه التهاب رئوي (عدوى في الرئة).

أخبر طبيبك إذا:

- تم تشخيصك مؤخراً بمرض السل أو و سبق أن أصبت به.
- كنت مؤخراً مخالطاً بشكل وثيق لشخص مصاب بالسل

## **Risk of cancers**

RINVOQ® may potentially increase your risk of developing cancers particularly skin cancer.

Let your doctor know if you notice any change in the appearance of an area on your skin, or notice any new growth on your skin.

## **Risk of a hole in your bowel**

RINVOQ® may increase your risk of a hole in your bowel especially if you have Crohn's disease. Tell your doctor straight away if you have unexplained or unexpected stomach pain.

Show this card to any healthcare professional involved in your medical care – for example, your dentist or an emergency doctor.

To report any side effects:  
Contact: PV.MEA@abbvie.com or Hotline: +966558282010

National Pharmacovigilance Center (NPC)  
Saudi Food and Drug Authority (SFDA)  
SFDA Unified Call Center: 19999  
E-mail: npc.drug@sfd.gov.sa  
Website: <https://ade.sfda.gov.sa/>



Your name:

Consultant's name – who prescribed RINVOQ®:

Consultant's phone number:

The date you started RINVOQ®:

## **Patient Card**

**Keep this card with you (or caregiver) all the time**

### **Safety Information about RINVOQ® (Upadacitinib) for patients**

- This card contains important safety information you should be aware of – before and during treatment with RINVOQ®.
- Read the patient information leaflet for more information.

## **Risk of infections**

---

RINVOQ® may make an existing infection worse or increase the chance of you getting a new infection - for example tuberculosis (TB), shingles or viral hepatitis.

**Tell your doctor straight away if you notice signs of infection, such as:**

- Fever, sweating, chills, weight loss, or a cough that won't go away these - may be signs of tuberculosis.
- Painful skin rash with blisters - this may be a sign of shingles.
- Feeling tired or short of breath - this may be a sign of Pneumonia (lung infection).

**Tell your doctor if:**

- You have been recently diagnosed with TB or you have ever had TB.
- You have recently been in close contact with someone who has TB.

## **Vaccines – used to help prevent infections**

---

Live vaccines (for example influenza vaccine by nasal spray, varicella, measles/mumps/rubella) should not be given during RINVOQ® treatment, or just before starting RINVOQ® treatment.

Before being given any vaccines, talk to your doctor – they will know which vaccines you should not be given before or during treatment with RINVOQ®.

## **Risk of heart disease**

---

RINVOQ® may potentially increase your risk of heart disease.

Tell your doctor straight away if you notice symptoms such as chest pain or tightness since this may be a symptom of heart disease.

## **Contraception, pregnancy, and breast-feeding**

---

RINVOQ® must not be taken during pregnancy.

- Use effective contraception while taking RINVOQ® – and for 4 weeks after your last dose. Talk to your doctor about effective contraception.
- Tell your doctor straight away if you wish to become pregnant, or if you become pregnant.
- Tell your doctor straight away if your child has her first period (menstrual bleeding) while taking RINVOQ®.
- Do not breast-feed while using RINVOQ®.

## **Risk of blood clots in veins or lungs**

---

Blood clots in veins or lungs have been observed with RINVOQ®. Tell your doctor straight away if you get signs of blood clots in veins or lungs, such as a painful swollen leg, shortness of breath, or chest pain.