


i-SECURE

إمنوفيد® (بوماليدومايد)

تعليمات التعامل مع منتج
الأدوية المعدلة للمناعة

أمور يجب مراعاتها عند التعامل مع المنتج الطبي: لأخصائيي الرعاية الصحية والمرضى وأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية:

- إذا كنت امرأة حامل أو تشكين في أنك قد تكونين حامل فلا يجب أن تتعاملي مع الشرائط أو الكبسولات
- قم بارتداء القفازات المخصصة للاستعمال لمرة واحدة عند التعامل مع المنتج و/أو العبوة (أي الشريط أو الكبسولة)
- قد تتعرض الكبسولات أحيانًا للتلف عند الضغط عليها لإخراجها من الشريط، خاصةً عند تطبيق الضغط في منتصف الكبسولة. لذلك، يجب وضع الضغط في نقطة واحدة فقط، مما يقلل من خطر تشوه الكبسولة أو كسرها (انظر الشكل أدناه).
- ينبغي على العاملين في الرعاية الصحية وأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية ارتداء قفازات طبية مخصصة للاستعمال لمرة واحدة عند التعامل مع الشريط أو الكبسولة.
- استخدم التقنية المناسبة عند خلع القفازات لمنع التعرض المحتمل للجلد (انظر الشكل أدناه)
- ضع القفازات في كيس بلاستيكي قابل للغلق من البولي إيثيلين و اغسل يديك وتخلص منه وفقًا للمتطلبات المحلية
- اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد خلع القفازات
- يجب نصح المرضى بعدم إعطاء الدواء لأي شخص آخر



إذا بدت عبوة منتج دوائي تالفة بشكل واضح؛ فاستخدم الإجراءات الوقائية الإضافية التالية لمنع التعرض:

- في حالة تلف الكرتون الخارجية بشكل واضح - لا تفتحها
 - في حالة تلف الشرائط الفقاعية أو تسريبها أو في حال بدت الكبسولات تالفة أو متعرضة للتسريب -
- أغلق الكرتون الخارجية على الفور**
- ضع المنتج داخل كيس بلاستيكي قابل للغلق من البولي إيثيلين
 - تخلص من أي دواء غير مستخدم وفقًا للأنظمة المحلية


في حالة خروج المنتج أو انسكابه، اتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة لتقليل التعرض باستخدام الحماية الشخصية الملائمة

- إذا تم سحق الكبسولات أو كسرها فقد يتم إطلاق غبار يحتوي على مادة دوائية. تجنب نثر المسحوق وتجنب تنفسه أو استنشاقه
- قم بارتداء قفازات الاستعمال لمرة واحدة لتنظيف المسحوق
- ضع قطعة قماش مبللة أو منشفة على منطقة المسحوق لتقليل انتشار المسحوق في الهواء. أضف كمية زائدة من السائل من أجل السماح للمادة بالتحول إلى مطول. بعد التعامل مع الحالة قم بتنظيف المنطقة جيدًا بالماء والصابون ثم جففها
- ضع جميع المواد الملوثة، بما في ذلك قطعة القماش المبللة أو المنشفة والقفازات، في كيس بلاستيكي قابل للغلق من البولي إيثيلين. تخلص من الكيس وفقًا للمتطلبات المحلية للمنتجات الطبية
- اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد خلع القفازات
- يرجى الإبلاغ عن التصريف / الانسكاب وفقًا للأنظمة المحلية أو إلى أخصائي الرعاية الصحية على الفور

إذا لامست محتويات الكبسولة الجلد أو الأغشية المخاطية

- إذا لامست مسحوق الدواء؛ يرجى غسل المنطقة المعرضة جيدًا بالماء الجاري والصابون
- إذا لامس مسحوق الدواء إحدى عينيك أو كليهما، فقم بإزالة العدسات اللاصقة والتخلص منها في حال ارتدائها، ومن ثم اغسل عينيك جيدًا بالماء لمدة 10 دقيقة على الأقل. في حالة حدوث تهيج، يرجى الاتصال بطبيب العيون.

التقنية المناسبة لخلع القفازات



- أمسك الحافة الخارجية بالقرب من المعصم (١)
- انزع القفاز بعيداً عن اليد ولف القفاز من الداخل للخارج (٢)
- أمسكه باليد الأخرى التي ترتدي فيها قفاز (٣)
- حرك الأصابع غير المرتدية للقفاز أسفل معصم اليد المرتدية للقفاز مع الحرص على عدم لمس الجزء الخارجي من القفاز (٤)
- انزعه من الداخل صانعاً كيساً لكلا القفازين
- تخلص منه في الحاوية الملائمة
- اغسل يديك بالماء والصابون جيداً