

إيمبافيلي™ (بيجسيتاكوبلان) بطاقة المريض

- معلومات مهمة للمرضى الذين يتناولون دواء بيجسيتاكوبلان
- احتفظ بهذه البطاقة معك دائماً
- أظهرها لأي مقدم رعاية صحية يشارك في رعايتك الصحية وإذا ذهبت إلى المستشفى
- أظهر هذه البطاقة لأي مقدم رعاية صحية يشارك في رعايتك.
- تمت الموافقة على أنشطة خفض المخاطر من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

معلومات للطبيب المعالج

تم وصف إيمافيلي (بيجسيتاكوبلان)، وهو مثبط للنظام التكميلي يُستخدم لعلاج المرضى البالغين المصابين بمرض يسمى البيلة الهيموغلوبينية الانتيايية الليلية (PNH)، ولعلاج المرضى البالغين والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا المصابين بمرض يسمى اعتلال كبيبات الكلى (C3G) أو التهاب كبيبات الكلى الغشائي المعقد المناعي الأولي (IC-MPGN). قد يزيد إيمافيلي من خطر إصابة المريض بعدوى بكتيرية خطيرة مثل المكورات الرئوية، والنيسرية السحائية، والمستدمية النزلية من النوع ب.

- قد تصبح العدوى البكتيرية خطيرة على الحياة إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها مبكرًا.
- راقب المرضى عن كثب لرصد أي علامات أو أعراض مبكرة للعدوى الخطيرة، وقم بتقييم حالتهم فورًا إذا كان هناك اشتباه في العدوى. عالج العدوى التي تم تشخيصها على الفور.
- اتصل بالطبيب المعالج للمريض في أقرب وقت ممكن إذا كان هناك اشتباه في أي عدوى خطيرة.

لمزيد من المعلومات حول إيمافيلي، يرجى الرجوع إلى النشرة الدوائية للمستحضر.

معلومات للمرضى

قد يزيد دواء إيمافيلي من خطر إصابتك بعدوى خطيرة ومهددة للحياة. قد تتطور العدوى الخطيرة بسرعة إلى حالة مهددة للحياة وتؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها مبكرًا. اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو احصل على الرعاية الطارئة على الفور إذا ظهرت عليك أي من العلامات والأعراض التالية التي تدل على الإصابة بعدوى خطيرة:

- صداع وحمى
- حمى وطفح جلدي
- حمى مصحوبة بقشعريرة أو رعشة أو بدونها
- ضيق التنفس
- ارتفاع معدل ضربات القلب
- طفوية الجلد
- صداع مع تيبس الرقبة أو تيبس الظهر
- صداع مع غثيان (الشعور بالإعياء) أو قيء
- حساسية العين للضوء
- آلام في العضلات مصحوبة بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا
- الارتباك
- ألم أو انزعاج شديد

يرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة معك دائمًا أثناء العلاج ولمدة شهرين بعد آخر جرعة. قد يستمر خطر إصابتك بعدوى خطيرة لعدة أسابيع بعد آخر جرعة.

أظهر هذه البطاقة لأي مقدم رعاية صحية مشارك في رعايتك.

اسم المريض

الرقم المرجعي للتوزيع الخاضع للرقابة

اسم الطبيب المعالج

هاتف الطبيب المعالج

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو مخاوف تتعلق بالسلامة، اتصل بـ:



- المركز الوطني للتبقيظ
- مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999
- البريد الإلكتروني: npc.drug@sfga.gov.sa
- الموقع الإلكتروني: http://ade.sfga.gov.sa
- سويش أورفان بيوتيرم اي بي (بويل):
- البريد الإلكتروني: pv-ksa@sobi.com

يجب على المرضى الذين يتلقون إيمافيلي حمل هذه البطاقة دائماً. يجب على المرضى إظهار الرقم المرجعي للتوزيع الخاضع للرقابة للصيدي قبل صرف دواء إيمافيلي.

سوبي (Sobi) و إيمافيلي (EMPAVELI®) هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة سويش أورفان بيوتيرم اي بي (بويل).
© 2025 شركة سويش أورفان بيوتيرم اي بي (بويل) - جميع الحقوق محفوظة. www.sobi.com
NP-48654 مارس 2026