


# Figoya (fingolimod)

## Pregnancy-Specific Patient Reminder Card

فيجويا (فينجوليمود)

البطاقة التذكيرية الخاصة بالحمل



## Before Starting Figoya (Fingolimod) Treatment

- Figoya (Fingolimod) is contraindicated in pregnant women and women of childbearing potential (including adolescents) not using effective contraception.
- Your doctor will explain the teratogenic risk (risk of causing birth defects) and measures to minimize this risk before and during treatment.
- A pregnancy test must be conducted and verified as negative by a doctor before starting treatment.
- You must use effective contraception while on treatment and for 2 months after stopping Fingolimod. Talk to your doctor about the most effective contraception options available to you.
- Please read the Fingolimod Patient Guide leaflet provided by your doctor.

## قبل بدء علاج فيجوييا (فينجوليمود)

- يمنع استخدام فيجوييا (فينجوليمود) للنساء الحوامل أو النساء ذوات القدرة على الإنجاب (بما في ذلك المراهقات) اللواتي لا يستخدمن وسائل منع الحمل الفعالة.
- سيقوم طبيبك بشرح مخاطر حدوث تشوهات للجنين والإجراءات اللازمة لتقليل هذا الخطر قبل وخلال العلاج.
- يجب إجراء اختبار حمل والتحقق من نتيجته السلبية من قبل الطبيب قبل بدء العلاج.
- يجب استخدام وسائل منع حمل فعالة أثناء العلاج ولمدة شهرين بعد إيقاف فينجوليمود. ناقشي مع طبيبك الخيارات الأنسب لك.
- يرجى قراءة كتيب دليل المريض الخاص بـ فينجوليمود المقدم من طبيبك.

## While You Are Taking Figoya (Fingolimod)

- Women must not become pregnant during treatment and for 2 months after discontinuing treatment.
- Patients must use effective contraception while taking Fingolimod.
- Pregnancy tests should be repeated at suitable intervals.
- Your doctor will provide regular counselling on the serious risks to the fetus.
- If you become pregnant or plan to become pregnant, discuss immediately with your doctor - treatment must be discontinued.
- In case of pregnancy, your doctor will provide medical counselling and evaluation of potential outcomes.
- An ultrasonography examination should be performed and treatment will be discontinued.

## أثناء استخدام فيجويآ (فينجوليمود)


- يحظر الحمل أثناء استخدام العقار ولمدة شهرين بعد إيقاف العلاج.
- يجب على المريضات استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء تناول فينجوليمود.
- يجب إعادة اختبارات الحمل على فترات مناسبة.
- سيقوم طبيبك بتقديم إرشادات منتظمة حول المخاطر الجسيمة للجنين.
- إذا أصبحت حاملاً أو تخططين للحمل، ناقشي ذلك مع طبيبك فوراً - يجب التوقف عن العلاج.
- في حالة الحمل، سيقدم الطبيب إرشادات طبية وتقييم النتائج المحتملة.
- يجب إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، وسيتم إيقاف العلاج.

## After Stopping Figoya (Fingolimod) Treatment

- Inform your doctor immediately if your MS worsens (e.g., weakness or visual changes) or if you notice any new symptoms after stopping treatment due to pregnancy.
- Effective contraception is required for 2 months after stopping Fingolimod, due to the time needed for the medicine to be eliminated from the body.

## بعد إيقاف علاج فيجوييا (فينجوليمود)

- أبلغني طبيبك فورًا إذا لاحظت تفاقم مرض التصلب العصبي المتعدد (مثل الضعف أو تغيرات الرؤية) أو أي أعراض جديدة بعد التوقف عن العلاج بسبب الحمل.
- يجب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة لمدة شهرين بعد التوقف عن العلاج بسبب المدة اللازمة لخروج الدواء من الجسم.



## Reporting Adverse Events or Requests for Information

You can report any side effects, complaints, or adverse events, or request additional copies of the educational materials, through:

### Alrazi Pharmaceutical Industries Factory Co. – Saudi Arabia

#### Pharmacovigilance Department:

- Telephone: +966 13 8281919
- Phone: +966 55 483 3113
- Fax: +966 13 8281313
- Email: PV@alrazi-pharma.com
- Or via the website:  
<https://www.alrazi-pharma.com/pharmacovigilance/>

### Saudi Food and Drug Authority (SFDA) National Pharmacovigilance Center (NPC):

- Unified Contact Center: 19999
- Email: npc.drug@sfda.gov.sa
- Or online at: <https://ade.sfda.gov.sa>



## الإبلاغ عن الآثار الجانبية أو الشكاوى

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى، أو طلب نسخ إضافية من المواد التعليمية من خلال:

### شركة مصنع الرازي للصناعات الدوائية – المملكة العربية السعودية

#### قسم التيقظ الدوائي (سلامة الأدوية):

- الهاتف: +٩٦٦ ١٣ ٨٢٨١٩١٩
- الجوال: +٩٦٦ ٥٥ ٤٨٣٣١١٣
- الفاكس: +٩٦٦ ١٣ ٨٢٨١٣١٣
- البريد الإلكتروني: PV@alrazi-pharma.com
- أو عبر الموقع الإلكتروني:  
[/https://www.alrazi-pharma.com/pharmacovigilance](https://www.alrazi-pharma.com/pharmacovigilance/)

### الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)

#### المركز الوطني للتيقظ الدوائي:

- مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩
- البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
- أو عبر الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa>