

ميثوتريكسات بي أو إس أقراص ميثوتريكسات 2.5 ملغ بطاقة المريض

الأخطاء الدوائية

دواء ميثوتريكسات يستخدم لعلاج حالات تتطلب تناولها مرة واحدة في الأسبوع.

بطاقة المريض هذه مُعدّة من أجل المرضى الذين يستخدمون أدوية تحتوي على ميثوتريكسات من أجل علاج: التهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب المفاصل مجهول السبب لدى الأطفال (JIA)، الصدفية وسرطان الدم اللمفاوي بحسب دواعي الاستعمال المذكورة في نشرة العبوة.

في حال كنت تستخدم دواء ميثوتريكسات من أجل أحد دواعي الاستعمال المذكورة فإن عليك تناوله مرة واحدة في الأسبوع.


اليوم من الأسبوع الذي تتناول فيه الدواء

اسم المريض

جرعة المريض

اسم الطبيب

رقم هاتف الطبيب



لا تتناول أكثر من الجرعة الموصوفة.

يمكن أن يسبب فرط الجرعة آثار ضارة ربما تكون مميتة. تشمل أعراض فرط الجرعة: التهاب الحلق، الحمى، تقرحات الفم، الإسهال، القيء، الطفح الجلدي، النزيف أو الضعف غير المعتاد.

استشر طبيبك حالاً في حال تناولت أكثر من الجرعة الموصوفة.

أظهر هذه البطاقة دوماً لأخصائي الرعاية الصحية الذين هم ليس على علم بعلاجك بدواء ميثوتريكسات لتنبههم باستخدامك لهذا الدواء مرة واحدة في الأسبوع (على سبيل المثال: عند الدخول إلى المستشفى، تغيير الرعاية).

يُرجى قراءة نشرة المريض الموجودة ضمن علبة الدواء للحصول على مزيد من المعلومات.

بإمكانك الإبلاغ عن أية آثار جانبية لهيئة الغذاء والدواء السعودية عن طريق

مركز التيقظ الدوائي الوطني (NPC)

رقم هيئة الغذاء والدواء السعودية: 19999 | البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

موقع الشبكة: <https://ade.sfd.gov.sa/>

أو لقسم التيقظ الدوائي لشركة بوستن أونكولوجي العربية المحدودة عن طريق:

شركة بوستن أونكولوجي العربية المحدودة

طريق المطار، 13413 ، الرياض، المملكة العربية السعودية

جوال: +966547643672 | البريد الإلكتروني: pv@bostononcology.com

بإبلاغك عن الآثار الجانبية فأنت تساهم في إعطاء معلومات إضافية حول سلامة هذا الدواء.