



Pharma

زيزلف® (ريفاستيجمين) لصقات جلدية مرتين أسبوعياً

بطاقة تذكير المريض (تعليمات الاستخدام ومفكرة المريض)

يتم توفيرها للمرضى الذين تم وصف زيزلف® (ريفاستيجمين) لصقة جلدية مرتين أسبوعياً لهم (نظام ريفاستيجمين عبر الجلد).
تعد تعليمات الاستخدام وسجلات الأدوية هذه ضرورية لضمان الاستخدام الآمن والفعال لـ "زيزلف" والإدارة المناسبة للمخاطر المصاحبة.

دواعي الاستعمال

يُستخدم ريفاستيجمين مرتين أسبوعياً لعلاج المرضى البالغين المصابين بخرف الزهايمر الخفيف إلى المتوسط الشدة، وهو اضطراب تدريجي في الدماغ يؤثر تدريجياً على الذاكرة والقدرة الفكرية والسلوك.

تعليمات الاستخدام

- تعد تعليمات الاستخدام وسجلات الأدوية هذه ضرورية لضمان الاستخدام الآمن والفعال لـ لصقة ريفاستيجمين الجلدية مرتين أسبوعياً والإدارة المناسبة للمخاطر المصاحبة.
- إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، يرجى قراءة النشرة الداخلية المرفقة مع الدواء.
- إذا لم تكن متأكداً من أي شيء، يرجى سؤال طبيبك أو الصيدلي.

أمور هامة يجب تذكرها

- يتم وضع لصقة ريفاستيجمين الجلدية مرتين أسبوعياً، وتوضع لصقة غطاء لاصقة بيضاوية الشكل فوق لصقة ريفاستيجمين.

- انزع اللصقات السابقة قبل وضع لصقة جلدية واحدة جديدة وغطاء لاصق واحد.

- لا تقطع لصقة ريفاستيجمين الجلدية مرتين إلى أجزاء صغيرة

- اضغط على لصقة ريفاستيجمين الجلدية مرتين أسبوعياً بقوة في مكانها لمدة 15 ثانية على الأقل باستخدام راحة اليد، ثم اضغط على الغطاء اللاصق لأسفل بقوة لمدة 30 ثانية على الأقل.

- استبدل اللصقات الجلدية مرتين في الأسبوع في يومين ثابتين؛ على أقصى تقدير بعد 4 أيام ، يمكنك الاختيار من المواعيد التالية:
الاثنين والجمعة أو
الثلاثاء والسبت أو
الأربعاء والأحد أو
الخميس والاثنين أو
الجمعة والثلاثاء أو
السبت والأربعاء أو
الأحد والخميس

- أعلى جرعة من لصقة ريفاستيجمين الجلدية مرتين أسبوعياً هي 9.5 مجم/24 ساعة. لتحقيق جرعات أعلى، يجب استخدام منتجات لصقات ريفاستيجمين الأخرى

تعليمات الاستخدام:


كيفية وضع لصقة ريفاستيجمين الجلدية مرتين أسبوعياً

استخدم لصقة ريفاستيجمين مرتين أسبوعياً؛ افتح الكيس، أزل الغطاء الواقي ثم ضعها على الجلد..



2.

أخرج لصقة ريفاستيجمين الجلدية مرتين أسبوعياً من المغلف باستخدام المقص.




1.

انزع اللصقة الموجودة بعناية قبل وضع لصقة واحدة جديدة.



4.

ضع الجانب اللاصق من اللصقة على الجزء العلوي أو السفلي من الظهر، أو أعلى الذراع أو الصدر (يجب تجنب منطقة الثدي) ثم انزع الجانب الثاني من الغطاء الواقي.



3.

انزع جانباً واحداً من الغطاء الواقي ولا تلمس الجزء اللاصق من اللصقة بالأصابع.

6.

بعد وضع لصقة ريفاستيجمين الجلدية مرتين أسبوعياً، يجب وضع الغطاء اللاصق. تستكمل التعليمات في الصفحة التالية.



5.

ثم اضغط على اللصقة بقوة في مكانها لمدة 15 ثانية تقريباً باستخدام راحة اليد للتأكد من التصاق الحواف جيداً.

كيفية وضع الغطاء اللاصق البيضاوي/اللاصقة الواقية


يجب بالاستمرار في وضع اللاصقة الواقية البيضاوية.
ويكون **مغلفها أكبر** من مغلف لصقة ريفاستيجمين الجلدية التي تستخدم مرتين أسبوعياً.

7.

أخرج اللاصقة الواقية البيضاوية ذات اللون البيج من المغلف باستخدام المقص.

8.

انزع الجانب الأصغر من الغطاء الواقى ولا تلمس الجزء اللاصق من اللصقة بالأصابع.





9.

قم بتغطية لصقة ريفاستيجمين الجلدية مرتين أسبوعياً بالكامل باللاصقة الواقية البيج عن طريق وضع الجانب اللاصق فوق اللصقة الجلدية الموضوعة مسبقاً، ثم انزع النصف الثاني من الغطاء الواقى.

10.

ثم اضغط على اللاصقة بقوة لمدة 30 ثانية على الأقل باستخدام راحة اليد للتأكد من التصاق الحواف جيداً.




سجلات الأدوية :

كيفية استخدام سجل الأدوية هذا

- استخدم سجل الأدوية هذا لتتبع متى تضع وتنزع لصقة ريفاستيجمين الجلدية مرتين أسبوعياً.
- ضع علامة في المربع عند إزالة اللصقة القديمة.
- املأ التاريخ واليوم الذي تضع فيه اللصقة الجديدة.
- املأ حرف منطقة الوضع التي وضعت فيها اللصقة الجديدة.
- إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، يرجى قراءة نشرة عبوة المعلومات المرفقة مع الدواء.
- إذا لم تكن متأكدًا من أي شيء، يرجى سؤال طبيبك أو الصيدلي.

مكان الوضع / مناطق الوضع



- يجب استبدال اللصقات في نفس الوقت من اليوم. قبل وضع لصقة واحدة جديدة، انزع اللصقة السابقة والغطاء الواقي.
- استبدل اللصقات الجلدية مرتين في الأسبوع (في يومين ثابتين)؛ على أقصى تقدير بعد 4 أيام، وضع لصقة **واحدة** جديدة في **إحدى** المناطق الموضحة في الصورة.
- يمكنك استخدام نفس المنطقة (أ أو ب أو ج أو د أو هـ أو و أو ز أو ح)، ولكن لا تستخدم نفس البقعة بالضبط داخل المنطقة نفسها. يجب تجنب منطقة الثدي.

يجب عليك تغيير اللصقات في يومين ثابتين، يمكنك الاختيار من المواعيد التالية:

- | |
|---------------------|
| الاثنين والجمعة أو |
| الثلاثاء والسبت أو |
| الأربعاء والأحد أو |
| الخميس والاثنين أو |
| الجمعة والثلاثاء أو |
| السبت والأربعاء أو |
| الأحد والخميس |

مفكرة المريض الخاصة بـ "زيفل" مرتين أسبوعياً

نسخة المملكة العربية السعودية 4.0 – بتاريخ 03/2026

تمت الموافقة على هذا المستند من قبل الإدارة التنفيذية لليقظة الدوائية في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

سجلات الأدوية

الأسبوع	هل تمت إزالة اللصقة القديمة؟	تاريخ وضع اللصقة الجديدة	يوم وضع اللصقة الجديدة	منطقة وضع اللصقة الجديدة (الحرف)
	☒	13 فبراير 2022	الأحد	A
	☒	17 فبراير 2022	الخميس	B
1	☐			
	☐			
2	☐			
	☐			
3	☐			
	☐			
4	☐			
	☐			
5	☐			
	☐			
6	☐			
	☐			
7	☐			
	☐			
8	☐			
	☐			

سجلات الأدوية

الأسبوع	هل تمت إزالة اللصقة القديمة؟	تاريخ وضع اللصقة الجديدة	يوم وضع اللصقة الجديدة	منطقة وضع اللصقة الجديدة (الحرف)
	☒	13 فبراير 2022	الأحد	A
	☒	17 فبراير 2022	الخميس	B
9	☐			
	☐			
10	☐			
	☐			
11	☐			
	☐			
12	☐			
	☐			
13	☐			
	☐			
14	☐			
	☐			
15	☐			
	☐			
16	☐			
	☐			

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

اقرأ نشرة معلومات المريض لمزيد من المعلومات حول هذا الدواء.

يرجى الإبلاغ عن الأعراض الجانبية المشتبه بها للأدوية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. يمكنك الإبلاغ عن طريق:

● مركز اتصال الهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999

● البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

● الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa/>



بدلاً من ذلك، يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية مباشرة إلى شركة لوي من خلال عنوان البريد الإلكتروني أدناه:

● البريد الإلكتروني: safety.ksa@luyesa.uk

عند الإبلاغ يرجى تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات.

من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.