

Patient Alert Card

IKSARONT

(Apixaban)

Carry this card with
you at all times

This risk minimization measure is approved by the SFDA

**Show this card to your pharmacist, dentist and
any other healthcare professionals that treat you.**

Information for patients

- Take Iksaront® regularly as instructed. If you miss a dose, take it as soon as you remember and continue to follow your dosing schedule.
- Do not stop taking Iksaront® without talking to your doctor, as you are at risk of suffering from a stroke or other complications.
- Iksaront® helps to thin your blood. However, this may increase your risk of bleeding.
- Signs and symptoms of bleeding include bruising or bleeding under the skin, tar-coloured stools, blood in urine, nose-bleed, dizziness, tiredness, paleness or weakness, sudden severe headache, coughing up blood or vomiting blood.
- If the bleeding does not stop on its own, **seek medical attention immediately.**
- If you need surgery, inform your doctor that you are taking Iksaront®.

Version 3

Date: 16/12/2021

I am under anticoagulation treatment with Iksaront[®] (apixaban) to prevent blood clots

Information for healthcare professionals

- Iksaront[®] (apixaban) is an oral anticoagulant acting by direct selective inhibition of factor Xa.
- Iksaront[®] may increase the risk of bleeding. In case of major bleeding events, it should be stopped immediately.
- Treatment with Iksaront[®] does not require routine monitoring of exposure. A calibrated quantitative anti-Factor Xa assay may be useful in exceptional situations, e.g., overdose and emergency surgery (prothrombin time (PT), international normalized ratio (INR) and activated partial thromboplastin time (aPTT) clotting tests are not recommended) – see SmPC.
- An agent to reverse the anti-factor Xa activity of apixaban is available.

Please complete this section or ask your doctor to do it

Name: _____

Birth Date: _____

Indication: _____

Dose: _____ mg twice daily

Doctor's Name: _____

Doctor's telephone: _____

بطاقة تنبيه المريض
إيكسارونت /iksaront
(أبيكسابان) /Apixaban

إحتفظ بهذه البطاقة معك طوال الوقت

تمت الموافقة على وسائل خفض المخاطر من قبل هيئة الغذاء و الدواء السعودية
أظهر هذه البطاقة للصيدلي، طبيب الأسنان أو أى أخصائى رعاية صحية يقوم بعلاجك

معلومات للمرضى

• تناول إيكسارونت بانتظام حسب تعليمات الطبيب. إذا فاتتك جرعة ، خذها بمجرد أن تتذكرها واستمر في اتباع جدول الجرعات الخاص بك.

• لا تتوقف عن تناول إيكسارونت دون استشارة الطبيب ، لأنك معرض لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو مضاعفات أخرى.

• يساعد إيكسارونت على زيادة سيولة الدم و لذلك قد يزيد هذا من خطر إصابتك بالنزيف.

• تشمل علامات وأعراض النزيف كدمات أو نزيف تحت الجلد ، براز بلون داكن ، دم في البول ، نزيف من الأنف ، دوار ، تعب ، شحوب أو ضعف ، صداع حاد مفاجئ ، سعال مصحوب بالدم أو قيء دم.

• إذا لم يتوقف النزيف من تلقاء نفسه ، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
• إذا كنت بحاجة لعملية جراحية ، أخبر طبيبك أنك تتناول إيكسارونت.

أنا أتلقي علاجاً مضاداً للتخثر باستخدام
إيكسارونت /
Apixaban/ (أبيكسابان)
لمنع تجلط الدم

معلومات لمتخصصي الرعاية الصحية

• إيكسارونت / (أبيكسابان) هو مضاد للتخثر عن طريق الفم يعمل عن طريق تثبيط انتقائي مباشر للعامل Xa.

• قد يزيد إيكسارونت من خطر النزيف و في حالة حدوث نزيف حاد ، يجب إيقافه على الفور.

• لا يتطلب العلاج بـ إيكسارونت مراقبة روتينية للتعرض. قد يكون الفحص الكمي المعايير لمضاد عامل Xa مفيداً في حالات استثنائية ، على سبيل المثال ، الجرعات الزائدة والجراحة الطارئة (زمن البروثرومبين (PT) ، والنسبة الطبيعية الدولية (INR) ووقت الثرومبوبلاستين الجزئي المنشط (aPTT) - لا ينصح باختبارات التخثر) - انظر ملخص خصائص المنتج.

• يتوفر عامل لعكس نشاط مضاد العامل Xa لأبيكسابان.

الرجاء إكمال هذا القسم أو اطلب من طبيبك إكماله:
الاسم:

تاريخ الميلاد:

دواعي الاستعمال:

مجم مرتين يومياً

الجرعة:

اسم الطبيب:

تليفون الطبيب: