

جاكنز

توفاسيتينيب 5ملغم، 10ملغم

بطاقة تنبيه المريض

هذه البطاقة للمرضى الذين تم وصف
جاكنز (توفاسيتينيب) لهم

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء

- تحتوي هذه البطاقة على معلومات مأمونية مهمة تتعلق بجاكنز. إذا لم تكن هذه المعلومات واضحة لك، يرجى سؤال طبيبك/الصيدلي
- احتفظ بهذه البطاقة معك وأظهرها لأي طبيب أو صيدلي يتدخل في رعايتك.
- إذا توقفت عن تناول جاكينز، فاحتفظ بهذه البطاقة لمدة لا تقل عن شهرين بعد تناول آخر جرعة من جاكينز

- لمزيد من المعلومات راجع نشرة معلومات المريض الخاصة بجاكنز.
- ينبغي عليك استخدام جاكينز وفقاً لنشرة معلومات المريض

أخبر طبيبك أو الصيدلي عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي صرفت بوصفة طبية أو بدونها، الفيتامينات والمستحضرات العشبية.

لا يجوز تناول بعض الأدوية مع جاكز حيث من الممكن أن تغيّر من مستوى جاكز في جسمك وقد تحتاج جرعتك إلى تعديل.

عليك إخبار طبيبك في حال كنت تستخدم أدوية تحتوي على المواد الفعّالة التالية:

- المضادات الحيوية مثل ريفامبيسين، التي تستخدم في علاج العدوى البكتيرية
- فلوكونازول وكيٹوكونازول لعلاج العدوى الفطرية

لا يوصى باستخدام جاكنز مع الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة لسير الأمراض البيولوجية لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الصدفي، الأدوية البيولوجية لعلاج التهاب القولون التقرحي، أو مع أدوية معينة أخرى تثبط جهازك المناعي (على سبيل المثال، آزاثيوبرين،

ميركابتوبيور اين، تاكروليماس أو سيكلوسبورين). قد يزيد تناول جاكنز مع هذه الأدوية من خطر تعرضك لتنشيط الجهاز المناعي وللعدوى.

من الممكن أن يزيد العلاج بجاكنز من خطر الإصابة بالعدوى، الأورام (تشمل سرطان الرئة، سرطان الغدد الليمفاوية، وسرطان الجلد غير الميلانيني).

قد يتعرض المرضى الذين يبلغون من العمر 65 سنة فأكثر لخطر متزايد للإصابة بعدوى، نوبة قلبية وبعض أنواع السرطان. قد يقرر طبيبك أن جاكنز غير مناسب لك.

خلال العلاج بجاكنز

أخبر طبيبك **على الفور** في حال:

- أصبت بقصر مفاجئ في النفس أو صعوبة في التنفس، ألم الصدر أو ألم في أعلى الظهر، تورم الساق أو الذراع، ألم الساق أو ألم عند اللمس، أو احمرار أو تغيير لون الساق أو الذراع خلال فترة تناول جاكينز، بحيث قد تكون هذه العلامات دلالة على تكوّن جلطة في الرئتين أو الأوردة

- أصبت بأعراض عدوى، مثل حمى، سعال مستمر، فقدان الوزن، أو إرهاق مفرط
- أصبت بأي من أعراض فيروس الهربس النطاقي، مثل طفح جلدي يسبب ألم أو تقرحات
- إذا كنت قد خالطت شخصاً مصاباً بالسل

- أصبت بألم أو ضيق شديدين في الصدر (قد ينتشر إلى الذراعين، الفك، الرقبة والظهر)، قصر النفس، تعرق بارد، خفة في الرأس أو دوار مفاجئ، حيث قد تدل هذه العلامات على الإصابة بالنوبة القلبية
- ظهور أي تورم في العقد الليمفاوية في رقبتك، إبطك، أو فخذك؛ الشعور بتعب دائم؛ حمى؛ تعرق ليلي؛ سعال مستمر أو متفاقم؛ صعوبة في التنفس، بحة في الصوت أو صفير؛ أو فقدان غير مبرر للوزن

- لاحظت أي تغييرات في شامات أو بقع موجودة في الأصل
- تطور أعراض لمرض في الرئة، مثل قصر النفس
- ظهور علامات وأعراض في البطن مثل ألم المعدة، ألم البطن، وجود دم في البراز، أو أي تغيير في حركة الأمعاء مصحوب بحمى

- أصبح الجلد أصفر اللون، غثيان أو تقيؤ
- كنت تنوي تلقي أي لقاح. لا ينبغي تلقي أنواع محددة من اللقاحات خلال فترة تناول جاكنز
- الحمل أو التخطيط للحمل. لا ينبغي استخدام جاكنز خلال الحمل. يجب نصح النساء اللاتي في سن الإنجاب باستخدام وسائل فعّالة لمنع الحمل خلال العلاج بجاكنز ولمدة لا تقل عن 4 أسابيع بعد آخر جرعة

• لا ينبغي على النساء القيام بالرضاعة الطبيعية خلال علاجهن بجاكنز

معلومات أخرى (يرجى التعبئة)

اسم المريض:

اسم الطبيب:

رقم هاتف الطبيب:

رقم فاكس الطبيب:

يمكنك المساعدة من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية التي قد تصيبك. إذا أصبت بأي آثار جانبية فتحدث إلى طبيبك، الصيدلي أو الممرض.

يرجى الإبلاغ عن التفاعلات الدوائية المحتملة للهيئة العامة للغذاء والدواء – المركز الوطني للتيقظ من خلال:

الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa>

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

الرقم الموحد: 19999



وأيضاً، يمكن الإبلاغ لشركة سدير فارما من خلال:

هاتف: +966-920001432 تحويلة داخلية : 107

البريد الإلكتروني: Pharmacovigilance@SudairPharma.com

