

أمجيفيتا (أداليموماب)

بطاقة تذكير المريض لطفلك

تحتوي هذه البطاقة على معلومات أمان مهمة بشأن أداليموماب

- أظهر هذه البطاقة لجميع مقدمي الرعاية الصحية لطفلك حتى يكونوا على علم بأن طفلك يتناول أداليموماب
- احتفظ بهذه البطاقة معك طوال الوقت أثناء تناول طفلك لعقار أمجيفيتا ولمدة 4 أشهر بعد آخر حقنة من عقار أداليمومابالتي يتلقاها طفلك
- في قسم الملاحظات الموجود على ظهر هذه البطاقة، قم بتدوين المعلومات المتعلقة بأي فحوصات أو علاجات للسل خضع لها طفلك.

من المهم معرفة أن الآثار الجانبية المحتملة المذكورة في هذه البطاقة ليست الآثار الجانبية الوحيدة المحتملة لدواء أداليموماب. للحصول على معلومات أكثر، يرجى قراءة نشرة المعلومات المرفقة مع الدواء أو التحدث مع مقدم الرعاية الصحية لطفلك.

ما هو أمجيفيتا

يقوم الجهاز المناعي عادةً بحماية الجسم من العدوى، ولكن في بعض الحالات المرضية لا يعمل هذا الجهاز بالشكل المطلوب. أداليموماب هو عبارة عن دواء يُستخدم لعلاج بعض أمراض المناعة الذاتية، مثل

- التهاب المفاصل الروماتويدي
- التهاب المفاصل المتعدد اليفعي مجهول السبب
- التهاب المفاصل والأوتار والأربطة المتصلة بالمفصل
- التهاب الفقار الروماتويدي
- التهاب المفاصل الفقارية المحورية بدون دليل بالتصوير الشعاعي على التهاب الفقار الروماتويدي
- التهاب المفاصل الصدافي
- الصدف اللويحي
- التهاب الغدد العرقية القيحي
- داء كرون
- التهاب القولون التقرحي
- التهاب القرنية غير المُعدي

ما الذي يجب عليّ معرفته قبل أن يبدأ طفلي العلاج بـ أداليموماب؟

قبل أن يبدأ طفلك العلاج بـ أداليموماب، يجب عليك التحدث مع مقدم الرعاية الخاص به حول الفوائد والمخاطر التي قد يتعرض لها طفلك.

يجب أن تخبر مقدم الرعاية الصحية:

- أي مشاكل صحية لدى طفلك
- أي أدوية يتناولها طفلك (من ضمنها أدوية وصفية وغير وصفية، فيتامينات ومكملات غذائية)
- إذا كان طفلك:
 - يعاني عدوى أو أعراض عدوى (مثل الحمى، أو تقرحات لا تلتئم، أو جروح، أو الشعور بالتعب أو الإرهاق، أو مشاكل في الأسنان)
 - يعاني حالياً من مرض السل أو سبق أن أصيب به في الماضي أو كان على قرب بشخص مصاب بمرض السل.
 - مصاب بسرطان أو كان مصاب به في الماضي
 - يشعر أو سبق له الشعور بخدر أو وخز
 - يعاني من مشكلة تؤثر على جهازه العصبي، مثل التصلب المتعدد

سيقوم مقدم الرعاية الصحية لطفلك بفحصه للتأكد من عدم وجود علامات أو أعراض مرض السل قبل بدء العلاج بـ أداليموماب. وقد يحتاج طفلك إلى تلقي علاج لمرض السل قبل بدء العلاج.

نصائح حول التطعيم

باستثناء اللقاحات الحية، يمكن للمرضى الذين يتناولون أداليموماب تلقي التطعيمات. إذا تلقيت دواء أداليموماب أثناء الحمل، فأخبري مقدم الرعاية الصحية الخاص بالرضيع قبل تلقيه أي تطعيمات. لا يُنصح بإعطاء اللقاحات الحية مثل لقاح السل للرضع الذين تعرضوا لـ أداليموماب في الرحم حتى مرور 5 أشهر على آخر جرعة من أداليموماب تناولتها الأم أثناء الحمل. احرص دائماً على إستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل أي لقاح.

ما الذي يجب عليّ فعله أثناء فترة علاج طفلي بـ أداليموماب؟

أثناء فترة علاج طفلك، يجب عليك:

- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ما إذا كان دواء أداليموماب فعالاً أم لا
- اتصل بمقدم الرعاية الصحية على الفور في حال تعرض طفلك أي آثار جانبية. يمكن لمقدم الرعاية الصحية لطفلك مساعدتك في التعامل معها
 - إذا ظهرت على طفلك أي آثار جانبية، فسيقرر مقدم الرعاية الصحية الخاص به ما إذا كان ينبغي أن يستمر طفلك في تناول أداليموماب
- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي آثار جانبية يعاني منها طفلك خلال فترة تصل إلى 4 أشهر بعد الحقنة الأخيرة من أداليموماب. وذلك لأن الآثار الجانبية قد تظهر بعد الجرعة الأخيرة من أداليموماب.
- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك عن:
 - أي حالات طبية جديدة يعاني منها طفلك
 - أي أدوية جديدة يتناولها طفلك (من ضمنها أدوية وصفية وغير وصفية، فيتامينات ومكملات غذائية)
 - أي عملية جراحية يخضع لها طفلك

اتصل بمقدم الرعاية الصحية لطفلك أو اطلب الرعاية الطبية على الفور إذا ظهرت على طفلك أي من الأعراض التالية التي قد تشير إلى آثار جانبية خطيرة. هذه ليست جميع الأعراض المحتملة للآثار الجانبية. أخبر مقدم الرعاية الصحية لطفلك على الفور إذا شعر طفلك بأي شيء غير عادي أثناء العلاج بعقار أداليموماب وبعد مرور 4 أشهر من آخر جرعة. قد يتمكن مقدم الرعاية الصحية لطفلك من المساعدة في التعامل مع أعراض الآثار الجانبية ومنعها من التفاقم.

الالتهابات:

- الحمى
- القشعريرة
- التعرق غير المعتاد
- الشعور بالتوعك أو بالتعب أكثر من المعتاد
- التقيؤ أو الشعور بالرغبة في التقيؤ (الغثيان)
- الإسهال
- ألم في المعدة
- عدم الشعور بالجوع كما هو معتاد (فقدان الشهية)
- فقدان الوزن
- السعال أو سعال الدم أو المخاط
- الشعور بعدم القدرة على التقاط الأنفاس (ضيق التنفس)
- مشاكل في التبول
- تقرحات على الجلد
- تقرحات وجروح لا تلتئم على الجلد
- آلام في العضلات
- مشاكل في الأسنان أو اللثة

السرطان:

- التعرق الليلي
- تورم الغدد في الرقبة أو الإبطين أو الفخذين أو مناطق أخرى
- فقدان الوزن
- ظهور آفات جلدية جديدة أو حدوث تغير في الآفات الجلدية (مثل الشامات أو النمش) التي كان يعاني منها بالفعل
- حكة شديدة

مشاكل الجهاز العصبي:

- الشعور بالخدر أو الوخز في أي مكان من الجسم
- تغيرات في الرؤية

• ضعف العضلات
• الدوار

فحوصات السل وعلاجه

تاريخ آخر فحص لمرض السل الذي خضع له طفلك :

هل سبق أن جاءت نتيجة فحص طفلك إيجابية لمرض السل؟

نعم لا

هل تلقى طفلك علاجًا بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية لمرض السل؟

نعم لا

كم استمرت مدة علاج طفلك من مرض السل؟

معلومات المريض

اسم طفلك: _____

اسم مقدم الرعاية الصحية لطفلك: _____

رقم هاتف مقدم الرعاية الصحية لطفلك: _____

تاريخ أول حقنة «أمجيفيتا» لطفلك: _____

تاريخ آخر حقنة «أمجيفيتا» لطفلك إذا كان علاج طفلك قد انتهى: _____

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

استشر طبيبك بشأن أي آثار جانبية قد تواجهها، بما في ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في نشرة الدواء.

يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية عن طريق:

جهات الاتصال المحلية المعنية بالسلامة في شركة أمجن

هاتف : +966112799300

البريد الإلكتروني: safety-mea@amgen.com

المركز الوطني للتبليغ الدوائي (NPC)

الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa أونلاين عن طريق الإنترنت:

<http://ade.sfd.gov.sa/>



إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى معلومات إضافية بخصوص استخدام أداليموماب يمكنك الرجوع إلى نشرة معلومات المريض، أو الاتصال

بالمعلومات الطبية عبر البريد الإلكتروني على: [medinfo-](mailto:medinfo-mea@amgen.com)

medinfo-mea@amgen.com