

أمجيفيتا

(أداليموماب)

بطاقة تذكير المريض

تحتوي هذه البطاقة على معلومات أمان مهمة بشأن أداليموماب

- أظهر هذه البطاقة لجميع مقدمي الرعاية الصحية حتى يكونوا على علم بأنك يتناول أداليموماب
- احتفظ بهذه البطاقة معك طوال الوقت أثناء تناولك لعقار أداليموماب ولمدة 4 أشهر بعد آخر حقنة من عقار أداليموماب
- في قسم الملاحظات الموجود على ظهر هذه البطاقة، قم بتدوين المعلومات المتعلقة بأي فحوصات أو علاجات للسل خضعت لها.

من المهم معرفة أن الآثار الجانبية المحتملة المذكورة في هذه البطاقة ليست الآثار الجانبية الوحيدة المحتملة لدواء أداليموماب. للحصول على معلومات أكثر، يرجى قراءة نشرة المعلومات المرفقة مع الدواء أو التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ما هو أمجيفيتا

يقوم الجهاز المناعي عادةً بحماية الجسم من العدوى، ولكن في بعض الحالات المرضية لا يعمل هذا الجهاز بالشكل المطلوب. أداليموماب هو عبارة عن دواء يُستخدم لعلاج بعض أمراض المناعة الذاتية، مثل

- التهاب المفاصل الروماتويدي
- التهاب المفاصل المتعدد اليفعي مجهول السبب
- التهاب المفاصل والأوتار والأربطة المتصلة بالمفصل
- التهاب الفقار الروماتويدي
- التهاب المفاصل الفقارية المحورية بدون دليل بالتصوير الشعاعي على التهاب الفقار الروماتويدي
- التهاب المفاصل الصداقي
- الصدف اللويحي
- التهاب الغدد العرقية القيحي
- داء كرون
- التهاب القولون التقرحي
- التهاب القرنية غير المُعدي

ما الذي يجب عليّ معرفته قبل أن أبدأ العلاج بـ أداليموماب؟

قبل أن تبدأ العلاج بـ أداليموماب، يجب عليك التحدث مع مقدم الرعاية الخاص بك حول الفوائد والمخاطر التي قد تتعرض لها.

يجب أن تخبر مقدم الرعاية الصحية عن:

- أي مشاكل صحية لديك
 - أي أدوية تتناولها (من ضمنها أدوية وصفية وغير وصفية، فيتامينات ومكملات غذائية)
 - إذا كنت:
 - تعاني من عدوى أو أعراض عدوى (مثل الحمى، أو تقرحات لا تلتئم، أو جروح، أو الشعور بالتعب أو الإرهاق، أو مشاكل في الأسنان)
 - تعاني حالياً من مرض السل أو سبق أن أصبت به في الماضي أو كنت على قرب بشخص مصاب بمرض السل.
 - مصاب بسرطان أو كنت مصاب به في الماضي
 - تشعر أو سبق لك الشعور بخدر أو وخز
 - تعاني من مشكلة تؤثر على الجهاز العصبي، مثل التصلب المتعدد
- سيقوم مقدم الرعاية الصحية بفحصك للتأكد من عدم وجود علامات أو أعراض مرض السل قبل بدء العلاج بـ أداليموماب. وقد تحتاج إلى تلقي علاج لمرض السل قبل بدء العلاج.

نصائح حول التطعيم

باستثناء اللقاحات الحية، يمكن للمرضى الذين يتناولون أداليموماب تلقي التطعيمات. إذا تلقيت دواء أداليموماب أثناء الحمل، فأخبري مقدم الرعاية الصحية الخاص برضعتك قبل تلقيه أي تطعيمات. لا يُنصح بإعطاء اللقاحات الحية مثل لقاح السل للرضع الذين تعرضوا لـ أداليموماب في الرحم حتى مرور 5 أشهر على آخر جرعة من أداليموماب تناولتها الأم أثناء الحمل. احرص دائماً على إستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل أي لقاح.

ما الذي يجب عليّ فعله أثناء فترة علاجي بـ أداليموماب؟

أثناء فترة علاجك، يجب عليك:

- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ما إذا كان دواء أداليموماب فعالاً أم لا
- اتصل بمقدم الرعاية الصحية على الفور في حال تعرضك لأي آثار جانبية. يمكن لمقدم الرعاية الصحية مساعدتك في التعامل معها
 - إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، فسيقرر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ما إذا كان ينبغي أن تستمر في تناول أداليموماب
- أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي آثار جانبية تعاني منها خلال فترة تصل إلى 4 أشهر بعد الحقنة الأخيرة من أداليموماب. وذلك لأن الآثار الجانبية قد تظهر بعد الجرعة الأخيرة من أداليموماب.
- أخبر مقدم الرعاية الصحية عن:
 - أي حالات طبية جديدة تعاني منها
 - أي أدوية جديدة تناولتها (من ضمنها أدوية وصفية وغير وصفية، فيتامينات ومكملات غذائية)
 - أي عملية جراحية خضعت لها

اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو اطلب الرعاية الطبية على الفور إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية التي قد تشير إلى آثار جانبية خطيرة. هذه ليست جميع الأعراض المحتملة للآثار الجانبية. أخبر مقدم الرعاية الصحية على الفور إذا شعرت بأي شيء غير عادي أثناء العلاج بعقار أداليموماب وبعد مرور 4

أشهر من آخر حقنة. قد يتمكن مقدم الرعاية الصحية من المساعدة في التعامل مع أعراض الآثار الجانبية ومنعها من التفاقم.

الالتهابات:

- الحمى
- القشعريرة
- التعرق غير المعتاد
- الشعور بالتوعك أو بالتعب أكثر من المعتاد
- التقيؤ أو الشعور بالرغبة في التقيؤ (الغثيان)
- الإسهال
- ألم في المعدة
- عدم الشعور بالجوع كما هو معتاد (فقدان الشهية)
- فقدان الوزن
- السعال أو سعال الدم أو المخاط
- الشعور بعدم القدرة على التقاط الأنفاس (ضيق التنفس)
- مشاكل في التبول
- تقرحات على الجلد
- تقرحات وجروح لا تلتئم على الجلد
- آلام في العضلات
- مشاكل في الأسنان أو اللثة

السرطان:

- التعرق الليلي
- تورم الغدد في الرقبة أو الإبطين أو الفخذين أو مناطق أخرى
- فقدان الوزن
- ظهور آفات جلدية جديدة أو حدوث تغير في الآفات الجلدية (مثل الشامات أو النمش) التي كان يعاني منها بالفعل
- حكة شديدة

مشاكل الجهاز العصبي:

• الشعور بالخدر أو الوخز في أي مكان من الجسم
• تغيرات في الرؤية
• ضعف العضلات
• الدوار

فحوصات السل وعلاجه

تاريخ آخر فحص لمرض السل الذي خضعت له :

هل سبق أن جاءت نتيجة فحصك إيجابية لمرض السل؟

نعم لا

هل تلقيت علاجًا بعد أن جاءت نتيجة الفحص إيجابية لمرض السل؟

نعم لا

كم استمرت مدة علاجك من مرض السل؟

معلومات المريض

اسمك:

اسم مقدم الرعاية الصحية:

رقم هاتف مقدم الرعاية الصحية:

تاریخ أول حقنة «أمجيفيتا»:

تاريخ آخر حقنة «أمجيفيتا» إذا كان علاجك قد انتهى:

معلومات حول أي فحوصات أو علاجات للسل خضع لها طفلك:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

استشر طبيبك بشأن أي آثار جانبية قد تواجهها، بما في ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في نشرة الدواء.

يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية عن طريق:

جهات الاتصال المحلية المعنية بالسلامة في شركة أمجن

هاتف : +966112799300

البريد الإلكتروني: safety-mea@amgen.com

المركز الوطني للتبليغ الدوائي (NPC)

الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)

مركز اتصال الهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999

البريد الإلكتروني: npc.drug@sFDA.gov.sa

الموقع الإلكتروني لنظام تيقظ: <http://ade.sFDA.gov.sa/>



إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى معلومات إضافية بخصوص استخدام أداليموماب يمكنك الرجوع إلى نشرة معلومات المريض، أو الاتصال بالمعلومات الطبية عبر البريد الإلكتروني على:

medinfo-mea@amgen.com