

# دليلك للعلاج بعقار لوسيننتس المعروف علمياً بحقن (رانيبيزوماب)

FA-11750734

تمت الموافقة على هذه المادة من قبل الادارة التنفيذية للتبقيظ الدوائي في الهيئة العام للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية

Lucentis® (ranibizumab) SFDA approved RMP  
Educational Materials V.16.2 Aug 2026

### ما هو اللوسينتس®؟

---

- في حالة ضعف البصر بسبب اتساع الأوعية الدموية المشيمية (CNV) كعرض ثانوي لقصر النظر المرضي (PM) تنمو أوعية دموية غير طبيعية في العين، قد تتسبب هذه الأوعية في حدوث ارتشاح مما قد يؤدي لفقدان البصر<sup>١</sup>
- يعمل اللوسينتس® تحديدًا من خلال التعرف على الأوعية الدموية الجديدة في العين ومنع نموها، مما يمكن أن يساعد في وقف الارتشاح وفقدان الرؤية.<sup>٢</sup>

1. Miller DG, Singerman LJ. *Optom Vis Sci.* 2006;83(5):316-325. 2. Ferrara N, et al. *Retina.* 2006;26(8):859-70.

تم وضع هذا الكتيب لمساعدتك على فهم استخدام عقار اللوسينتس® لعلاج ضعف البصر الناتج عن اتساع الأوعية الدموية المشيمية (CNV) كعرض ثانوي لقصر النظر المرضي (PM) بشكل أفضل:


تم وضع هذا الكتيب لمساعدتك على فهم استخدام عقار اللوسينتس® عند استخدامه لعلاج ضعف البصر الناتج عن اتساع الأوعية الدموية المشيمية (CNV).

## القسم ٢: لماذا وصف لي الطبيب لوسينتس®؟

### لماذا وصف لي الطبيب لوسينتس®؟

#### اتساع الأوعية الدموية المشيمية نتيجة لقصر النظر

- اتساع الأوعية الدموية المشيمية نتيجة لقصر النظر هو حالة مرضية تصيب البقعة الصفراء، وهي جزء من شبكية العين في الجزء الخلفي للعين.
- البقعة الصفراء هي منطقة في العين مسؤولة عن حدة الرؤية في مركز رؤيتك.
- ضعف البصر الناتج عن اتساع الأوعية الدموية المشيمية هو نمو أوعية دموية جديدة، وضعيفة تحت البقعة الصفراء، مما قد يؤدي إلى ارتشاح السوائل والدم في شبكية العين، مما يؤثر على رؤيتك المركزية.
- لوحظ ضعف البصر الناتج عن اتساع الأوعية الدموية المشيمية في الضمور البقعي المرتبط بالعمر. كما قد يترافق أيضاً مع أمراض أخرى. وتشمل هذه الأمراض ضعف البصر الناتج عن اتساع الأوعية الدموية المشيمية بسبب مرضي قصر النظر، والوحمات الوعائية أو اعتلال المشيمية و الشبكية المركزي المصلي، واتساع الأوعية الدموية المشيمية الالتهابي.




1. Miller DG, Singerman LJ. *Optom Vis Sci.* 2006;83(5):316-325; 2. Jager RD, et al. *N Engl J Med.* 2008;358(24):2606-2617.


Image: Blausen.com staff. "Blausen gallery 2014". *Wikiversity Journal of Medicine*. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762. (Own work) [CC-BY-3.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>)], via Wikimedia Commons. Available: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen\\_0312\\_DiabeticRetinopathy.png](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0312_DiabeticRetinopathy.png) [accessed October 2016].

## القسم ٢: لماذا وصف لي الطبيب لوسينتس®؟

### شبكة عين سليمة



### شبكة عين مصابة باتساع الأوعية الدموية المشيمية نتيجة لقصر النظر



نمو أوعية دموية جديدة و ضعيفة مسببة الإرتشاح مما يؤدي  
لتضرر البقعة الشبكية

## القسم ٣ : كيف يتم تشخيص أمراض الشبكية؟

### كيف يتم تشخيص أمراض الشبكية؟

- هناك مجموعة كبيرة من التقنيات المختلفة التي تستخدم لفحص العين. ويمكن تقسيم هذه التقنيات إلى فئتين أساسيتين بناءً على ما يتم فحصه:
  - < وظيفة العين: ويشمل هذا تقنيات تقييم الرؤية مثل: مخططات الرؤية.
  - < تركيبية العين: تفحص هذه التقنيات أنسجة العين لمعرفة ما إذا كان بها تلف أو مرض.
- إلى جانب الاختبارات القياسية، (مثل: مخطط الرؤية ومصباح فحص العين وغيرهما).<sup>١، ٢</sup> هناك بعض التقنيات الإضافية التي تستخدم لفحص الأوعية الدموية وأنسجة العين.<sup>٣</sup>
- تستخدم تقنية تصوير الأوعية بالفلوريسين لتصوير الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين.<sup>٣، ٤</sup>
  - < أولاً، سيقوم الطبيب بتوسيع بؤبؤ العين عن طريق استخدام بعض القطرات.
  - < و بعد ذلك سيتم حقن صبغة صفراء في ذراعك (وهذا يجعل الأوعية الدموية في عينيك تظهر بوضوح عند تسليط نوع معين من الضوء عليها).
  - < ثم يتم أخذ سلسلة من الصور الفوتوغرافية.
- تستخدم تقنية تصوير التماسك البصري المقطعي عادة لتصوير صوراً مقطعية للجزء الخلفي من العين.<sup>٤-٢</sup>
  - < وهي تقنية لا تحتاج لتدخل جراحي وتتطلب فقط أن تبقى رأسك ثابتة مع النظر داخل جهاز في حين يتم التقاط صور مفصلة لشبكية العين دون الحاجة إلى لمس عينيك

1. Lueck CJ, et al. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2004;75(Suppl 4):iv2-iv11. 2. American Academy of Ophthalmology. Available: [www.aao.org/Assets/dba38b76-3095-4360-8cb6-00adab3aad68/635919125497230000/diabeticretinopathy-ppp-pdf](http://www.aao.org/Assets/dba38b76-3095-4360-8cb6-00adab3aad68/635919125497230000/diabeticretinopathy-ppp-pdf) [accessed October 2016]. 3. Arias L, Mones J. AMD Book: Fluorescein angiography. Available: <http://www.amdbook.org/content/fluorescein-angiography-0> [accessed October 2016]. 4. Huang D, et al. *Science*. 1991;254(5035):1178-81.

## القسم ٣ : كيف يتم تشخيص أمراض الشبكية؟

### كيف يتم أخذ علاج لوسينتس®؟

- يقوم طبيب العيون بحقن لوسينتس® كحقنة في العين.
- من الطبيعي أن تقلق بشأن مثل هذه الحقن، ولكن أفاد المرضى أن الحقن غالباً ما تكون غير مؤلمة وأنها تبدو أسوأ مما هي عليه في الحقيقة!
- < أفاد غالبية المرضى بأن أي مخاوف حول الحقن تبددت بعد الحقنة الأولى!

### ما الذي سيحدث خلال مقابلي مع الطبيب؟

- في يوم العلاج ، سيتم الحرص على التأكد من شعورك بالراحة والاسترخاء.
- قبل الحقن بعقار لوسينتس® عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت قد أصبت من قبل بالسكتة الدماغية أو عانيت من أعراضها (ضعف أو شلل في الأطراف أو الوجه، وصعوبة في الكلام أو الفهم) ليتم تقرير ما إذا كان هذا هو العلاج المناسب لك
- أخبر طبيبك إذا كنت تأخذ أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تؤخذ بدون وصفة طبية.
- سيقوم الطبيب أو الممرضة بما يلي:
  - < تغطية وجهك والمنطقة حول عينك بغطاء خاص.
  - < تنظيف العين والجلد حولها.
  - < الاحتفاظ بالعين مفتوحة حتى لا تطرف
  - < تخدير عينيك بمخدر لمنع الألم
- سيقوم الطبيب بالحقن في الجزء الأبيض من العين. وقد تشعر بقليل من الضغط أثناء الحقن
- من المهم أن تخبر طبيبك
  - < إذا كنت مصاب بعدوى في العين.
  - < إذا كان لديك أي ألم أو احمرار في عينيك.
  - < إذا كنت تعتقد أنك تعاني من حساسية للوسينتس® أو البتادين® (اليود)

### ما الذي يحدث عقب أخذ حقنة لوسينتس®؟

- سوف يقوم طبيبك بإجراء فحوصات العين، بما في ذلك قياس ضغط العين للتأكد من أن العلاج سار على ما يرام
- من الطبيعي ملاحظة احمرار في بياض العين حيث يتم الحقن.
  - < هذا الاحمرار أمر طبيعي وسوف يزول في غضون أيام قليلة .
  - < اتصل بطبيبك في حالة عدم زوال هذا الاحمرار أو ازدياده.
- قد ترى بعض البقع أو العوامات في مجال رؤيتك.
  - < هذه البقع طبيعية وسوف تزول في غضون أيام قليلة.
  - < اتصل بطبيبك في حالة عدم زوال هذه البقع أو في حالة ازديادها.
- سيتم توسيع بؤبؤ العين لتلقي الحقنة، مما يمكن أن يجعل الرؤية بصورة طبيعية صعبة لبضع ساعات بعد العلاج.
- يجب الامتناع عن القيادة أو تشغيل الآلات حتى تعود رؤيتك إلى حالتها الطبيعية
- من المهم مراقبة التغيرات في حالة العين والجسم في الأسبوع التالي للحقن.
- في حالات نادرة، يمكن للحقن في العين أن يسبب العدوى.
- اتصل بطبيبك في أقرب وقت ممكن إذا ظهرت عليك أي من العلامات والأعراض التالية في عينيك:
  - < ألم
  - < حساسية للضوء أو زيادة إفراز الدموع
  - < تورم الجفون أو أي جزء من العين
  - < زيادة الاحمرار
  - < رؤية غير واضحة، مشوهة أو فقدان مفاجئ للرؤية
  - < ومضات ضوء
  - < رؤية ذباب، بقع سوداء أو هالات ملونة
  - < جفاف سطح العين

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المذكورة في هذه النشرة

### ما هي مدة العلاج بلوسينتس؟

- يختلف كل مريض عن الآخر. من الممكن أن تحتاج حقن لوسينتس® إضافية ويعتمد ذلك على مدى استجابتك للعلاج و مدى تحسن الرؤية.
- تحدث مع طبيبك عن حالتك و شعورك نحو العلاج.
- من المهم أن تلتزم بحضور مواعيد طبيب العيون الخاص بك
- < الطريقة المثالية لحماية نظام حياتك المستقل و رؤيتك، هي زيارة طبيبك بانتظام
- < احرص على مناقشة خياراتك العلاجية مع الطبيب
- إذا كنت تفكر في التوقف عن العلاج بلوسينتس®، اطلب من طبيبك النصيحة أولاً
- لأية أسئلة أخرى حول استخدام هذا المنتج، يرجى استشارة طبيبك
- اتبع كل تعليمات الطبيب بدقة، و التي يمكن أن تختلف عن المعلومات العامة الواردة في هذه النشرة

يحدد طبيبك عدد المرات التي يرغب أن يراك فيها لمراقبة حالتك وتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى حقن إضافية

احرص دائما على حضور كل موعد يرتبه لك الطبيب.

إذا فاتك أحد مواعيد العلاج بلوسينتس® اتصل بطبيبك في أقرب فرصة ممكنة

### ماذا يمكنني أن أفعل للمساعدة في تحسين قوة الإبصار؟

- مراقبة حالة الإبصار لديك بانتظام:
  - < في المنزل، قم بتدوين ملاحظات بشأن أي تغييرات في رؤيتك
  - < كن مبادراً وأخبر الطبيب أو الممرضة إذا لاحظت أي تغييرات
- يمكن أن يكون التعامل مع التغيرات في الرؤية صعباً – لا بأس بطلب الدعم:
  - < تحدث مع العائلة والأصدقاء بشأن حالة الإبصار لديك، مع السماح لهم بمعرفة ما إذا كنت تواجه صعوبة في القراءة، و التحرك، وأخذ الدواء أو القيام بالأعمال المنزلية
  - < إذا لم يكن لديك عائلة أو أصدقاء يمكنهم مساعدتك، اسأل في مكتب الطبيب عن خدمات الدعم

- احتفظ بهذا الكتيب قد تحتاج لقراءته مرة أخرى
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو الصيدلي
- إذا عانيت من أي علامات أو أعراض تعتقد أنها مرتبطة باستخدام لوسينتس®، ولكن لم يتم ذكرها في هذا الكتيب، من فضلك قم بإخبار طبيبك.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى كتيب معلومات المريض.





للاستماع إلى دليل المريض امسح رمز الاستجابة السريعة (QR)



**You can report any problem or adverse events or request additional copies of the materials through:**  
**Patient Safety Department Novartis Pharma AG - Saudi Arabia -**  
Toll Free Number: 8001240078  
Phone: +966112658100  
Fax: +966112658107  
Email: [adverse.events@novartis.com](mailto:adverse.events@novartis.com)  
Or by online: <https://report.novartis.com/>



**Saudi Food and Drug Authority National Pharmacovigilance Center**  
Unified Contact Center: 19999  
Email: [npc.drug@sfd.gov.sa](mailto:npc.drug@sfd.gov.sa)  
Or by online: <https://ade.sfd.gov.sa>



يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى أو لطلب نسخ إضافية من خلال:  
**شركة نوفارتس - السعودية - قسم سلامة المرضى:**  
الرقم المجاني: 8001240078  
الهاتف: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠  
الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧  
[adverse.events@novartis.com](mailto:adverse.events@novartis.com)  
أو عن طريق الإنترنت: <https://www.report.novartis.com/ar/>

الهيئة العامة للغذاء والدواء، المركز الوطني للتحقق الدوائي:  
مركز الاتصال الموحد: 19999  
البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfd.gov.sa](mailto:npc.drug@sfd.gov.sa)  
أو عن طريق الإنترنت: <https://ade.sfd.gov.sa/>