

بطاقة المريض توباماكس (توبراميت)

بطاقة المريض الخاصة بدواء توباماكس – للنساء والفتيات القادرات على

الحمل

منع الحمل

المعلومات التي يجب معرفتها

- توباماكس هو دواء لعلاج الصرع و الصُّدَاغِ النصفِي.
- يمكن أن يسبب توباماكس ضررًا خطيرًا للجنين إذا تم تناوله أثناء الحمل.

الإجراءات اللازمة

- يجب قراءة نشرة العبوة ودليل المريض بعناية قبل الاستعمال.
- يجب استخدام وسيلة فعالة للغاية لمنع الحمل في أثناء علاجك بالتوبراميت ولمدة 4 أسابيع على الأقل بعد تناول آخر جرعة من توبراميت. سوف ينصحك طبيبك بالوسيلة التي هي أنسب لك.
- يجب زيارة طبيبك لمراجعة علاجك مرة واحدة على الأقل في السنة.
- إذا كنت تعتقدين أنك أصبحت حاملاً، فتحدثي مع طبيبك على الفور.
- إذا كنت تفكرين في إنجاب طفل، فلا تتوقفي عن استخدام وسائل منع الحمل قبل التحدث مع طبيبك.
- إذا كنت تعانين من الصرع، فلا تتوقفي عن استخدام توبراميت إلا إذا أخبرك طبيبك بذلك، لأن حالتك قد تتفاقم.

يجب الاحتفاظ بهذه البطاقة.

تمت مراجعة هذه البطاقة و الموافقة عليها من قبل هيئة الغذاء و الدواء بالمملكة العربية السعودية. نسخة 1، يونيو- 2026

للحصول على معلومات عن طريقة استخدام
الدواء , يرجى الرجوع الى النشرة الداخلية او
التواصل مع شركة جونسون أند جونسون
للتجارة
(الرياض)

العنوان: شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، برج
ب، الطابق 30 ، أبراج العليا
الهاتف: 00966114339133
ص.ب: 65305 الرياض 11556 ، السعودية

لإبلاغ عن الأعراض الجانبية و شكاوى عن
المنتجات او اي استفسارات طبية, يرجى
التواصل معنا عبر
البريد الالكتروني:
GCC-PV2@its.jnj.com
الخط المباشر:
00966540015811

لإبلاغ عن الأعراض الجانبية
الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية
السعودية
(المركز الوطني للتيفظ الدوائي)
البريد الالكتروني:
npc.drug@sfda.gov.sa
الخط المباشر:
19999
الموقع الالكتروني:
http://ade.sfda.gov.sa

