بطاقة المريض الخاصة بسوليريس

معلومات سلامة مهمة للمرضى الذين يتلقون إيكوليزوماب

قد يقلل إيكوليزوماب قدرة جهازك المناعي على مقاومة العدوى، ولا سيما عدوى المكورات السحائية، التي تتطلب عناية طبية فورية.

إذا ظهر أي من الأعراض التالية، فاتصل بطبيبك فورًا أو اطلب رعاية طبية طارئة:

- صداع مصحوب بالغثيان أو القيء
- صداع مصحوب بتيبس الرقبة أو الظهر
- الحمى
- الطفح الجلدي
- الارتباك
- آلام شديدة في العضلات مصحوبة بأعراض شبيهة بالإنفلونزا
- الحساسية للضوء

اطلب الرعاية الطبية الطارئة فورًا إذا ظهرت أي من هذه العلامات أو الأعراض، وأبرز هذه البطاقة.

احتفظ بهذه البطاقة معك دائمًا طوال فترة العلاج ولمدة 3 أشهر بعد آخر جرعة. قد يستمر خطر عدوى المكورات السحائية لعدة أسابيع بعد آخر جرعة.

معلومات لمختصي الرعاية الصحية

- وُصف لهذا المريض إيكوليزوماب، الذي يزيد قابلية المريض للإصابة بعدوى المكورات السحائية (**Neisseria meningitidis**) أو غيرها من العدوى العامة.
- يجب تطعيم جميع المرضى قبل تلقي العلاج بأسبوعين على الأقل. وإذا بدأ العلاج بعد أقل من أسبوعين من تلقي لقاح المكورات السحائية، فيجب إعطاء مضادات حيوية وقائية مناسبة حتى مرور أسبوعين على التطعيم.
- يجب إعطاء التطعيم وإعادة التطعيم وفق التوصيات الوطنية الحالية في المملكة العربية السعودية. يُرجى الرجوع إلى برنامج التحصين الوطني السعودي وإرشادات اللقاحات الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- قد تصبح عدوى المكورات السحائية مهددة للحياة أو قاتلة بسرعة إذا لم يتم التعرف عليها وعلاجها مبكرًا.
- قيّم المريض فورًا عند الاشتباه بوجود عدوى، وعالجه بالمضادات الحيوية المناسبة عند الضرورة.
- تواصل مع الطبيب الواصف الموضحة بياناته أدناه في أقرب وقت ممكن.

للحصول على المعلومات الكاملة، يُرجى الرجوع إلى النشرة السعودية المعتمدة للمنتج ونشرة معلومات المريض، أو التواصل عبر:
medinfo-ksa@astrazeneca.com

للإبلاغ عن مخاوف السلامة:
أسترازينيكا، المملكة العربية السعودية
البريد الإلكتروني: ksa.ae@astrazeneca.com
الهاتف: +966 11 2249235
البوابة: contactazmedical.astrazeneca.com
الهيئة العامة للغذاء والدواء
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
الرقم المجاني: 19999
بوابة الإبلاغ: https://ade.sfda.gov.sa

بطاقة المريض الخاصة بسوليريس® (إيكوليزوماب)

اسم المريض	_____
المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج	_____
اسم الطبيب	_____
رقم الهاتف	_____
تاريخ/تواريخ التطعيم	_____

تاريخ بدء العلاج بإيكوليزوماب: _____

معلومات التطعيم ضد المكورات السحائية

مضاد حيوي وقائي إذا بدأ العلاج خلال أقل من أسبوعين من التطعيم	السلسلة الأساسية / الجرعة المعززة	التاريخ	رقم الجرعة	المجموعة المصلية	الاسم التجاري للقاح
☐ لا ينطبق ☐ نعم، تاريخ البدء: _____					
☐ لا ينطبق ☐ نعم، تاريخ البدء: _____					

☐ لا ينطبق
☐ نعم، تاريخ البدء:
_____

رمز الاستجابة السريعة للإبلاغ لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء

.اقرأ دليل المرضى والوالدين ومقدمي الرعاية بعناية قبل بدء العلاج

الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها

أسترازينيكا، المملكة العربية السعودية: ksa.ae@astrazeneca.com | +966 11 2249235 | https://contactazmedical.astrazeneca.com/
المركز الوطني للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء: npc.drug@sfda.gov.sa | 19999 | https://ade.sfda.gov.sa/